


Y. 1111  
de la ...  
cette ...

12063

406













121

# DE STIRPIVM COLLECTIONE TA

BVLÆ TVM GENERALES,  
TVM PER DVODECIM MEN-  
ses, cum Germanicis nominibus, & alijs ha-  
ctenus à nemine traditis, olim per Conra-  
dum Gesnerum conscriptæ ac æditæ: nunc  
authoris opera locupletatæ, & de no-  
uo in vsum Pharmacopolarum  
luci datæ,

PER CASPARVM VVOLPHIVM  
*Tigurinum Medicum.*

ACCESSERVNT DE STIR-  
pibus & earum partibus tabulæ ex Theo-  
phraستي præcipuè libris confectæ,  
eodem Gesnero autore.

TIGVRI  
IN OFFICINA FROSCHO.  
ANNO M. D. LXXXVII.





# CASPARVS VVOL

PHIVS TIGVRINVS MEDICVS,

D. LVCAB STOECKLIO PHAR-

macopolæ Constantiensi fideli & in-

dustrio, amico suo

S. D.



**Q**UANTVM in medicamento-  
rum, quæ in vsum medicum ad-  
uocantur, tum in vniuersum o-  
mnium, tum verò potissimum  
stirpium ipsarum, exacta cogni-  
tione situm sit, id ipsum, vir industrie, abundè  
restatur, non solum ea voluptas, quæ foris oculo-  
s, & animum intus mirificè afficit atque ob-  
lectat, & præterea honestas, quæ ex cognitione  
manat, & sola hominis est ornamentum: verum  
insuper & quidem cumprimis hæc ad benefe-  
liciterq; viuendum vtilitas, qua nihil magis se-  
cundum naturam est. Quum enim Deus Opt.  
Max. pro sua diuina providentia facile nouis-  
set, quis esset futurus hominis status aut condi-  
tio, quæ in morbos præceps & perpetua rui-  
na: varijs hisce morborum incommodis, varia  
quoque, eademq; admirandis viribus prædita  
antidota statim opposuit, ne qui modò in lucem  
esset editus homo, aut per omnem reliquam vi-

## EPISTOLA.

tam miserè degeret, aut penitus ab exortu sta-  
 tim succumberet atq; periret. Quin insuper ei-  
 dem etiam, & ea ipsa cognoscendi, recte q; iisdē  
 utendi notitiam studiumq; ingenuit: quòd pro-  
 pensissimæ erga nos suæ voluntatis argumen-  
 tum est. Hinc nimirum, quia maximam esse hu-  
 ius cognitionis præstantiam paulatim homines  
 persentiscerent, eorundemq; vsu, naturæ huma-  
 næ imbecillitati subsidia magna cōparari, quo-  
 tidianum comprobaret experimentum: factum  
 est, ut omnis generis & conditionis, summæ, in-  
 fimæ, homines: ὧς φίλ & αὐτὰ πῦς αὐθρῶ-  
 π & φῦσεϊ τε ἔσι. quotidie ad obseruandum,  
 & amplius experiendum studio & animi quasi  
 quodam impetu ferrentur: id quod multorum  
 nostri & superioris seculi scripta selecta lucu-  
 lenter testantur. Nam quia hæc materia varia  
 & multiplex, proindeq; non vno tantum modò  
 afficiat, delectet, & ad sui cultum inuitet: pro  
 cuiusq; ingenio & voluntate, modò hæc eius par-  
 tem, modò illam familiarius tractare, studio seq;  
 excolere singuli instituerunt: Sunt etiamnum,  
 & ante hæc fuerunt tempora multi, qui externa  
 tantum stirpium facie oblectati, sexuum inue-  
 nerunt discrimina, partium singularum linea-  
 menta curiosius obseruarunt, & singulis inge-  
 niosas insuper descriptiones affinxerunt: quæ  
 profecto

## EPISTOLA.

profecto cōtemplatio, vti per se est iucunda gratā, ita quoq; in medico vsu, sua non destituitur vtilitate. Plurimos contrā videas admirari, reconditam illam interius, penitusq; abditam formam, solam miraculorum omnium, quæ hodie in medicina passim & multa & magna fiunt, effectricem causam: facultates dico, cū specificas & occultas, tū manifestas, hoc est, primas, & eas quæ has proximè sequuntur. Atq; hi quidem, dum quod quærendo experiendoq; sunt consequuti, omne ad communē vitæ vsum contulerunt, laude egregia apud quoscunq; sunt conspicui, inter doctos verò amplissimis dignitatum titulis clari. Cæterum ad comparandam absolutam huius contemplationis studiūq; notitiam (dummodo quod profuturum nouimus, ad vsum vitæ conferendum quoque arbitremur) præterea etiam requiritur diligens & accurata Præparatio: & qui hanc rectè præcedit, in colligendo asseruandoq; cum ratione Delectus: in quibus duabus partibus, commentando exornandoq;, haud perinde multos speciatim laborasse nouimus. Quantum verò referat, quamq; sit necessaria tum Medici tum Pharmacopolæ diligens & exquisita circa stirpiū, earundemq; partium ad vsum collectionē conseruationemq; industria, (de præparandi namq; ratione hoc loco non agimus) sæpe hætenus ipse nos rerum



# EPISTOLA.

eventus satis superq̃ docuit. Qui enim hac in parte committuntur errores, quæ temporis lociq̃ curiosam rationem & tempestivam exposcunt observationem, plerunq̃ non ægri solùm valetudinem in discrimen vocant, sed ipsius quoq̃ medici, quantumvis præstantis famæ estimationiq̃ periculum creant, nec nisi pœnitendo, quicumq̃ sic error commissus fuerit, corrigi potest. In gravem errorẽ inducunt, nostramq̃ expectationẽ prorsus decipiunt compositorum vires, si, quibus ea constant, facultates ignavæ & inertes, aut prorsus obsoletæ fuerint. Proinde non sine ratione Galenus in Theriacæ compositione, simplicia omnia & quidem singula seorsim eam componentia, diligenter exploranda præcipit: ne tota antidotus inutilis reddatur: ἢ ὡς ὁ τινὸς ἡγούλα, inquit ille, πολλαὺς ὄψεσθαι τὰ πάλαι. In idẽ studiũ nobis quoq̃, quotidie medicamenta præscribentibus, incumbendum est, ut ea, si modo profutura speremus, theriacæ nomen & antidoti, contra præsentis morbi vim, habeant, ea tantũ assumendo, quæ fuerint viribus integra, & in suo genere præstantia. Quid enim quæso attinet, simplicium facultates novisse, si nullæ insint? putare autem inesse, quum non insint, quod colligentis siue inscitia siue negligentia, non naturæ vitio accidit, viri

dit, viri prudentis non est. Magna igitur medicina nostræ pars in medicamentorum delectu posita est, maior medici gloria, & maxima ægrorum spes. Solatium ingens est ægrotis, si medicamentorum auxilia præsentia esse viderint: in maiorem verò spem eriguntur, quum de inuentis præscriptisq; remedijs, & eorum integritate nihil penitus sibi dubitandū nouerint. Hæc aliaq; cum satis nota essent Gesnero nostro, putauit suo labore & studio huic necessitati obuiam eundum. Quare ante multos annos, de herbarum, florum, fructuum, &c. colligendi tempore, & conseruandi reponendiq; modo & loco, tabulas generales & particulares edidit, breues quidem illas, pro occasionis nimirum præsentis ratione, alterius verò operis, & plenioris considerationis, quasi quoddam rudimentum. Atque hoc suum propositum persequutus procul dubio fuisset, si Dei voluntate ætas ei fuisset prorogata. In eum namq; finem, paulatim plura obseruare & consignare cœpit, quæ ad locupletandū exornandūq; priorem laborem spectabant. Verum haud incommodè, quum per fati necessitatem suam perficere institutum ipse prohiberetur, voluntatem eius promouit hoc tempore, quod res necessariæ omnes in angustum sunt contractæ, Typographus noster, qui, vt interea dum ad Germanorum πτυγχεῖς ipse descendit, in suoriis

## EPISTOLA.

operariorum gratiam, ut illorum nimirum domesticam necessitatē subleuaret, hunc qualem-  
 cunque à me flagitando, impetrauit. Quaecunq;  
 igitur ipse vel studio obseruauit, vel quotidie  
 in hortulo proprio producta vidit, eadem nos,  
 pro ut ipse instituerat, duplici ordine, secundū  
 florum fructuumq; tempora disposuimus. Alpha-  
 beticè primum: ita enim initia & fines florendi,  
 fructificandiq; commodè indicari, & quæ de  
 vna stirpe hætenus diuersis in locis scripta le-  
 gebantur, coniuncta & simul apparere, putauit.  
 Deinde verò iuxta primum institutum, sed  
 breuius, etiam secundum Menses, adiectis ple-  
 risq; Germanicis appellationibus. Ad generalē  
 verò tabulam accessit, ex clarissimi Matthioli  
 in Dioscoridem commentarijs, de eodem argu-  
 mento, quod placere poterit. In frontem insuper  
 totius libri retulimus generales aliquot de stir-  
 pibus, ex Theophrasti magna ex parte libris, de-  
 promptas tabulas, nec inelegantes nec inutiles:  
 quas, si per paginæ spacium licuisset rectius di-  
 ducere, & membra membris opponere, multò  
 elegantiores & ad vsum aptiores apparerent.  
 Cæterum hunc Gesneri libellum, & meum in  
 eundem collatum laborem, tibi vir spectatissi-  
 me, offero & multis de causis dedico. Ac prima  
 quidem, quod cognitum habeam, te authoris,  
 quandiu in viuis esset & obseruatorem semper  
 & ami-

## EPISTOLA.

& amicum extitisse. Deinde, ut quoniam hic  
 liber præcepta & instituta præscribit, quibus  
 futuri Pharmacopolæ instruendi informandiq;  
 sunt: tuq; ipse eius artis usu excellis, præceptisq;  
 egregiè præ cæteris abundas: per te tyrones non  
 officij solùm sedulò admoneantur, sed tyrocinij  
 sui etiam rudimenta deponant, rectiusq; ad præ-  
 xim accedant. Ad has accedit præterea etiam  
 ea, quam ipse iam pridem tum domi tuæ lautè  
 accipiendo, tum hic familiariter conuersando,  
 multis tuis humanitatis & beneuolentiæ offi-  
 cijs mihi præbuiſti. Ne itaq; ingratus omnino  
 videar, meam vicissim tibi hoc ipso probatam  
 polui voluntatem. Rogo igitur te, ut hanc qua-  
 lem cunque animi grati significationem, hilarè  
 pultu excipias, & boni consulas. Vale.

Tiguri calendis Maij, anni

1587.

CONRADVS GESNERVS M.B.  
dicus Tigurinus Nicolao Speichero  
pharmacopolæ Argentinensi  
peritissimo S. D. P.

**D**Auid Kyberus Argentinensis, felicitis memo-  
rie vir optimus & doctissimus, diligentissi-  
mo suo Rei herbariæ Lexico Tabulas temporum,  
quibus singula stirpes florent aut fructum ede-  
rent, cum corollarium adiungere statuerat: id verò  
eius propositum mors immatura interceptit. Huic  
igitur ego suauissima amici memoria inuitatus, ut  
aliquo modo satisfacerem, quantum per occupa-  
tiones meas licebat, eiusdem argumenti Tabulas  
conscripsi. Tibi verò in primis, optimè Nicolae,  
nuncupare eis volui, non tantum quod professioni  
tuæ, in qua excellis, conueniant, tuq; easdem ali-  
quando augere ac perficere possis: sed magis quia  
Kyberus utriq; nostrum amicissimus fuit, ut eius  
amissi hoc veluti solatium quoddam haberes, &  
me quoq; propter communis amici memo-  
riam amares. Vale Tiguri anno Salu-  
tis 1553. pridie Nonas Aprilis.

DE

DE VSV HARVM TAB-  
bularum.

**A**BVLAE istæ non pharmacopo-  
lis tantum, tyronibus præsertim &  
minus exercitatis, vtilis sunt futu-  
ræ, sed omnibus stirpium notitiæ  
fructuosæ. Qui cum singulis ferè mensibus ver-  
nis, æstiuis & autumnalibus, partim cognitio-  
nis, partim animum remittendi & corpus ex-  
ercendi gratia, rusticatum exire soleant, occa-  
sionem ex hisce tabulis capient, quænam eis  
plantæ potissimum quærendæ aut sperandæ  
sint. Libuit autem non medicis tantum vñtatas  
stirpes, & quarum necessaria pharmacopolis  
est cognitio, hic enumerare, sed quasuis simpli-  
citer quæ nunc in mentem mihi venire potue-  
runt: & de quibus mihi quo tempore florent  
aut fructificarent cōstabat, reliquas sibi quis-  
que suo loco addet, vel nos aliquando si vita  
diuinitus prorogetur: neque enim vnus aut  
alterius anni hoc opus est. Arque ita non me-  
dicinalis tantum hæc per anni tempora dige-  
stio stirpium fuerit, sed etiam physica & philo-  
sophica. Sic Theophrastus & Plinius non re-  
medijs modo quæstias, sed omne genus stir-  
pium, cum aliter tum secundum tempora qui-  
bus quæque florem & fructum ædunt dif-  
ferentijs, descripserunt. Sed quoniam cœli &  
regionum discrimen facit, vt plurimæ descri-

ptæ à veteribus stirpes apud nos non proue-  
niant, & illarum quæ proueniunt tempora nõ  
respondeant, operæpretium visum est vt nas-  
centium apud nos siue sponte, siue satione tem-  
pora distincta notarentur. Scio etiam in vna  
eademq; regione diuersitatem reperiri. Diffe-  
runt enim in singulis loci, humiles, æditi, a qui-  
lonares, austrini, opaci, aperti, vmbrosi, apri-  
ci, vento expositi, tecti vel non expositi, a quo-  
si, aridi. Memini ego me in altissimis monti-  
bus Augusto mense & autumnii initio, eadem  
ferè omnia quæ in planis Aprili & Maio nas-  
cuntur, reperisse, violas florentes & varios  
flores vernos, fraga maturescencia & matura,  
&c. Quin & pro annorum diuersitate hyems  
aliàs magis, aliàs minus extenditur, & annus  
alter altero magis minúsue pluuius est. Itaq;  
fit vt nihil his de rebus omnino constans &  
perpetuum tradi possit. Rursus verò non adeò  
incerta hæc ratio est, vt nullum in ea descri-  
benda operæpretium habeatur. Quamobrem  
volui pro vnius regionis, hoc est Germaniæ  
nostræ, vsu, has tabulas conscribere, partim ex  
observationibus meis cum alijs tum ambula-  
tionum & rusticationum mearum, partim ex  
Collectaneis amici cuiusdam philiatri, qui  
quo stirpes quæque florem fructumq; æde-  
rent tempore ex Hier. Tragi & Leon. Fuchsi  
illustribus per Germaniam nostram scriptori-  
bus, per singulos menses annotarat. Quòd si  
non

non per omnia satisfecerit hæc diligentia nostra pharmacopolis cæterisque rei medicæ studiosis, cogitent hanc lucubrationem hac de re & primam & extemporaneam esse, & sibi quisque ubi voluerit vel emender vel augeat. Nullo enim periculo tum omittere multa, tum labi in quibusdam, hisce tradendis potuimus, ut facilius nobis non dico venia danda (neque enim grauibz istis & ut sibi videntur doctissimis scribimus, à quibus exoranda sit venia,) sed potius gratiæ agendæ sint à candidatis medicinæ & benignis ac æquis lectoribus. Cæterum ut pluribus prodessem, non singularum duntaxat stirpium tempora, sed insuper communes quasdam observationes statim ab initio proponere visum est, ut appareat minimè nobis placere pharmacopolas collecturos certis anni temporibus astrictos esse. Et quanquam illi quibus generalis hæc colligendi doctrina intellecta fuerit, singularium enumeratione non admodum indigeant, arbitratus sum tamen eam quoque nec iniucundam nec prorsus inutilem futuram.



ACHILLES P. GASSARVS L.  
*medicus, Conrado Gesnero medico.*

**C**VM aliud nunc opere precij ad te  
scribendi non habeam, Conrade do-  
ctissime idemq; amicissime, volui saltem  
veteris nostri amiculi carmina ista ad te  
mittere, vt simplicibus tuis vel extremo fo-  
lio adderes. Bene vale cum tuis omnibus.

CARMEN IO. MOIBANI MEDI-  
ci doctoris Augsburgensis, continens ca-  
talogum medicamentorum purgan-  
tium simplicium, quorum nunc  
vsus in Myropolijs est.

**S**Vnt suspecta satis Tithymallus & Esula quæuis  
Et quod habet nomen flebile Dacridij,  
Est Turbith turbans, sic Hermodactylus is qui  
Colchicon est, seruis perniciofa salus,  
Euphorbiq; liquor, sed & Anticyræ medicamen,  
Quodq; solet viduas reddere Mezereon,  
Sic nec amara placet Colocynthis, & ipse lapillus  
Pulchro stellarum coeruleus igne micans,  
Namq; hæc callosus vel caice textus acuta  
Venter, quo ferrum rustica turba coquit.  
Aut stomachus similis rugosis arte cothurnis  
Miluis indomiti dira Aconita coquens,

Vix


Vix impune feret, vel si feret, ardua res sit,  
 His quæ tormentis subdere colla iubet.  
 ¶ Contra civili qui gaudent lege medendi,  
 Et quibus haud ulla est pœna luenda grauis.  
 His plenis baccis frondescat Prunus in horto,  
 Et placeat quouis irida murus habens,  
 Et suaves spirent Violas in cespite prata,  
 Ornent & pulchras pulchra Roseta domos,  
 Nec æfinc Mennæ Calobrorum roscida mella,  
 Et fuluum quod dat Barbara terra Raved,  
 Indorumq; Thamor, Balonuq; Aloëq; Cetrachq;  
 Lynphatas undas & Galathea ferens,  
 Soldanella, Lilix, Ebulus, Sena, Cassia, Nitrum,  
 Et veteris Galli mollia iura placent,  
 Absinthi, Capniq; liquer, vel Agaricus illis  
 Sit cura, tuto quis redimenda salus.

# ERRATA CORRIGENDA.

ἀγαθήματα, pag. 24. b. Differentiæ sunt, p. 22. a.  
 in præfationem, p. 42. b. in pratis, p. 71. b  
 Gaultie/ pag. 123. b.



CONRADI  
GESNERI DE PAR-  
TIBVS ET DIFFERENTIIS  
PLANTARVM PHYSICA SY-  
*nopsis, secundum Theophrastum, Plinium &*  
*Dioscoridem: in tabulas methodicè dige-*  
*sta, introductionis vice ad quas-*  
*vis stupium historias*  
*legendas.*

HILOSOPHI nostri omnē  
ferè de plantis consideratio-  
nem nō solūm quæ historiam,  
sed etiam quæ causas attinet,  
partim ad rem medicam, par-  
tim rusticam reiecisse videntur, vt in pleris-  
que etiam alijs Philosophiæ amplissimam  
professionem circumciderūt, vt ipsis, quan-  
tumuis in paucis utcunq; eruditi, philose-  
phos se profiteri minori negotio possent,  
hoc est videri magis quàm esse,

PLANTA, stirps, *φυτόν*, corpus est na-  
turale compositum, animatum, telluri ceu  
parenti, vt alimentum continuè attrahat, af-  
fixum, speciem suam de se propagans, loco  
immobile, insensibile.

## TABVLAE STIRPIVM

Stirpium aliæ sunt

Herbæ,

Frutices,

Minores,

Arborescentes.

Suffrutices, herbæ lignosæ, quarum caules non pereunt quotannis.

Arbores

Iustæ

Fruticosæ.

Quædam fortè ad certum genus vix referas, vt sunt Viscum, Fungi, Corallium, Lens palustris.

## DIFFERENTIAE STIRPIVM

*unde sumantur.*

Loci, à quibus stirpium & partium singularum differentia sumuntur, in historijs Dioscorid. Plinij, Theophra. &c. sunt vel  
I Substantia,

Secundum genera & species plantarum, vt

Arbor.

Herba.

Frutex.

Olus.

Legumen, &c.

Secundum

Secundum corporis cōstitutionem  
& partium cōcrementum, οὐσαντιν,  
compactionem,

Durum.

Molle.

Densum.

Rarum, vel partium

Tenuium

Crassarum.

Alias tactiles qualitates secundas.  
Quod singulæ vel habent vel non ha-  
bent partes aliquas.

2 Quantitas.

Numerus.

Magnitudo.

3 Qualitas.

Actu & sensibilis

Communis.

Figura

Similitudo

Vnius,

Duorum aut plurium.

Propria

Tactui

Graue, leue, Asperum, lene,

Durū, molle. Lubricū, aridū.

Crassum, tenue. Rarū, densū.

# TABVLAE STIRPIVM

Vifui

Fulgor.

Color.

Odori

Graueolēs, virofum, foetidū.

Inodorum,

Acre, acutum.

Odoratum,

Suauiter, fragrans.

Caput tentans, grauans.

Gustui

Inſipidus, ἀπὸις.

Dulcis.

Amarus.

Acris, acidus, &c.

Potentia & occulta qualitas. Ab inſito autem calore noſtro ex potentia in actum producitur.

Prima,

Calidum in 1. Obſcurè.

Frigidū in 2. Senſibiliter.

Humidū in 3. Vt lēdat ſenſū.

Siccum in 4. Vt deſtruat ſē.

In quarto gradu delibutoria,

διληνθήρια, venena ſunt.

Secundæ qualitates à medicis dictæ, omnes ſenſibiles ſunt, odorū præcipuè & ſaporum differentię.

Tertiæ,

- 21 Tertiæ , quæ priuatim ad aliquam corporis partem aut morbum facit , propter qualitates, vel propter totam substantiam, & vim aliquam occultam ; vnde dicuntur alia

Cephalica

Ophthalmica

Cathartica

Diuretica, &c.

- 4 Situs, locus natalis totius plantæ. Et partium situs singularum.

- 5 Tempus

Ortus

Occasus

Maturitas.

- 6 Actio, sed hanc inter qualitates retulimus, quæ si per verbum aut verbale actiuum efferatur, huc pertinet.

- 7 Vfus, ad aliquid, vt ad

Medicinam

Cibum

Potum

Condimenta & voluptatem

Alia diuersa, vt olea, &c.

Hominum

Brutorum.



TABVLAE STIRPIVM  
DE STIRPIVM DIFFERENTIA  
*quatenus vel hyemis ferunt inclemen-  
tiam, vel non ferunt.*

Ex stirpibus sunt quædam, quæ hieme aut  
Pereunt, idq; vel  
Penitus & totæ, quarum multæ sunt.  
Ex parte, idq; aut  
Caule tantum, seruatis folijs circa ra-  
dicem : cuius generis ferulaceæ  
pleræq;, puto sunt.  
Folijs tantum, seruato caule, vt ple-  
ræq; arborum, fruticum, & suffru-  
ticum: Solanum perpetuum.  
Floribus tantum: vt Leucoia.  
Superficie tota, vt Inula.  
Manent, idq; secundum  
Totum, præterquam flore: sed consili-  
go, elleborus, & paucæ aliæ etiam flo-  
rent hyeme.  
Partibus, vt supra dictum est.

PARTES STIRPIVM AN-  
*nuæ & caducæ.*

Præcipua, & propter quam cæteræ sunt, Se-  
men seu fructus, σπέρμα, καρπός. Licet  
fructus nomine ferè semen vnà cum am-  
biente

biente pericarpio comprehendatur, vt in

Pomis, ὀπώρα

Sine ossibus

Cum ossibus, inter quæ nucleila-  
tent, πυρήνες.

Nucibus, ἀκρόδρυα

Acinis, ῥάξ.

Baccis, Baccæ dispersius rariusq; ena-  
scuntur, in hoc ab acinis, qui den-  
sius proueniunt differentes. Con-  
stant autem acini & baccæ

Carne

Succo

Nucleo.

Vinateis, γίγαρτα, in acinis vitium.

Sanfis, ossiculum oliuæ.

Acinorum congeries in vite vua, in re-  
liquis etiam corymbus vel raze-  
mus, botrys nominatur. Licet raze-  
mus propriè sit, qui & Scapus quo  
acini fulciuntur.

## DE DIFFERENTIA STIR- pium circa semen & fructus.

Semine quædam carent, vt

Adiantum \*

# TABVLAE STIRPIVM

\* Polypodium  
Trithomanes  
Asplenon  
Phyllites  
Filix vtraq;.

Fructum non proferunt arbores infelices,  
ob hoc dictæ. Salix Homero ὠλεσίκαρ-  
πη & Similiter tamarix apud nos.

Semina quædam  
Præueniunt

Flores  
Florum instar paniculæ.

Fouent & tuentur

Folium, φύλλον

Pes

Pericarpia.

Fructus

Præcoces

Serotini

Nunquam maturenscentes, vt

Labruscæ, ὄμφακες

Grossi, εἰνεοί, in caprifico.

## DE DIFFERENTIA STIR- pium circa flores.

Flores, ἄνθη, nam alijs sunt

Duplices, διὰ νῆ, quod violæ Martiæ tri-  
buitur : & floribus illis, qui stamina  
quædam

quædam seu crocos, quos & apices vocant, in medio habent, veluti filamenta ab intimo floris sinu: cuiusmodi Plinius in belli flore pæstillicantes barbularas dicere videtur.

Multiplici folio, *δασυπόδισα*, gefüllt Blumen: quod arte fit.

Rosæ

Violæ

Caryophylli

Pes corui

Bellis

Malua.

Aquilegia

Bacilli, *Μίσοσβλῦμεν*.

In pappos (*πάππος*.) id est, lanuginem quandam deciduam abeunt.

Lactariæ multæ, vt Lactucæ

Sylvestres

Hieracium vtrumq;

Sonchi

Chondrillæ

Gerontopogon.

Domesticæ.

Cardui omnes, Atractylis, Scolymus,

Chamæleones, &c.

Et aliæ quædam, vt

Senecio \*

## TABVLAE STIRPIVM

Gramen quoddam palustre.

Alopecuros quibusdam.

Vnius folij in calathi formam, vt in

Conuoluulo

Maiore : rudimenta naturæ lilia facere condifcentis, Plinius.

Minore , qui Helxine cissampelus videtur.

Iafone.

Solano Romano.

Rapum syluestre. Vuulariæ.

Calathiformes

Plurium foliorum

Diuisorum vndiquaq;, vt lilium.

Continuorū infra, vt rapū syluestre.

Vnius folij, vt conuoluulus.

Quatuor foliorum, violæ matronales.

Pluriū foliorū , vt rosa à quinq; ad centū.

Folij florum crenatis.

Exemptiles,

Borago, Alsine syluatica.

Buglossus,

Cynoglossus

Radiati singuli, per singulos coliculos,

Bellis

Maior,

Minor.

Gerontopogon.

Hieracium.

\* Caly-

- \* Calycibus plurimi includuntur antequam dehiscant, quo tempore in rosis alabastrors ( à valorum forma ) & nymphas. *νεύμφας* vocant, quod recens apparere incipiant.

Pendentes à

Siliquis, ut in

Herba S. Antonij,

Maiore,

Minore.

Rhododaphne puto : species filiorum ante patrem.

Petiolis.

Flores, *ἀνθὲς* sunt vel

Florentes

Particulatim

Cum in vna ceu panicula infimi prius & alij paulatim post florent.

Bellis item particulatim floret.

Vniuersim.

Muscosi, nudi calycibus, multi, parui, conferti, molles. Sunt qui spongiosam hanc florum congeriem, muscum appellant: ut Ligustrum, Barba capræ, Rubra, Galion, Cruciata.

Inordinati.

Ordinati & digesti per

Corymbos, ut Androsæmon

## TABVLÆ STIRPIVM

- **Paniculam** (aliqui iubam vel comam vocant.) quæ sublonga vel subrotunda effigie tumet, veluti lanosa coma, in

Milio

Panico

Arundine

Iuncis

Et graminis generibus aliquot.

**Muscaria** vel **ymbellas** : quæ sunt in orbem radiatæ herbarum comæ: cacuminaque in fascies coacta, à flabris similitudine, cuius ventilatu muscæ à conuiuis abiguntur. Aliàs **Vmbella** floris seminisque pedamentum est, in plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti, in latius continuò radiantur, in orbem circumactum. *Σκιάδιον* ab effigie vmbellæ muliebris, qua faciem à sole & æstu defendunt. Apij genera omnia vmbellas habent, & his ferè longiuscula, simplex & neruosa radix est.

**Verticella**, *σπονδυλία*, quæ caulium & ramulorum artus ambiunt & coronant, vt in marrubio, clinopodio : ab instrumenti muliebris similitudine,

\* quæ

\* quo fusi vertendi gratia vtuntur.

Spicas, *σπῆχες*. Quanquam fortè magis ad semina siue grana hoc ordine digesta quàm flores hoc nomè accomodetur.

¶ In spica, quæ olim specæ, à spe, continentur

Grana.

Grano minus

Summum

Frit.

Vrunçum.

Infimum,

Gluma, grani inuolucrum.

Solisequi

Heliotropium, per excellentiam maius & minus.

Seris, cichorium.

Lutei ferè omnes, & aureo colore splendidi, vt calendula, pes corui.

Bellis & radiati pleriq;.

Colocassia.

Pilei acuti specie seu cucullati.

Aquilegia, seu Angelica

Aconitum

Cœruleum

Flauum.

Staphis agria.



## TABVLÆ STIRPIVM

Flores, *ἄνθη*, sunt vel

Foliati, in quibus lata & distincta folia  
sunt. Muscoli enim pilei formes, nō pro-  
priè foliati dicuntur.

Vogues in rosis & foliatis floribus. Sunt  
imæ foliorum partes quibus in capite  
suo cohærent.

¶ Florum colores sigillatim persequi in-  
finitum foret.

¶ Quæ in floribus à figuris dicta nomina  
viurpâtur, eadē in seminibus similiter.

Florum instar est panicula, quæ dicitur

Cachrys, *κάρυς*, pilula Plinio, in

Larice

Picea

Platano

Iuglande

Tilia

Abiete.

Iulus, *ἰὺλος*, in anellana, sic fâctus.

Nucamentū, *κνύστιον*, præcipuè in nu-  
cibus, deinde in illis etiā, quæ (Græcè)

Canchryn ferre dicuntur.

## STIRPIVM PARTES QVÆ

*seruæ foveat ac tuentur.*

Folium de quo supra.

Pes, petiolus.

\* Peri-

\* Pericarpium,

Vas, vasculum, theca, loculi, inuolucrum, conceptaculum feminis.

Folliculus, de diuersis pericarpis dicitur, de calyce, gluma in spica & membranosa cute acini.

Calyx, ἀπὸ τοῦ καλύπτειν, folliculus quo flos primūm, mox feminis fœtus clauditur. Sic etiam in glandibus vocatur, vulgò cupula.

Gluma, tenuis grani tunica. Acus purgamentum frumenti leuissimū, pars glumæ inde acerosum.

Siliqua, λοβός, valuulus peculiariter in leguminibus. Aliæ

Obliquæ vel dependentes, vt leguminum, quæ singulæ & longiores visuntur.

Erectæ, breuiiores, quinæ ferè, vt Aconiti cœrulei & flauī, & staphis agricæ puto, & Aquilegiæ.

Corniculatæ vt in Cardamomo.

Scutulatæ figuræ.

Lenticularis figuræ.

Folliculus vt in ormino, nomen quod sciam non habet.

Vulga, instar sacculi pecuniarij:

Caput, (vt in papauere, κώδιον, fortè

## TABVLÆ STIRPIVM

\* in carduis etiam, vt cinara, caput dici potest) loculamentis, id est, paruis capsulis distinctum, in quibus absoluta semina sunt. Quædam sine capsulis sunt, vt polemonion, flos Iouis.

Folliculo

Vndiq; adhærente

Inani, vt

Halicacabus,

Verbūne rufæ / frutex arbore-  
scens.

Echinus, pluribus, vt in castanea.

Murex (in tribulo) paucioribus.

## FOLIORVM DIFFERENTIA.

Plantæ aliæ aut

Sine folijs sunt, vt

Spartos

Cuscuta

Adiantum Apuleij.

Habent folia.

Crenata, id est, ferrata, per ambitumq;  
secta.

Fimbriata, quæ in ambitu in quasdam  
fimbrias exeunt.

Laciniata, membratim per flexuras di-  
gesta,

\* *gesta*, vel natiuis segminibus dissecta.  
*Lacinię* enim partes sunt extremę de  
 coris causa concisę, orarumque sum-  
 marum cęsurę. Sic *Vetonici* sylue-  
 stris genus quoddam floribus est la-  
 ciniatis. Sunt tamen qui lacinosum  
 pro sinuoso vsurpent.

*Stellata*, quę etiam radiata dici pos-  
 sunt, vt

*Rubię*

*Cruciataę*

*Aparines*

Horum omniũ geniculati sunt  
 caules, folijs genicula ambiēti-  
 bus.

*Bina*, *terna*, *quaterna*, &c.

*In vaginis condita*, vt *graminis*, *canarię*,  
*tritici*, *iridis*, & similium.

*Striata* seu *canaliculata*, singulis, vel  
 pluribus canaliculis, vt *cyperi*, *pseudocyperi*.

*Annua* & *caduca*, vel *decidua*: non de-  
 cidua

*Lanuginosa*, γναφαλοειδής, vt *gnapha-  
 lij*, *dictamni*.

*Aculeata*, vt *chamæleontis* vtriusque,  
*cinarę*,

*Hirsuta*, vel mollioribus aculeis præ-

# TABVLAE STIRPIVM

Coronarij plerique omnes, vtpote li-  
gnosi.

Herbarum genere.

*Αἰάανθεα*, vt adiantum, trichoman-  
es, filices vel omnes vel mihi notæ  
saltem.

Quæ liquorem habent,  
Acrem duntaxat, vt tithymalli: qui &  
florent in exitu hyemis aut prius.

Quibus folia & superficies tota den-  
sior solidiorq; est, vt  
Chamæpyxus.

Elleborus niger.

Item quæ nullo certo genere conti-  
nentur.

Coliculis summis.

In fruticibus,

Periclymenum

Cytisus, non tota, sed magna hyemis  
parte apud me in horto: ruri non  
dum obseruare potui.

In suffruticibus, Chamædaphne horti  
mei.

Circa radicem tantum. Herbæ

Quæ liquorem habent

Copiosum, dulcem aut subama-  
rum, Tragopogon, Cichoracea o-  
mnia, an sic & Lactucæ.

\*

Paucum

\* Paucum in ferulaceo genere, & si  
quæ alia fortè ἐνοπια sunt,

Olera

Satiua, apium.

Syluestria

Annua ferè ab autumno ad sequen-  
tè æstatem durantia.

Bellis, pastinaca syluestris, arthriticæ  
Bulbi pleriq;, hyeme amittunt superfi-  
ciem totam: pauci seruant circa radi-  
cem folia,

Lilium album

Crocus, hyeme præsertim viret: æ-  
state se oculit, vt & cylvaminus, a-  
rifara, &c.

Bulbine maior.

Stirpium aliæ

Semestres, à vere ad autumnum.

Annua, & totæ pereunt hyeme: nisi  
fortè autumno serantur.

Bimæ, aut longioris vitæ: & harum  
aliæ hyeme

Virent

Totæ

Radicibus.

Non virent, sed radicibus integris  
superficiem amittunt.

Τριετείς, πολυετείς.

## TABVLAE STIRPIVM

¶ An pauciora sunt, quæ superficiem totam amittunt.

¶ An quæ semper virent etiam πολυ-  
χρονιώτερον sūt? & magis si etiā florēt

¶ Virent semper lignosa potius quam alia: & quæ liquorem habent: hic enim eis pro sanguine est, calidior & concoctus, crassior, (nam succus aquosus tenuior facile gelascit,) inter arbores, quorum lignum densius est. Ideo & in calidiorib<sup>9</sup> locis plura semper virentia inueniuntur: quia nec frigus magnum est, nec si esset tantum efficeret.

## TABVLA EX LIB. IX. CAP.

VIII. *Theophrasti de hist. stirp.*

*De vsu partium plantarum.*

Ex plantarum partibus aliàs utilis est

Radix fit autem radici-dium. ῥιζοτομία.

Paucissimarum vere, vt iſchiades radix  
τίλλεται τῇ ἡρῳ.

Plurimarum, autumno post Arcturum, cum folia deciderint: vel postquam decerptus fuerit fructus, si quarum fructus utilis est.

Eleborus autumno maturus est, vere imma-

\* immaturus.

Pauciorum æstate, ( ὑπὸ πυροτομίαν,  
καὶ μικρῶ πρότερον) per messem tri-  
tici ( vt bryonia puto ) panaces in  
Syria.

Radices colliguntur

Totæ

Minores tantum, vt in elleboro.

Liquor, ὀπός. Et hic aut fluit

Sponte, vt tragacanthæ.

Sectione ( ὀπισμὸν vocant.)

Caulium in plerisq;, vt tithymalli,  
lactucæ.

Radicum, in paucis.

Capitum, vt in solo papauere.

Et horum si succus

Abundet, πολύοπα, vase excipiunt,  
vt tithymalli siue meconij.

Paucus sit, lana, vt lactuca.

Succus, χύλισμα, in ijs qui paucum & a-  
ridum succum habent. Fit autem suc-  
catio, (χυλισμός) vt quæ vrentes, aut  
torrentes aquamque infundentes ex-  
primunt.

¶ Succus radicum aut est fructu

Infirmior, vt cæteris omnibus.

Vehementior, vt cicutæ & thapsiæ.



7      T A B V L Æ   S T I R P I V M  
 D E   S T I R P I V M   P A R T I B V S ,   E A -  
*rumq; differentijs, tabulæ duæ Theophrasti de*  
*historia plantarum libri primi, capi-*  
*tibus quatuor prioribus, adie-*  
*ctis quibusdam ex cap.*  
 17. 19. & 20.

Omnes plantæ humorem caloremque si-  
 bi insitum quendam possident. Humor  
 autem vel

Dicitur humor, vel liquor (succus,  
 ὑγρὸν, ὀπρὸς) & si quidam distinguunt,  
 vt & lachrymam, Λάκρυον. Hic parti-  
 bus omnibus cōmunis est, nihil enim  
 est quod careat humore.

Differunt humores vel ratione. Vide  
 Plin. lib. 13. 28.

Coloris. est enim quidam lacteo simi-  
 lis, vt fici, papaueris.

Odoris. est enim odoratus, aneso, ce-  
 drulæ, apio, fœniculo, & similibus.

Saporis. est enim alijs

Vinosus, vt viti, inoro, myrto.

Acidus, vt punico & quibusdam malis.

Sed omnes qui huic generi contribu-  
 antur vinosos putandum

Dulcis, vt fico, palmæ, castanæ.

Acris,

Acris, vt origano, fatureiæ, nasturtio,  
synapi, thymo.

Amarus, vt absinthij, centaurij.

Pinguis, vt oleæ, lauro, nuci, amygdalæ, pino, larici, abieti.

Aquosus siue dilutus (ὕδαρής,) vt pruno, viti, piro, malo, cucumeri, cucurbitæ, lactucæ.

Consistentiæ, (sic nobis diuidere & nominare libet:) vt in abiete, pino, omnibusq; coniferis resinaceus. Huc fortè referri potest etiam lacti similis liquor supra nominatus.

¶ Vnaquæq; planta vt temperamentum proprium, ita succum quoq; peculiarem habet, quo à cæteris omnibus differat. Licet enim pericarpia quarundam stirpium sapore similia videantur, in ipsis tamen seminibus eorumq; tunicis differentia percipitur.

¶ Vniuersæ arborum plantarumq; partes cognationem quandam habent tota cum natura, quanquam odore saporeq; differant, sic vt aliæ odoratæ & benè sapidæ sint, aliæ inodoratæ insipidæq; omninò.

Sunt enim alijs, (ab odore differentia sumpta.)

## TABVLÆ STIRPIVM

- \* Flores odorati, folia inodorata.  
Contrà, vt coronarijs, quorum folia &  
rami magis olent quàm flores.

Neutrum.

Radix, aut alia pars.

- ¶ Sapor, succúsue ad cibum aptus in  
vna parte, in altera ineptus: vt arbo-  
rum aliquot fructus hominibus e-  
duntur, folia non item. Tiliæ contrà  
fructus pecora non attingunt, folia  
edunt pleraq;.

## TABVLA DE STIRPIVM

*partibus secunda.*

In stirpibus considerantur

Partes, μέρη

Essentiales

Similares, ὁμοιομερεῖς, vbi pars quæ  
libet idem nomen cum toto ha-  
bet. Harum aliæ

Priores

Nervus, ἵς, hic simplex est,  
nec diuiditur in ramulos.

Vena, φλέψ: hæc crassior est  
nervuo, humoré continet,  
& in ramulos finditur.

Caro, σὰρξ, quæ quoquo  
versus diuiditur, inter ner-  
uos aut venas sita.

\* ¶ Hæ partes sic nūcupantur per analogiam ab animalib. petitam. Posteriores, quæ ex priorib. constant.

Cortex, φλοιὸς, qui flores ambit & separari potest. Constat aut ex prioribus, vel

Tribus, neruo, humore & carne, vt roboris, piri, populi nigræ.

Duobus,

Humore & neruo, vt vitis,

Carne & humore, vt suberis.

Lignū, ξύλον, hoc fissile est, id est, in longū diuiditur. Cōstat è neruo & humore: quædā etiā è carne, vt quæcunq; per etatē durescunt & lignescunt, vt raphani radix.

Matrix, μήτρα, ligno ambitur: aliqui cor, alij medullā vocāt.) καρδία, μυελόν.

Sed καρδία ppriè est durior matrix, vt ἑγερρώνα laxior.) Constat ex humore & carne.

Dissimilares, ὁμοιομερεῖς, & maiores, vtpote ex similaribus compositæ, & primæ quod ad sensum: quæ & organicæ dicuntur. Et harū quædā μονομερεῖς sunt, vt tibia, cubitus: quarū particulæ nominibus carent. Aliæ πολυμερεῖς, vt caput, cuius partes nūcupantur oculus, nasus, &c. Sūt aut.

## TABVLÆ STIRPIVM

\* Radix, ῥίζα, quæ alimentum attrahit.

Caulis, καυλός, qui in herbis tum promitur (est enim seminis causa.) cum parturiunt, siue eodem anno, siue secundo, siue serius. Hinc in arboribus caudex seu truncus vocatur στέλεχος. Caulem alia

Habent, non tamen perpetuò, sed annuum, vt quæ diuturnis radicibus viuunt.

Non habent.

Ramus, ἀκρέμων, ὅζος, qui è caudice proximo oritur.

Surculus, κλάδος, κλών, βλάστημα: qui è ramis nascitur, vt germina annua maximè.

In stirpibus considerantur

Partes essentielles.

Annua, ἐπέτειοι, quæ non propriè partes dicuntur, vt neq; embryo fœtus.

Harum aliæ

Generationi inseruiunt, (quæ ferè omnia propter semen sunt.)

Folium, φύλλον. Horum aliæ constant ex

Neruo, cortice & carne, vt fici & vitis.

\*

Neruo

\* Neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Flos, *ἄνθος*. Forum alij constant ex

Cortice, vena & carne.

Carne tantum, vt qui inter folia nascuntur.

Pediculus, *μύκη*: à quo folium vel fructus hæret. Pediculorum autem alij constare videntur

Ex neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Ex eisdem quibus caules.

Plura de pediculis leges infra in differentiis foliorum.

Fructus, *καρπός*: hoc est pericarpium cum semine incluso,

Fructuū alij constant ex

Carne & neruo.

Carne tantum. Nonnulli etiam cute constant.

Carne & neruo, vt pruna, cucumeres.

Humore & cute, vt morum, punicum.

# TABVLÆ STIRPIVM

Alij secus distinguuntur.

¶ Omnium (vt sic dixerim)  
pars exterior, cortex: inte-  
rior, caro: quorundā etiam  
nucleus.

Semen, σπέρμα.

Aliam ob causam accedunt in qui-  
busdam, vt

Musculus, μύς.

Capreolus, κέλυξ.

Propriæ quibusdam, vt

Robori, galla.

Viti, capreolus.

Partiū differentiæ: vel in eo quod quædā,

Simpliciter habent, aut non habent, vt  
folia, fructum.

Habent, sed

Dissimilia, ἀτέμεια.

Figura,

Colore,

Densitate (spissitate) raritate.

Asperitate, leuitate, & alijs huius-  
modi.

Sapore.

Disparia, ἄνισα excessu vel defectu, se-  
cundum

Magnitudinem.

Multitudinem.

•

Dissimi-

\* Dissimiliter, *ἀντιμίσως*, id est differente  
Situ & loco, vt fructum supra vel  
infra folia.

Ordine, vt ramī  
Inconditi, robori,  
Ordinati, abieti.

**STIRPIVM ALIA DIVISIO GE-**  
*neralis, secundum differentias suas.*

Plantæ differunt

Natalibus seu loco. Sunt enim aliæ  
Terrestres.

Montanæ

In Iugis montium, *Bitterwurz*.

Ad latera. Estreatium in saxis &  
præcipitijs montium. *Flüblumen*.  
*Kor flüblumen*.

In planicie.

In vallibus.

In pratis.

Circa oppida.

Circa muros & sæpes.

In ipsis sæpibus.

Circa areas domorum.

In ruderibus.

Locis saxosis.

In muris vel saxis

Naturalibus,

Constructis.

In syluis.



# TABVLÆ STIRPIVM

\* In arboribus vel truncis arborum  
Viscum

Polypodium.

In hortis

In aruis, vt zizania

Quiescentibus

Non quiescentibus.

Syluestres.

Cultæ, vrbanæ, vel propter

Fructum in cibo.

Voluptatem in

Colore, vt horti pensiles,

Odore.

Figura.

Vmbra, &c.

Ambiguæ vel in vtroq; genere, vt  
cerasi. Vrbane verò tantum nul-  
læ, aut paucissimæ, vt etiam inter  
animalia.

Peregrinæ, vt & aliæ quædam, & o-  
mnes nobis Aromaticæ,

Radice, vt zinziber, zedoaria,  
cyperus.

Semine, cardamomum

Cortice, cinnamomum

Folijs, vt malabathrum.

Liquore, vt balsamum.

Duobus vel pluribus istorū.

\*

Sux

\* Suæ cuiq; regioni.

Aquaticæ: proueniunt enim aliquæ in  
Paludibus

Plenis aqua, vt nymphaea, lens pa-  
lustris.

Resiccatis, adiantum Apuleij.

Fluuijs, potamogeton.

Mari

Corallium,

Fucus,

Alga,

Bostryches,

Ampelides,

Otacides.

Ripis & littoribus, vt fium, menta-  
strum, sisymbrium, Marinas di-  
xeris, in mari nascentes: Mariti-  
mas, iuxta mare.

Tempore differunt plantæ,

Partium anni quibus crescunt, aut vi-  
gent, aut fructum ferunt, &c. Sic a-  
liæ sunt

Per totum annum.

Vernæ.

Æstiuæ vel alsiosæ, vt ocymum.

Autumnales, vt caltha.

Hybernæ, vt elleborus niger.

Durationis, vt aliæ sunt annuæ, aliæ

\*

C

## TABVLAE STIRPIVM

duobus vel tribus, vt angelica, laſer. Vel pluribus annis durant.

Sexu, ſic aliæ dicuntur

Mares, nigriores, duriores.

Fœminæ, albioreſ, frutiçoſioreſ, fœcundiores.

## DIFFERENTIAE STIRPIVM

*ſecundum partes, (quarum plurimæ ab animalibus mutuuntur nomina.)*

Stirpium partes aliæ

Simplices,

Compoſitæ,

Communes

Omnibus.

Plurimis.

Paucis.

## COMMVNES OMNIBVS ET

*ſimplices partes.*

1. Humor natiuus

Exprefſus, ſuccus, χυμὸς.

E vulnere profluens, liquor, ὀπὸς.

Lachryma, δακρύδιον. Eſt autem lachryma humor, qui ſtatim deſeçto  
caudico

\* caudice vel ramo, aut ipso ligno, profilit & apparet.

Lacteus,

Croceus, &c.

Gummi,

Resina.

2. Nervus filisilis est, per carnē & aliam substantiam meat. Fibræ verò seorsim etiam in radicibus procedunt foras, licet pro nervis aliquando accipiantur.

Pectines, ut vocant in ligno, nervi esse videntur.

3. Vena maior & crassior nervo, humorem habens & ramulos, in folijs apparet.

4. Interuētū, quod inter venas intercipitur.

5. Caro diuidi potest omnibus dimensionibus, cortici subest.

Pulpa in arboribus est, quod in animalibus musculum appellamus.

Tori, κόνδυλοι, prominentes partium tori, & in se pulparum modo collecti, unde torosum aliquid dicitur.

6. Tunica est tenuis cortex veluti membranaceus, quo arbor vel radix inuestitur.

Imò pars omnis suam ceu cutim & putamen habet. Cæpe folliculis tunicatum est. In arboribus librum dicimus. Thallia dicitur cæpæ folliculus: In malo punico putamen, malicorium.

# TABVLÆ STIRPIVM

*Partes aliæ ab animalibus dictæ.*

**Caput** dicitur

Infra, vt in bulbaceis, rotunda radice.

Supra, vt in papauere, vbi & *κασιον* priuatim.

Caput etiam vocant extremam vitis partem, id est vltimum & productissimum flagellum.

**Vertex,**

Cacumen.

Frons, vt paulò post dicetur.

**Cerebrum** in palma.

**Medulla** pars similis, cor, matrix. Hæc alij est

Multa

Pauca

Fungosa & laxa

Compacta & solidior

Nulla, vt buxo, ebeno.

**Ceruix**, pars à capitis radicibus prodiens, prælonga teresq;.

**Capillamenta**, fibræ, acetabula : vel cirri, si crispentur : in floribus quibusdam croci.

**Coma**, quicquid hilari venustate, crinium modo, summa ramorum vel coliculorum exornat.

**Iuba**, arundinacea coma effusa, qualis in milio est, à iubis animalium.

Alæ.

**Alæ.** Alarum caua, Sinus, *μαχαλάι*, ex quibus noua ſemper germinatio pròdit: cùm adnata nullam habeant certam partem vnde emergant.

**Adnata**, Adnaſcentia, **Appendices**, *παρεκφυσίς*,

Caulium

Radicum.

**Brachia**, maiores arborum rami.

**Latera**.

**Genicula**, vel **Artus**, in geniculatis vel articulatis.

Caulibus, vnde polygonos & polycnemon dictæ.

Radicibus, vt polygonaton, arundo, doronicum vulgò dictum.

**Internodium**, inter genicula medium.

**Pes**, pediculus, petiolus, tenax, *μίσχον*, quo folium, fructus, aut flos dependet.

**Pars**

Prona ad terram.

Supina, remotior à terra.

*Partes stirpium compositæ, communes plurimorum* R A D I X.

**Radix**, oris inſtar, ad alimentum attrahendum, vt planta ſit tanquam animal inuerſum. Sunt autem aliæ

## TABVLAE STIRPIVM

- **Bulbaceæ, bulbosæ, capitatæ.** Radices ipsæ bulbi dicuntur : æq; vel sunt
  - Tunicatæ, vt**
    - Cæpe**
    - Porrum, &c.**
  - Solidæ, vt aliquatenus tamen distincta tubera separentur, vt**
    - Croci**
    - Liliorum.**
    - Narcissi**
    - Scillæ**
    - Arundinum.**
- Oblongæ, vt in cartilagineis.**
- Simplices, (quod ad radicem scilicet, quæ recta in profundum agitur, & veluti stirps est) vt olerum.**
- Multiplices, fibratæ (per excellentiam nimirum, fibris enim omnino radicem nullam carere putarim) multis adnatis.**
- Rectæ,**
- Obliquæ,**
- Spongiosæ, vt asparagorum, quam radículas illigatas & connexas, ac multis irretitas capillamētis, spongiæ & spongiolas vocant.**
- ¶ **De radicum diuisione plura leges apud Theophrastum hist. lib. 7. cap. 2. & 3. Et rursus 7. 11. Et lib. 9. cap. 13. Item in Scaligero in plantis Aristotelis, fortè & in**

Anticardano. Lib. 16. radices vocat synecdochicè pro plantis, quarum radices in usu medico sunt, &c. Herbas verò, quarum folia.

2. Pars à radice surgens in

Arboribus, simplex

Fruticibus, multiplex,

Vt sunt codex, caudex, stipes, φιτέρις, σέλεχθ.

Stolones, μοχεύματα, inutilis fructificatio è radicibus : utilis tamen plantandis nonnullis, vt

Corylo

Mespilo

Fico

Viti.

Herbis,

Caulis, καυλός

Scap<sup>9</sup>, in styli modū sursum proreptis, à columnaribus scapis.

Thyrus, rect<sup>9</sup> in virgulæ vel teli modū.

Culmus, κάλαμθ, in frumento.

E frugibus sectos, stramen, stramentum vel paleam vocant.

Virgultum furculus est, qui terræ committitur, vt in arborem insurgat.

3. Caulis

Mollis, vt amplexi caulium. C 4



# TABVLÆ STIRPIVM

Lignosus.

Leuis.

Striatus. Striæ partes sunt, quæ protuberant & eminent in longum.

Cauus.

Solidus.

Rotundus.

Angulosus.

Latus. Vnde laetuca, πλατύκαυλός.

Teres.

4. Amplexi caules,

Cum capreolis à capiendo, quibus adminicula complectitur vitis.

Cucumis.

Pepon.

Cucurbita.

Vitis.

Cultina,

Syluestris, \*

Labrusca, quæ fert ὄμφακας.

Caustica, aliàs Viburnum.

Alba, aliàs Bryonia.

Nigra.

Sine capreolis, clauiculæ.

Periclimenon

Volubilis,

Maior,

Minor.

\*

Cycla-

- \* Cyclaminum alterum.
- Casslytha, vulgo cuscuta.
- Lupus salictarius.

# 5 Cortex, cuius.

Partes

- Tunica, extrior.
- Liber, interior, in arboribus.

Differentiæ

- Planus.
- Asper.
- Hiulcus, quibusdā veluti squammatus.
- Tenuis.
- Densus.
- Colore etiam, & alijs medijs differunt.

# 6 Rami, quibusdam nodi dicti.

Maiores, tabulata. Aliqui brachia scribūt esse ramulos.

Minores, ramuli, qui in furculos, furculi in germina desinunt. Vocantur & Asparagi seu Turiones, recentia germina stirpium, & tenerrima, quæ edendo sunt: vt Cymæ olerum, brassicæ maximè, delictiores coliculi, in quibus florum calyces adhuc includuntur.

# 7 Termes, ram⁹ cū folijs & fructu. ὀφειώων.

# 8 Spadix in palma.

# 9 Crada in fico.

# 10 Viticulæ, ὀδόντες, id est dentes, & flagella

## TABVLÆ STIRPIVM

sunt, vt in vitibus & cucurbitis, oblongiores & productiores ramuli, qui longè vagantur & vicina complectuntur, olim flagella dicta, quòd ventis impetantur. Quidam etiam arborũ cymas flagella vocant.

11 Frons, pro ramo capitur, sed proprie est, quod ipse ramus circumquaq; producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis ac velut cauliculi.

12 Virga ex radicibus, aut caudicis laterib⁹ exit, Soboles quibusdam dicta.

13 In vite palmites, è stirpibus ac furculis quotannis prodeunt, dictæ quod instar palmarum hominis virgulas quasi digitos ædant.

Pampini, frondentium ramusculorum comæ, coliculiq; fructum fouentes, & ab impendente vindicantes iniuria: hinc pampinare.

Sarmenta, prælongæ virgulæ, in quas vitis luxurians spargitur, id est, Vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam dũ sunt in vite, quam dum excæta & exempta sunt.

Malleolus, nouellus est palmes, innatus prioris anni flagello, vbi deciditur ex veteri sarmento, prominens vtrinq;, & malleoli speciem præbens.

Palma.

Palma, maius flagellum, vnde nascuntur  
vuz.

Propago grüßäben/ vitis vetula depres-  
sa, atq; in terram per inflexos arcus sub  
mersa, vt ex vna plures emergant.

Gemma vel oculus, in vite & alijs etiam,  
germinis tuberculum vocatur. Vide Ca-  
roli Stephani Vinetum.

ARBORVM DIFFERENTIAE, EX  
*Theophrasti de hist. plant. lib. 1. cap.*  
*5. & deinceps.*

*Nota asterisci distincta poterant hic omitti,*  
*(quanquam Theophrastus ponat) quoniã*  
*infra repetuntur. Vt urbanae etiam & syl-*  
*uestres in differentijs locorum. Durum, læ-*  
*ue, pulchrum & contraria: corticis ferẽ*  
*aut ligni vel caudicis differentia sunt. Ad*  
*ijciuntur autem tanquam obiter, aliarum*  
*quoq; stirpium differentia.*

ARBORVM differentia, quæ cæteris etiã  
stirpibus in plurimis accommodari pos-  
sunt, sumuntur ex his generalioribus lo-  
cis, nempe

- 1 A toto, siue tota substantia
- 2 A locis, in quibus proueniunt.
- 3 A partibus singularibus. Sũt autem
- 4 Caudex.
- 5 Rami.

# TABVLÆ STIRPIVM

- 6 · Cortex.
- 7 Lignum & caulis.
- 8 Medulla.
- 9 Radices.
- 10 Nodi.
- 11 Folia.
- 12 Semina.
- 13 Flores.
- 14 Fructus.

De quibus sigillatim tabulis per numeros distinctis agemus ordine.

## ARBORVM DIFFERENTIA I.

*quæ à toto, vel quæ ad substantiam totam refertur, de qua  
Theoph. 1. 23.*

Sunt autem arbores aliæ

Vrbanae

Syluestres. quædam enim cultu deteriores redduntur, vt abies, pinaster: & in omni stirpium genere, quæ loca frigida niuosaq; adamant.

Fructiferæ, steriles.

Germine vel fructu præcoces, πρωϊ-  
βλαστῆ, πρωϊκαρπα, ὀψικάρπα.

Floriferæ, ἀνθηπικῆ. Flore carentes, ἀνὰ  
θῆ.

Magnæ,

Magnæ, parvæ. Itemque alię (quæ huc referri possunt, ex cap. 14.

Excelsæ, vt abies, & quæcunque simpliciore caudice assurgunt, nec radicibus nec ramis multis præditæ.

In profundum descendentes, (suis radicibus.)

\* In ramos illico sparguntur, vt mâlus.

\* Ramosæ, & molem superiorem grandiore gestantes, vt punica.

¶ Fiunt autem hæc singula vel

Natura

Arte & cultu.

¶ Adhęc plurimum refert alimentum, locus & cultus. Eædem enim si crebræ ferantur, excelsæ gracilesq; redduntur: si raræ contrà. Et si statim ramos succidas, excelsæ, vt vitis: si relinquoas, breues assurgent. Olera etiam nonnulla arboris figuram capeffunt. Omnia locis suis melius augescunt. nam & inter congenera, quæ suis in locis manent, enodiora, ampliora, pulchrioraq; extant. Et in totum sylvestris materies pulchrior & commodior & copiosior parte montis æquilonia, quàm meridiana enascitur.

# TABVLÆ STIRPIVM

Duræ, molles.

Laues, asperæ.

Cortice.

Folijs.

Pulchræ, deformes,

Fructus

Boni

Praui,

Syluestres quidē plura ferunt: sed vr-  
banæ meliora, suauiora, & in totum  
temperatiora.

Folia amittentes. Perpetuō virentes.

Plantæ quædam in totum folijs carēt.

A loco, differentia II.

Ex arboribus nascuntur aliæ in

Aquaticis

Paludibus, τέλμασι. Quædā palustres  
(ἐλεια) omnino sunt, vt salix, & pla-  
tanus.

Lacubus, λίμναις.

Fluuijs.

Mari

Minores, in nostro.

Maiores, in rubro.

¶ Plantæ quædam nisi in solo madente  
nasci non possunt: quædam nascuntur  
quidem, sed longè deteriores.

Aridis

Aridis

Terrenis.

Littoreis: vt ex minoribus quædam.

Vtrobique, quas amphibias dixeris, vt  
myrtum, salicem, alnum.

¶ Addi possunt vrbane, syluestres: & syl-  
uestrium aliæ montanis, aliæ planis  
gaudent, &c.

A partibus, differentia mul-  
tiplex: & primo III.  
in genere.

Arbores differunt suis partibus: sunt æ-  
cem aliæ

Generales: quoniam aliæ aliæ

Habent: sed vel

Plures

Pauciores

Dissimili modo, &c.

Non habent.

Particulares, cuius generis prima dif-  
ferentia sumitur, à

A partibus differentia III. &c.

4. Caudice: qui est aut

Procerus μακροστέλιχ.

Breuis βραχυστέλιχ.

Rectus ὀρθοφυῖ.

Con-



# TABVLAE STIRPIVM

Contortior, σκολιάτερα.

Simplex, μονοσελέχη.

Multiplex, πολυσελέχη.

Sic in herbis μονόκαυλα, δίκαυλα, ἀκαυλα. Cæterum in arboribus μονοσελέχη eadē ferē sunt quæ ἀπαλάβλαστα: & πολυσελέχη, quæ παραβλασινά.

Herbis nullus, ἀσελέχη.

Crassus, tenuis.

¶ Olea & oleaster caudicum cauitate, vitio peculiari laborant.  
cap. 13.

5 Arbores differunt ramis, κλάδοις, qui vel sunt

Multi, πολύκλαδα.

Pauci, ὀλιγόκλαδα, vt palma.

Crassi, Tenues.

Validi, Infirmi.

¶ Nodorum, qui rami maiores sunt, differentia, inferius habetur.

6 Arbores differunt Cortice

Tenui, Crasso, λεπτόφλοια, παχύφλοια.  
Λαυί,

**Læui, Aspero.** λειόφλοια, Τεαχύφλοια.

**¶** Quædam dum adoleſcunt læui ſunt cortice, cū ſenuerūt, aspero.

**Diſſectō, vt vitis,** ριζόφλοια, quibus cortex radicis ſpeciem gerit, Ga-  
za. Ego ριζόφλοια legerim.

**Deciduo, vt potulaca, arbutus.**

**Carnoſo, vt ſuber, populus,** σαρκώ-  
δει.

**Neruoſo & macilente)** ἰνώδει κ' ἀ-  
σάρκω) vt vitis, (arundo, triticum.)

**Multiplici tunicis,** πολυλόπῳ, vt ti-  
liæ.

**Simplici tunicis,** μονολόπῳ, vt fici,  
arundinis.

**7 Arbores differunt ligno et caulibus**  
ιδέῃ vel

**Partibus.** Sunt enim aliæ vel alia

**Carnoſi, vt roboris, fici,** σαρκώδεις.

**Macilenti,** ἀσάρκοι, vt cedri, cu-  
preſſi.

**Neruoſi,** ἰνώδεις, talia enim ligna  
ſunt abietis & palmæ.

**Enerues,** (In Græco eſt μανὰ.)

**Venoſa,** φλεβώδη.

TABVLAE STIRPIVM

Venis priuata, ἀφλεβα.

Et insuper inter frutices & suffrutices caulis quarundam est,

Geniculatus, arundini

Spinosus, rubo.

Inseptus (indistinctus) et equalis,

ἀδιάφρακτος ἢ ὁμαλός, iunco.

Qualitatibus, vt

Duritie, Mollitie.

Lentitia, Fragilitate

Leuitate, Grauitate, &c. Suber viride statim leue est : salix sicca, buxus & ebenus ne siccae quidem. Buxus & ebenus grauius sunt densitate: robur, quia terrenum.

Item quod alia sunt.

Fissilia, ἑυχίσα, vt abies propter meatuum rectitudinem.

Fragilia, ἑυθεύσα, vt olea : propter obliquitatem & duritiem materiae.

Enodia, ἄοζα, vt sambucus.

Nodosa, ὀζώδης, vt abies.

Flexibilia, ἑυκαμπτα, vt tilia propter humoris lentitiam.

8 Arbores differunt Medulla, *μήτεα*, quoniam alia

Ha bent, eaque vel

Carnosam, vt vitis, sambucus.

Lignosam, vt abies, pinus : & quidē hæc præcipuè quod tædæ plurimum in se gerat.

Duriorem & spissiore, cornus, ilex, robur, cytisus, morus, celtis. Harum omnium, Medulla nigra est, & durior ligno suo, ideoque flecti non sustinet. In robore priuatim melandryon vocatur à colore nigro.

Solutiorem, *μαυοτέραν*.

Minus solutam.

Membranis similem, *ὑμενώδη*, vt

Arundo,

Ferula, & alia inter fruticosa vel suffrutices.

Arbores verò nullæ vel raræ.

Magnam & perspicuam, vt ilex, robur, & aliæ prædictæ.

Incertiorem, (minus conspicuam) vt olea, buxus, haud enim ita in his distincta spectatur. Quamobrem sunt qui eis medullam non in medio, sed per totum lignū dispersam esse affirmant.

# TABVLÆ STIRPIVM

Nō habāt, vt videtur, sambucus & palma.

9 Radicibus differunt arbores. Sunt enim alijs. Cap. 9.

Multæ longæq; vt fico. καὶ μακρόρριζα.

Paucæ, vt punicæ, malo. πολὺρριζα, ὅλιγα  
γόρριζα.

Crafsiores. Tenuēs omnes, vt viti. Inæ-  
quales, vt lauro.

Vna, μονόρριζα, vt abieti, pino : ita vt

vna prægrandis in imum descendat,

paruæ aut complures ab ea exeant.

Harum rursus quædam mediam ra-  
dicem

Maiorem & profundiorē habēt,  
vt amygdala.

Paruam; cæteras verò grandiores  
contortioresq; ὡς περ κεκαρκευ-  
μμένας, vt olea.

Læues, Asperæ.

Saræ, Spiissæ & diuersæ. Omnium qui-  
dem radices rariores corpore parti-  
bus superioribus sunt.

Neruosæ, ἰνώδεις, vt abietis. Carnosæ,  
vt roboris.

Nodosæ villosæq; ὀζώδεις καὶ θυσατώ-  
δεις, vt oleæ. Tenuiores enim radi-  
ces multas & conferetas emittit.

Αἰτα,

• **Altæ**, vt robori, βαθύρριζα. Fico radices profundiores: item omnibus raris & rectâ descendentibus. Stirpes circa vigorem longiores & profundiores radices habent quàm vetustę. Summæ terræ adhærentes, vt malo, cupresso, επιπλαϊόρριζα. Profundiores quidem & simpliciter longiores fiunt, si solum sit leue, rarum, & facilè transmeatu.

**Rectæ & æquales.** Obliquæ & inæquales, idq; natura, vt lauro, oleę, non tantum loci obstantis ratione, vt fico & alijs.

**Prolem** fursus versus procreant, vt vitis, ωδραβλασι καὶ εἰς τὸ αἶνω. Non procreant, vt abies, ἱπαράβλασα.

¶ **Radices omnes medullam habent**, vt & caudices & rami. Omnes prius crescunt quàm superiora: nec altius descendunt, quàm Sol penetrat.

¶ **Suffruticum quoque, herbarum, reliquorumque**, eadem ferè differentię sunt: nisi quæ penitus radice carent, vt tuber, fungus, cranium.

**In cæteris enim Radices vel sunt** Cap. 10. & 11.

# TABVLÆ STIRPIVM

Numerosæ, vt tritico, ordeo, tiphæ, et huiusmodi. Πολλὴ ῥίζα.

Paucæ, vt leguminibus.

Singularis, vt maiori parti olerum, sed quædā propagines (ἐπιφύσσας) magnas subgerunt, vt apium, beta: quæ pro corporis sui ratione altius quàm arbores sanè radican-  
tuntur.

Carnosæ, vt raphano, aro, betæ, asphodelo, croco, perdicio, vingo in Ægypto: & arachidnæ, &c. silphio, magydari.

Magnæ & carnosæ, vt ferulaceis.

Lignosæ, vt erucæ, ocymo: & syluestribus magna ex parte, quibus non protinus plures & fissæ exeant, vt tritico, ordeo, & priuatim dictæ herbæ. (his enim statim finduntur.)

¶ Annua & herbacea omnia radicib, vel Statim fiduntur in partes æquales.

Vnam aut duas magnas emittūt, & quibus prodeunt minores.

Quædam quasi ex carne & cortice constantes, vt raphanor ū & raporum (cartilagineæ Plinio.)

Geniculatæ, vt graminum, & omnis generis harundinacei, caulibus seu calamis suis supra terram similes.

Tunicis multiplicibus constantes & corticosæ

ticofæ, λεπυρώδεις ἢ φλοιώδεις:  
 vt scillæ, bulbi, cepæ. Videntur autem  
 hæc omnia, & in vniuerfum quæcun-  
 que capitata terraque condita sunt,  
 (κεφαλοβαρῆ καὶ κατὰ ῥίζα, malim,  
 quæcunque capitata sunt, & radículas  
 à capite deorsum duntaxat emittunt)  
 duplex quodammodo genus radicis  
 habere: nempe carnosam illam & cor-  
 ticosam: & eas (minores fibras) quæ ab  
 illa proueniunt. Videntur enim toto ge-  
 nere differre, non crassitie tantum & te-  
 nuitate vt in alijs radicibus. Aut fortè  
 caput illud quasi cyma seu fructus est:  
 non enim omne quod infra terram, ra-  
 dix est, vt neque tuber. Fibræ verò tan-  
 tum quæ deorsum dependent, propriè  
 radiculæ.

Magnæ, frequentes & validæ, vt capitatis  
 iam dictis, item gramine & harundina-  
 ceo generi.

Radicibus præterea

Succi omniū insuauiiores (λεινόπικτοι)

quam in fructu suo habentur, & qua-  
 rundam amari cum fructus dulcis sit.

Hinc fit vt radices quædam sint.

Medicatæ, φαρμακώδεις.

Odorata, θυώδεις, vt iridis.



## TABVLÆ STIRPIVM

Radices quædam aliquid singulare habent:

Vt quæ prodeunt

E germinibus, vt in fico Indica (cuius germina ad terram reflectuntur, radicanturnq; in toto circuitu, ita vt caudicem non attingant.)

E folijs, vt in herbula quadam circa Opûnta, quæ etiam suavis in cibo est.

Lupinum terram amat, terraq; operiri non vult, Plin. 18. 14. Et mox, Tellurem adeò amat, vt quamuis fructuoso solo coniectum inter folia vepresq;, ad terram tamen radice perueniat. (Gaza ex Theophrasto, aliter vertit, nec placet.)

10 Arbores differunt Nodis, ὀζοις.

Sunt enim arbores aliæ

Nodosæ, ὀζώδεις, vt olea, pinafter, oleaster, idque vel

Natura. Sic paucos nodos habent sambucus, laurus, ficus, & omnia quibus cortex læuis, quæuè concavo & laxo corpore surgunt. Spissæ etiam materiæ arbores, nodosiores quam

quàm raræ sunt: item rarius confitæ  
nodosiores, breuiores, contortio-  
resq; , quàm densius confitæ.

**L**oco, nam quæ in vmbrosis & à vento  
silentibus & dilutis locis nascuntur,  
ferè enodia sunt: contraria verò, no-  
dosæ, Montanæ campestribus, & sic-  
cæ palustribus nodosiores. Sylue-  
stres vrbani, tum simpliciter, tum  
congeneres.

**E**nodes, *ἑνόζοι*, id est, paucis nodis præ-  
ditæ : nam prorsus enodes stirpes  
nullæ sunt in arborum genere: sed  
inter palustria, vt iuncus, tipha.

**N**odi quibusdam

Inordinati, *ἄτακτοι*, & vt fortè euenit.

Ordinati, *τεταγμένοι*, tam interuallo  
quàm numero, ob id eas egregias  
vocant, *δένδρα ἀξιολογώτατα*.

Constant enim aliæ nodis

Binis, *διόζα*.

Ternis, *τερίοζα*.

Pluribus:

Quinis, *πεντάοζα*.

Pares ferè vndiq; magnitudine.

Afsiduè grandiores, quo propius cras-

# TABVLÆ STIRPIVM

fiori adiacent parte, vt in oleastris apparet, & in arundinibus, quarum geniculus veluti nodus est.

Inuicem respondentes κατ' ἀλλήλας, vt oleastrorum.

Promiscui, ὡς ἔτυχεν.

Recti & quodammodo infixi tum nodi, tum rami, abieti, ceteris minimè, quam obrem abies validissima est.

Faciebus belluarum similes, mālō peculiariter, est enim vnus prægrandis, alij circa eum parui complures.

Cæci, τυφλοί, quibus nullum germen nasci potest, idq; vel

Natura

Læsione,

Fiunt autem cum pars arboris ictu lesa, ad vulnus consolidandum enitens, oris vndique plagis circumactis, callo cicatriceq; tumuerit. Hoc crassioribus ramis potissimū euenit, nonnunquam etiam caudicibus.

Fœcundi, γόνιμοι.

¶ Quibusdam veluti cradæ (nam propriè dicta cradatio, κράδιον, fîco euenit, cūm rami eius quos cradas peculiariter vocant, ardescunt.) gignuntur, ceu vlmo, robori,

bori, & præcipuè platano, quæ si asperis, aridis, ventosisq; locis stent, ita omnino fiat necesse est.

Ramus proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput, senescens crassior reditur.

¶ Nonnullæ gongros à quibusdam vocatos habent, vel simile quid pro arboris natura. Gongrus enim oleæ fermè peculiaris est morbus, quem alij premnum, alij crotonam, alij aliter nominant. Rectis vniſtirpibus minusq; ab imo plantigeris, id aut nullo pacto, aut minus accidere solet.

Ramuli omnium nodosiores semper videntur, quod minimum ijs internodium interiacet: vt ficulnei qui nuper prouenerint, & vitis palmitum sumitates. Est enim gemma in vite, vt geniculum in arundine, nodus in cæteris.

II. Arbores vel plâte differût folijs, φύλλοις.

Secundum hæc enim Plantæ

Aut semper virent, vt

Arbores

Urbanæ: Olea, palma, laurus, myrtus, pini, (πέυκης,) genus quoddam, cupressus.

Syluestres: abies, pinaſter, iuniperus, smilax (taxus Plinio) thuia,

## TABVLAE STIRPIVM

phellodrys, tilia, cedrus, picca, myrica, buxus, ilex, aquifolia (*ἀγρία*) celastrus, philyra (*φιλύκη*) acuta spina, aphaea (quæ monte Olympo proueniunt.) Item terebinthus, laurus. ¶ Potulaca & arbutus, cacuminibus perpetuò virent, folia inferiora dimittunt.

Frutices, edera, rubus, harundo, rhamnus, cedrula.

Suffrutices herbæq;: ruta, brassica, rosa, abrotonum, samfucum, serpyllus, papauer, & complura syluestrium. ¶ Origanum, apium, equapium, cacuminibus perdurant, amissis reliquis. Ruta etiam affligitur atq; mutatur.

¶ Omnia quæ perpetuò virent, folijs angustioribus sunt, & pinguedinē quandam suauemq; olentiam reddunt Sed hæc quoq; non semper eadem durant, verum alia proueniunt, alia exarescūt, idq; circa æstiuum solstitium.

¶ Nonnulla quanquam sua natura semper virere nequeūt, tamen ex loci causa folia nunquam dimittunt, vt quæ in Elephantino agro & Memphi proueniunt, &c.

Aut folia abijciunt. Omnes quidem autumno ●

tumno & per autumnum, sed aliæ

Ocyus. ¶ Decidunt sorbo vniuersa,  
cæteris paulatim, Plinius.

Tardius, vt quædam etiam ab hyeme  
occupentur.

¶ Quædam germinant præmaturius,  
& tamen tardius folia dimittunt, vt  
amygdala. Quædam ferè germinant,  
nec tamen tardiùs abijciunt, vt  
morus.

¶ Regio solumq; madidum ad perdu-  
randum conferunt. In siccis & om-  
nino tenuibus locis natæ, prius fo-  
lia deperdūt, & veteres priusquam  
nouæ: quædam & antequam fru-  
ctum percoquant, vt piri syluestres.

Folia aut sunt

Sibi dissimilia, vt quæ

Noua orbiculantur, veterata in an-  
gulum exeunt (in quod omnium  
mutatio desinit) vt populi, cro-  
tonis.

Edera contra.

Verrunt partes supinas mox post  
solstitium æstiuum

Olea

Tilca

Vlmus

Populus.

## TABVLÆ STIRPIVM

Sibi similia , vt in cæteris arboribus omnibus.

Ampla seu lata: viti, fico, platano.

Angusta, oleæ, punicæ, myrto.

Rara, vt pino, abieti, cedro, *σπανόφυλλα*, Plinius *τριχόφυλλα* legit, vertit enim capillata, pino, cedro. Rara verò inferius, vt sequetur.

**Carnosa**, quia constant pulpa

In rotunditatem

Cupresso, myricæ, Arboribus,

Cneoro, stæbe, Fruticibus,

Sedo, polio, Herbis.

In latitudine, vt betæ, brassicæ, rutæ.

**Harundinacea**, *καλαμόφυλλα*, vt palmæ, coici, cæterisq; similibus, quæ folijs angularibus constant, vt harundo, gladiolus, butomus, & cætera palustria. Horum folia quasi ex duobus constare videntur, mediumq; veluti carinam habere, vnde & cæteris meatum medius amplius porrigatur.

¶ **Omnia** folia parte prona supinaq; inter se distant: ac cæterorum pars supina viridior leuiorq; est: neruulos enim & venas in pronis habent, vt manus. Oleaginum verò pars ea ipsa candidior, minusq; leuis. Edera quoq; frondes leues supernè

supernè habet ( Neruos callum & articulos superius habent , incisuras verò subter, vt manus humana, Plin. )

¶ Omnium folia quotidie ad Solem oscitant, interiores (inferiores, pronas) partes tepe fieri valentia, Plin. Theoph. vt sæpè dubium sit ytra pars potius ad ramulum vergat, &c. Theoph.

Differunt figura

Angularia, γωνιόφυλλα. Vide Harundinacea.

Orbiculata, vt piri.

Oblonga, vt mali.

In acutum producta , & in angulum depressa, vt similacis, εἰς ὃξὺ προήκοντα, καὶ παρὰ γονύζοντα. Plinius vertit angulosa ederæ.

Multifida & quasi serrata, εὐχιστα, καὶ οἷον πριονώδης, vt abieti, filici. Insecta pectinum modo, piceæ, abieti, Plin. Vitis quoque aliquatenus fissa, (χιστα) laciniata &c ( vt ita dixerim ) cruciformia σκολοπώδης.)

Insecta, (ἐντομαὶς ἔχοντα) vt vlmi, roboris, coryli.

Cum extrema, tum lateribus sinuata (πα



# TABVLAE STIRPIVM

*εγκαθίζοντα*, vt ilicis, roboris, smilacis, rubi, paliuri. (Sinuosa toto ambitu robori: spinosa cute, rubo, Plin.)

Extremitate pungentia, pini, laricis, abietis, cedri & cedriæ. (Plinius legit agriæ, id est aquifoliæ.)

Spinas pro folijs arborum nulla habet, sed inter suffrutices *φυλλάκανθα*.

Acorna.

Drypis.

Acanus.

Et omne ferè genus spinosorum. His enim omnibus loco folij spina oritur. Quod si quis hæc folia esse negauerit, carere folijs ea omninò sequetur, vt quædam aculeata quidem sint, folium verò habeant nullum ceu asparagus.

Differunt pediculo, alia enim  
Habent

Longum, vt vitis, edera,

Breuem,

Tremulum, vt populi folia, quæ & sola inter se crepitant, Plin.

Adnexum, vt platanus, vitis.

Quasi infixum, vt olea.

Carent, vt scillæ, bulbi, *ἀμύχα*.

✱

Prodeun-

**Prodeuntia ex**

Germine, plerisq;

Ramis

Caudice, vt robori.

(Caule, in suffruticibus quibusdam & herbis.)

Radice illico, oleribus plerisq;, vt intybo erratico, cæpe, allio, & bulbosis omnibus, quorum non solum quod primò oritur, verum etiam caulis omnino sine folijs est. Quorundã folijs iam perfectis caulis assurgit, vt lactuce, ocymi, apij & frumentorum. Item nonnulla ex his caulem primò mitem, post horridulum spinis gerūt, vt lactuca & cuncta folia spinosa redduntur. Atq; etiam magis in fruticum genere, vt rubus, paliurus.

Mali quodam in genere parua medijs pomis emicant folia, interim & gemina, Plinius,

Multa, pauca.

Lata, Angusta.

Plinius aliter: Iam densa ac rara, semperq; lata rariora.

Ordinata, Myrto. Inordinata plerisq; alijs, (pomis, Plinius.)

Concaua, in genere olerum, cæpa, gythyã.

E

# TABVLAE STIRPIVM

Aspera, Læuia, Aculeata. Sine aculeis.

Fructum interceptum gerentia, vt laurus Alexandrina quæ fructum super folijs gerit.

Ramulosa, vlmo, & cytiso, Plin.

12. Arbores differunt seminibus. Theoph. lib. 1. cap. 18. Plin. 15. 28. ¶ Semen partium omnium postremum est; hoc humorem caloremq; insitum in se habet: qui cum desierint, semen infœcundum sicuti vrinum ouum relinquitur.

Quorundam semen protinus post tegmen ambiens subest, vt palmæ, nucis, amygdalæ, quibus ambientia plura utique sunt, ceu palmæ.

Quibusdam caro & nucleus interiacent, vt oleæ, pruni. ¶ Huic distinctioni fortè eadē est, \* quæ paulò post sequetur: Semina (inquit) quibusdam protinus carnosæ, ceu illa quæ nucum & glandium genere cōprehenduntur. Quibusdam caro in nucleo est, ceu oliuæ, lauro & alijs.

¶ Hæc obscuriora videntur: & nihil tale lego apud Plinium.

Non desunt quibus in nucleo tantum, vel nucleacea & quasi retorrida cōstet, ceu cnico & similibus: nec non & multis oleribus.

*Hæc sunt  
obscura.*

oleribus. Palmæ quidem euidentiſſima.  
Cauitatem enim nullam habent, ſed tota  
plena atq; perſolida ſunt : quanquam his  
quoq; humor quidam calorq; ineſt.

Semina quædam

Includuntur

Siliquis *λεβοῖς*, vt

Annua quædam.

Legumina, & ſylueſtriū alia cōplura,

Arbores, vt ſiliqua, cercis & colætia,  
circa Liparam.

Folliculis, *ἐμῖνι*, ex annuis quædam, vt  
triticum, milium.

Vasculis, *ἀγγεία*, *ἰσχυρότερα*, vt papauer  
& ſimilia: nam ſeſameꝝ modus quidam  
peculiaris eſt. ¶ Nullum in vaſculo  
ſemen arboris eſt, niſi conum vaſcu-  
lum dixeris, quod abſolui de fructi-  
bus poteſt.

Nuda

Sunt, vt olerum pleraq; , anethum, co-  
rianiſum, ſœniculum, &c. *χυμρόπερμα*.

Arborum nulla ſemine nudo eſt, ſed ob-  
ducto aut

Carne

Cruſta vel cute pelliculari ceu glāz  
& euboicum (id eſt iuglans.)

Lignofa, ceu amygdala & nux (aucl  
lana ſcilicet. E 2

## TABVLAE STIRPIVM

Congesta atq; promiscua, ἀθρόα μετ' ἀλλήλων. Et horum quædam

Putamine aliquo communi aut tunica continentur, vt punicæ, mali, piri, vitis, fici.

Nullo communi (teginine) includuntur: vt ex annuis spicata, nisi quis spicam ipsam ambiens quoddam esse putarit. Quod si ita sit, racemus quoq; in se habebit, & reliqua quæ racemata æduntur, quæq; vniuersa ob fertilitatem virtutemq; soli prodeunt: quemadmodum in Syria & alibi oleas fructificare affirmant.

Discreta atq; distantia (διεσώτα καὶ χεῖρ' ὄν:) vt cucurbitæ, cucumeris: & inter arbores, fici, mali. (Sed ficum & malum inter ea etiam numerat quæ congesta aliquo communi tegmine continentur.) ¶ Plinius videtur pro hac diuisione hæc verba posuisse: Quædam inter se densa, vt vux, forba: quæ ramos circundata ex omni parte vuarum modo degrauant. Alia rara, vt in persicis. Quædam aluo continentur, vt granata.

Dependent alia congesta

Pediculo vno & singulari, vt de racemis  
spicisq;

spicisq; diximus (vux omnes in scapo vno, &c. grana in vna spica.)

Secus, vt grana punici, vbi vnumquodq; semen seorsim acceptum, principium annexus propriū habere videtur. In ficubus id minus euident est, quod earum grana nimio humore conculcentur: Qui quidem humor in eis vnus granis omnibus communis est: in punicis verò su<sup>9</sup> cuiq; grano peculiaris humor inhæret.

¶ Plinius hunc locum, ita voluisse reddere (aut saltem imitari) videtur. De pendent alia pediculis, vt pira. Alia racemis, vt vux, palmæ. Alia & pediculis & racemis, vt ederæ, sambuci. Alia ramo adhærent, vt in lauro. Quædā vtroq; modo, vt oliuæ: nam & breues pediculi & longi. Hæc ille. Sed præter Theophrasti sententiam: fructuum enim hæc potius quàm seminum distinctio est.

¶ Differentiæ secundum figuras totasque formas omnibus ferè exploratæ habentur, vt explanatione nō egeāt. Vnū hoc dicemus, quod fructus nullus rectilineus, neq; angularis.

13. Arbores differunt floribus. Sunt autem alij, Cap. 21. lib. 1.

# TABVLAE STIRPIVM

Lanugini, *χρυσάδεις*: vt vitis, mori, edera.

Foliati, *φυλλώδεις*: vt amygdalæ, mali, piri, pruni.

Grandes satis, (vt cucurbitis.)

Puilli, vt oleaginei, quanquam foliati.

Vnicolores Bicolores.

¶ Arborum quidem flores pleriq; unicolores & candidi sunt, punicæ tantum phœniceus, & amygdalis quibusdam rubicundi. Ex urbanis alia nulla bicolor: & si quæ sit, sylvestris fuerit, vt abies, cui flos croceus. ¶ Annorum flores pleriq; bicolores exeunt, & duplices, (*διπλῆς*.) Duplices dico, quod in flore alterum florem insidentem medium gerunt, vt rosa, viola nigra, liliū.

Nonnulli folio vno emergunt (*μόνονφυλλα*.) descriptionem tantum plurium ostendentes, vt flos iasionæ, &c. Oleæ quoq; flos penè talis est.

Copiosus & creber est punicæ, & amplitudinem sui quodammodo poni æmulatur.

Plantarum congenerum aliæ

Florent, vt palma mas.

Non florent, vt palma fœmina, quæ protinus fructum promit.

Simplices & steriles, ceu

Cucu.

Cucumerum, qui postremis sarmentorū  
emergunt.

Mali medicæ, illi qui velut colum quan-  
dam in medio non habent.

Genus etiam vitis quoddam & punicæ,  
fructum perficere nequit, sed ad florem  
vsq; generatio tantum peruenit.

Differentes situ, nam alia, cap. 22.

Florem circa fructum ipsum producant,  
vt vitis, olea: cuius postremi flosculi  
perforati spectantur.

Complura fructū in medio floris tenent.  
Super fructum ipsum florem insidentem  
emittunt, vt punica, mālus, amerina,  
prunus, myrtus. Et in fruticum genero  
rosa, maiorq; pars coronariarum: se-  
men enim sub floribus habent, quod  
potissimum in rosa conspicitur.

Simili modo & herbaceorum nonnul-  
la, vt gith, (anthemion.) Et in olerum  
genere pepo, cucurbita, cucumis. Om-  
nibus enim flos in postremo fructus, &  
crescentibus fructibus flos diu infixus  
seruatur.

Cum seminibus ipsis flores ædunt, vt aco-  
rus, enicum. & omnia quæ florem folio  
numerofo producant. (πάντα τὰ ἐκλάδου.)  
Singulis enim seminibus singulos flo-  
res annexos gerunt.



# TABVLÆ STIRPIVM

Peculiari quodam modo florem in totis fructibus habent, neq; postremis insidentem, neq; in singulas partes ambientem, sed in medijs inculcatum, nisi fortè concerni nequeat propter lanuginem:ceu edera, morus.

14. Arbores differunt fructibus, quos gignunt, aliæ ex

Surculis

Nouellis, vt ficus & vitis.

Annotinis, vt olea, punica, mâlus, amygdala, pyrus, myrtus, omnesq; ferè similes.

Vtrisque, vt mali biferæ, & si quæ alia bis fructificat.

Caudice, vt morus *Ægyptia*: quam tamen alij ex grandibus ramis fructificare aiunt.

Grandibus ramis, vt siliqua arbor, quæ ficus *Ægyptias* producit.

Cacuminibus, ἀκρόκαρπα: plura ex alijs quàm ex arboribus, vt

Frumentorum quæ spicâ pariunt.

Fruticû, erica, piræa, amerina.

Olerum, quibus radix capitata.

Lateribus, πλαγίόκαρπα.

Parte vtraq;, tam arborum quædam, vt  
olea

olea aliquando, quod copiae indicium  
esse fertur: quàm olerum, blitum, attri-  
plex, brassica. Palma etiam fructu quo-  
dammodo cacumine gignit, vt & folia  
& germina.

¶ Fructuum differentias secundum odo-  
res, sapores, & consistentiam: quære su-  
pra, vbi inter partes similes primas  
de humore diximus.

Finis diuisionum in primum Theo-  
phraستي librum, de historia plan-  
tarum, anno 1552.

TABVLA DE FRVCTIBVS AR-  
*borum, ex Plinij lib. 15. cap. 24.*  
*potissimum:*

Fructus arborum aut sunt foris  
Carnosi, vt

Poma in genere dicta, (ὄπῳρα.)

Mâla tum reliqua, tum cotonea per  
excellentiam μήλα dicta: & in alijs  
generibus, persicum, medicum siue  
citream & punicum: cuius tamen  
non caro sed acini, nec foris, sed in-  
tus, edendo, sicut & citrei, nō quod  
foris est, sed pars interior succo &

## TABVLÆ STIRPIVM

carne constans, edi solet, &c. Coton-  
neorum alia m̃alis, alia piris propiora  
sunt.

Pira, pruna, è quorum genere & Armo-  
niaca sunt.

Mespila, sorba fructus Perseæ.

Ficus communis, Cypria, Ægyptia (an  
ad Mora?) Palmulæ & muza dicta.

Myxa (& Sebesten.)

Aliud corpus est terrestribus fragis, a-  
liud congeneri eorum Vnedoni.

Cerasa medio inter baccas acinosque  
genere.

**Mora**

Arborũ, cõmunia. (An alia Ægyptia?)

Ruborum, communis, chamæbati, L-  
dæi duplicis.

Acini, vt vuarum, ederæ, sambuci, ( Ri-  
bes vulgò dicti, &c.) Punici mali aci-  
ni soli & interius sunt & angulosi: nec  
cutis vlla singulis, præter commu-  
nem, quæ est candida, totisque suc-  
cus & caro est, ijs præcipuè quibus  
paululum inest ligni.

Baccæ, vt oliuæ, lauri, corni, myrti, len-  
tisci. Aquifolij quidem & spinæ (albæ  
nimirum hodie cognominatæ) sine  
succo. ¶ Baccæ & acini quid differât

non

non satis explicauit Plinius: sed videntur acini complures simul iungi, minores plerunq; & succulenti: baccæ pauciores & sicciore ferè, &c. Germanica lingua discrimen non habet. De baccis vide plura apud Plin. lib. 15. cap. 28.

Medio inter baccas acinosq; genere, pomis adnumerauimus. ¶ Taxi fructus sui generis est. ¶ Frutices pleriq; acinos ferunt, pauci fortè baccas.

Duri, & ceu crusta operti, testâue.

Nuces

Iuglandes

Auellanæ (Pistacia.)

(Balanus, Myrepfica,) nux muscata vel myristica, simili iugladiû, operimêto.

Amygdalæ, tenuiore sed simili iuglandi um summo operimento secundo putaminis (ligni scilicet.) Nucleus dissimilis latitudine & acriore callo. ¶ Persicum fortè inter poma nucasq; ambigere dixeris.

Nuces pinj aliarumq; coniferarum: & oxyæ vulgo fagi: Nux cupressi, piceæ, pinastri, piceastri, &c. conipotius quàm nucas dici debent,

¶ Hæc verè ostracodermis animalium conferri possunt, ob testam duriorrem. ¶ Nux Indica, Nux vomica.

## TABVLÆ STIRPIVM

Glandes: quarū minus dura est crusta, ceu malacostracis animalium. Glandi ferarum arborum diuersæ sunt species, vt quercus, robur, escul<sup>9</sup>, cerrus, suber, ilex, fagus veterum Græcorum.

Nuces vocamus & castaneas, quanquā accommodatiores glandium generi. Armatum echinato calyce vailū, quod inchoatum in glandibus, Plinius.

Balanus cognomine myrepfica, inter nuces est.

¶ Anucum natura haud procul abesse videtur & prædulces siliquæ, nisi quod in ijs cortex ipse manditur, Plinius. vulgò S. Iohannis panem vocant. Huc & siliqua Ægyptia vel atra quibusdam cognominata cassia hodie medicis, pertinet. Arbores quidem tam paucæ siliquas gerunt, de vna & altera tantum Theophrastus ac Plinius id prodiderunt, nempe Colutea, ni fallor: sed Anagyris quoque & laburnum siliquas habent: & Acacia. Sicut & in pappos abire fructum, soli arborum coggyriz Theophrastus: quod tamen in vite syluestri & in cotino nos obseruauimus.

TABVLA DE IIS QVAE E RO-  
bore nascuntur, ex lib. 9. Theophra-  
sti hist. Cap. 8. & 9.

Robur, *σπῦς*, arborum omnium præter fru-  
ctum suum alia plurima gignit, vt  
Gallam

Paruulam, (& læuem)

Resinosam aliam & nigram.

¶ Galla deterrima ex robore : signum  
eius quòd cauernæ translucent, Pli-  
nius.

Mori specie quiddam durú & fractu dif-  
ficile, id tamen rarum.

*Αιδουώδες*, id est, esngie colis quiddam,  
quod cū perficitur, durú quid parte e-  
micâte & perforatú, & tauri caput quo-  
dammodo æmulans profert: id perru-  
ptum nuclei oleæ speciem initium o-  
stendit.

Pilum, *πίλον*. Hic pilula est lanacea, *σπας  
είον έρωδες*, Plinius videtur legisse  
*καρυώδες*. Mollis, sed nucleo (*περιπυ-  
ρνής*) durior, qua in lucernarum lu-  
minibus vtantur. Flagrant enim probe,  
vt galla nigra. (Nascuntur in eo & pi-  
lulæ nucibus non absimiles, intus ha-

## TABVLAE STIRPIVM

bentes flocculos molles, lucernarú luminibus aptos: nam & sine oleo flagrat, sicuti galla nigra, Plin.)

¶ Pilulam comigerá, cætera inutilem, ver-  
no autem tempore succo melligeno in-  
ficiantem tum tactu tum gustatu.

Pilulam aliam in ramorum alis sine pedi-  
culo, concauoq; sessilem, peculiarem,  
versicoloremq;. Nam eminentes quos-  
dam umbilicos candicantes, vel passim  
variantes nigris maculis habet: partem  
mediam cocci tinetura infectam splen-  
didamq; ostendit. Aperta, nigra & pu-  
tricans cernitur. (Φύει δ' ἐντεριώνης  
τῆς ῥοπαῶν μαχαλίδας ἕτερον σφαι-  
εῖον ἄμυχον καὶ κοιλόμυχον.) Gignunt  
& alæ ramorum eius pilulas, corpore  
non pediculo adhærentes, candicantes  
umbilicis: cætera nigra varietate disper-  
sa. Media cocci colorem habent. Aper-  
tis amara inanitas est, Plin.

Pilulam è folijs cōuolutam, compressam  
atq; oblongam.

Pilulá super folijs tergo adhærentē, candi-  
cantem, translucidam & aquosam dum  
tenera est. Hæc etiam muscas interdum  
intus continet, veniensq; ad incremen-  
tum

tum iustum, in modum lævis paruulæ gallæ indurescit. Sed hæc rarerè adna scitur. (Et in folio rubente aquosos nucleos candicantes, &c. Plin.)

● Pilulæ diuersæ (σφαῖρά) quinq; generū & cachrys sexta. Sed & cætera omnia (præter lapillum fortè) pilulæ dici posse videntur à figura.

Lapillum, pumiceū ferè, (πίον περὶ δὴ) sed rarò. (Aliquādo & pumicos gignit, Plinius.)

Horū quædam Gaza obscurius transtulerat. Transtulit & Pli. 16. 7. sed quædā omisit: in quibusdam differt, vt annotauimus.

Ferunt robora & cachryn, (quæ postquā folia decidere, hyeme durat in platano quoq;, nuce, tilia, picea, larice, abiete.) Est autē pilula in medicina vrendi vim habens, &c. Plin. An cachrys etiam flos quercuum?

Fungi è radicibus & iuxta radices.

Viscum. Sed hæc duo, fungi & viscum, cū alijs etiā arborib. cōmunia habēt, Theo.

Item mel & apes teste Hesiodo. Nascitur autē hic melleus humor cælo cadēs, nec alijs magis infidet frondibus, Theoph. Videtur autē drosomeli, id est, mannā intelligere.



# TABVLAE STIRPIVM

Quin & cremati roboris cinerem nitro-  
sum esse affirmant, Theoph. interprete  
Gaza Sed Græcus textus habet, ex  
robore cremato nitrum fieri. Ga-  
za pro καταπολυσθῆ rectè  
κατακαυσθῆ.

DE COL-

## DE COLLECTIONE

STIRPIVM IN GE-

NERB.

*De colligendis stirpibus ex præfatione  
Dioscoridis.*



ANTE omnia curandum est, vt tempestiuè legantur & seruentur omnia. Ex hac siquidem obseruatione efficacia sunt aut euanescent medicamenta omnia. Serena itaque tempestate colligi debent. Refert enim magnopere ne à siccitate aut imbribus legantur: & vt è montanis, ventosis, frigidis, nec vliginosi locis, potius quàm contrarijs petantur. Nam quæ in campestribus, vliginosi, vmbrosis nec vento perflatis proueniunt, plerunque ignauiores sunt: Multòq; magis quæ non sua tempestate & importunè lecta fuerint, aut infirmitate distabuerint. Nec ignorandum illud etiam, sæpenumero hæc ipsa loci proprietate & anni temperamento, ocys aut serius in integram ætatem absolui.

EX EPISTOLA HIPPOCRATIS  
*ad Cratenam.*

F

## DE COLLECTIONE

Tu quo ad fieri potest, nobis montanas maximè & in altis collibus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosioribus solidiores & acriores, propter terrę densitatem & aëris tenuitatem. Nam quod attrahunt frigidius est. Conare tamen vt etiam de his quę circa stagna nascuntur, & de palustribus, fluuiatilibus aut fontanis, flores colligas : quas sanè debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio.

Et inferius, Sed & herbis multa reptilia venenum immittunt, & hiatu suo internæ ipsarum teneritudini adflictionem pro auxilio inspirant. id quod latet, nisi sanè nota aliqua aut macula, aut odor ferus & grauis, rei factę indicationem fecerit.

## DE COLLIGENDIS HERBIS, EX *lib. 1. pharmaco. Jac. Syluij.*

Ex herbis plurimæ solùm virides in vsum recipiuntur, dum hæ vel harum succi in syropos coquuntur, & in apozemata, clysteres, fots, cataplasmata, & alia id genus, in quos vsus postremos quouis tempore leguntur. In syropos autem, vel formam aliam toto anno seruandâ, sunt legendæ quando sunt efficacissimæ, cum scilicet florent,  
aut

aut etiam semine iam plenæ sunt, vt fumaria, calaminthe, & aliæ ex sequentibus in syrupos vel alia composita diu seruanda recipi solitæ. Nam fumariam florentem veris initio, semine autem plenam veris fine legit Mesues.

Quòd si herbæ nec caulem, nec florem nec semem edunt, vt adiantum omne, asplenium, legantur in foliorum vigore: quando scilicet maxima & virentissima sunt.

Quædam dum florent aut sementescunt quia lignosæ sunt & exuccæ, ante id tempus in vsum trahuntur, vt beta, brassica, cichorium, chondrilla, eupatorium, lapatha, plantagines, verbascum, verbenaca.

In quo virium vigore etiam sunt colligendæ quæ siccantur, & in vsum medicorum varios anno etiam toto seruantur, vt absinthium omne, adiantum omne nobis (quibus enim abundat, virens & vicens vsurpatur) anethi coma, betonica, carduus benedictus, cichorium, centaurium paruum, calaminthe, menta, chamædrys, chamæpitys, eupatorium, eufragia, fumaria, hyssopicomma, marrubium, maiorana, origanum, polium, pulegium, ruta, rosmaris, salvia, (licet hæ duæ etiam sine floribus sint efficaces) scordium, splenium, thymum, thymbra,

## DE COLLECTIONE

verbascum. Aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Absinthium vere legit Mesues ad succum & aquam inde stillandam, flores eiusdem æstatis initio, hic autem æstatis fine vel etiam autumnno. Eupatorium quoq; legitur & ex eo succus exprimitur in fine veris, Mesuæ. Siccantur autem in umbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidiores, & ob id apto putrescere. Vbi probè sunt siccata reponuntur, vt radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ, Hæc Syluius.

*De herbis colligendis, siccandis, & reponendis ex Matthioli commentarijs in præfatione Dioscoridis de materia medica.*

Demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus obseruandus est, tum in stirpium, tum etiam animalium partibus, vt in hirci sanguine, lupi iocinere, intestino, ac etiam stercore, vulpis pulmone, apri vesica, anguium senecta, alijsque consimilibus. Assumantur igitur hæc omnia eo demum anni tempore, quo magis suis viribus sunt præditæ,

ditæ, nullo planè modo neglecto temporum ratione, quibus singula decerpi possunt. Neq; enim damnandi sunt, qui in quibusdam plantis colligendis quædam decreta tempora, nonnullosq; errantium siderum aspectus obseruant: quippe quod apud graues auctores scriptum inuenerint, pœoniæ radices contra comitiales non esse euellendas, nisi decrecente luna. Quæ quidem opinio non prorsus reprobanda videtur, nec ad ineptas incantationum, aliarumque vanitatum, quas stultè (vt ait Galenus) prodidit Pamphilus, comparanda. Nam cum inferiora terrestria à superioribus cœlestibus gubernentur, & regantur, fieri maximè potest, vt luna, vt quæ cæteris errantibus sideribus est nobis magis proxima, motuque velocissima, maximam cum plantis omnibus, ac rebus quibuscumque alijs habeat rationem, tum cum augetur, tum etiam cum minuitur singulis mensibus. Quamobrem non temerè à Galeno proditum est, alyssum herbam tantum Sirio ardente ad canum rabiosorum morsus esse euellendam, sicuti etiam fluuiatiles cancos ad idem peridoneos. Quo etiam tempore captamus scorpiones, atque anchusa radice constat sanguineo succo madente. Quemadmodum & stirpes,

## DE COLLECTIONE

quibus facultas exalfaciens inſit , perpetuò in locis calidis ac ſiccis demetere conuenit. Quocirca Hippocrates ad Crateuam ſcribens : Adnitere inquit , quantum potes , vt nobis montanas maximè , & in altis collibus naſcentes herbas à radicibus reſeces : quandoquidem hæ firmiores , atque acriores ſunt ijs , quæ aquoſioribus naſcuntur locis : idque quod in montibus terra ſit denſior , & aer tenuior , nam quod attrahunt , frigidius eſt. Quin etiam dabis operam , vt flores ex his herbis etiamnum decerpas , quæ circa ſtagnantes aquas , paludes , fluuios & fontes prodeunt , quas ſanè debiles & exolutas , ac dulcis ſucci eſſe ſcio. Hæc Hippocrates.

Herbæ ſimiliter atque radices , legendæ ſunt , ſiccandæ ac aſſeruandæ , his tamen demptis , quæ tum in medicinæ uſu , tum in cibis , tum etiam in obſoniorum condimentis quotidie virentes uſurpantur , veluti lactuca , intubus tam domeſtica , quàm agreſtis ( cichorium appellant ) portulaca , bugloſſum , beta , atriplex , blitum , braſſica , viola nigra , malua , helxine , linozoſtis , ocimum , apium , hyoſciamus , ſedum , plantago , aſparagus , acanthus , & aliæ complures. Atq; non ſolùm refrigerantibus herbis , verum etiam exalfacientia

cientibus recentibus utimur: plerumque enim ex calida potestate præditis, virides siccis præponimus, præsertim ubi minus calfacere sit opus: siquidem humor in virentibus exuberans earum caloricam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur, amaracus, eruca, nasturcium, menta, absinthium, thymus, satureia, ruta, calamintha, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta.

Sunt præterea & alia, quæ demetiri expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaureum minus, viola purpurea, origanum, symphytum petraeum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamedrys, chamæpithys, anthemis, chrysanthemum, stoechas, hyssopum, fumaria, aliæque consimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse videar, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cœli constitutione, non nubibus, non imbribus infestis imprimis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atque alijs aduentitijs excrementis amotis diligenter in umbra siccantur. Nisi ex eo genere habetur, quæ caulis crassitudine, ut in acantho: vel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino insolari expetant, quandoquidem si



## DE COLLECTIONE

eiusmodi herbæ in vmbra siccandæ reponantur, dubio procul situ obducentur, & putrescent. Cæterum vt rectè exiccatæ fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, vel ligneis capsulis, recondantur, ac diligenter claudantur, ne earum vires euanescant. *Qua* in re errant seplasiariorum pleriq;, qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinaria laquearia suspendunt, vbi non solum breui viribus destituuntur, aëris ambientis exuptione, ac ventorum perflatu, sed etiam puluere, & aranearum telis obsiduntur, quin etiam muscarum stercore, quæ illis die noctuq; insident, labefactatæ nigricant. Neque verò planè laudibus efferendi sunt ij, qui in linteis sacculis, ipsisq; textura admodum raris eas trabibus appendere consueverunt: quippe æstiuus aër in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absomit & abolet, quin etiam puluere obsitæ corrumpuntur, & contabescunt. Idcirco vt tam herbæ, quam radices suas integras asseruent facultates, nihil quidē præstantius, quàm eas capsulis tiliaceis, vel piceis, vel fistilibus, diligenter clausis reponere, vt docet Hipp. ad Crateuam his verbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi & liquoris fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur: quæ verò folia, aut flores,

res aut radices sunt in fistilibus nouis probè obturatis, vt ne ventis perflata, medicamenti vigorem, veluti in animi deliquium collapsa, amittant. Quod si Hippocrates in recentibus obseruandum præcipit, id maxime in siccis fieri operæ precium erit. Hactenus Matthiolus.

Sunt quæ in mensis alicuius initio aut fine potissimum florent aut fructificant, quæ nos tamen in tabulis duodecim mensium simpliciter enumerauimus. Itaq; cogitandum est non rarò fieri vt quæ in mensis alicuius initio florere solent, circa finem aut medium etiam mensis præcedentis appareant: & rursus vt quædam à præcedentis mensis siue ad principium aut medium sequentis differantur.

Pulmonaria tota æstate in quercu arbore & saxosis locis inuenitur.

Succus ex herbis colligendus in noua caulium productione, eodemq; modo ex folijs: liquores lachrymæque sectis integra ætate caulibus excipiendi, Diosco.

## DE FLORVM COLLECTIONE & repositione ex eodem Matthiolo.

Flores non secus atque reliquarum plan-

## DE COLLECTIONE

tarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in vigore consistunt, non autem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi antea quàm se explicent, decerpuntur: rosarum verò cum non planè exciccati visuntur: cæteri deinde cum omnino expansis folijs patent. Verùm cum maiori ex parte omnes flores serè sint herbis fragiliores, molliores & tenuiores, idcirco tantum abest, vt in sole siccandi sint, vt ne quidem in vmbra, si calida vel eminentia fuerint loca: quippe, vt solis seruore, sic & aeris calore nimio exoluuntur. Siccentur igitur in locis temperatis, quo tempore sæpius reuoluantur, ne situm contrahant, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem perdant, quandoquidè certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vsus. Siccantur autem probè vbi substratis linteaminibus sparguntur, & ijsdem lenibus operiuntur. Flores itaque in vniuersum sicci ad annum duntaxat edurant, etsi anthemidis, centaurij, chrysanthemij, millefolij, spartij, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arculis optimè inclusi diligenter recondantur. Matth.

*De floribus legendis ex Syluis.*

Flores

Flores legantur cum maximè vigent, cœlo sereno, vt capparitis in gemma, rosa expandi cœpta legatur : reliqui ferè aperti, sed haud ita pridem : & ex quibus vis nondum exhalauit, nec folia tenuentur, & sint decidua.

Siccantur sole vel aëre calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura, quidam siccandos volūt donec ex ponderibus decem vnicum superfit, minus autem ex montanis floribus quàm ex campestribus minuitur, Syluius.

Flores legi debent priusquam decidan Dioscorides.

*De differentia florum ratione temporum anni, locorum, &c.*

Plantæ plerunque pro peculiari aut loci, aut anni clementia maturius nunc, nunc vero serius, vt adolescunt, ita etiam florent: sic in Germania omnia vno aut altero mense tardius florere, quàm Neapoli, aut alijs locis calidioribus videmus. Sic ex Fuchsijs monumentis Geranij speciem primam, quam acum muscatam appellari vulgò ait. Aprili mense florere : in agro tamen Neapolitano incunte Martio, singulis annis eandem florentem obseruauit Maranta.

## DE COLLECTIONE

Anni etiam constitutio eandem rebus affert diuersitatem : Sic brassicas mense Decembri caules edidisse vidit idem Maranta, ac in flores erupisse : cum vt plurimum vix Februario florere incipiant.

Quædam per hyemem flores & folia proferre solent : quædam bis per annum etiam florere, Dioscor.

Anni parte maiore florent multa quæ colluntur, hoc est verè, æstate & autumno, & quædam inclusa etiam hyeme, vt Caryophylli, leucoia, violæ dasypodes.

Menses omnes videntur aliquas in ipsis florentes proprias habere, excepto Octobre: & hyemalibus, Nouembre, Decembre, Ianuario & Februario, si tamen Februarius in alijs Germaniæ partibus mitior sit quàm Heluetiæ nostræ, proprios ei flores dixerim leucoij bulbosi, tussilaginis, thymelææ maioris quàm zylandt dicimus, quòd Februario florere incipiant licet in Martium extendantur.

Calendula & bellis minor locis calidioribus, toto fermè anno florentes inveniuntur.

Sunt quæ vno tamen mense florent.

Alia non vno aut altero mense tantum, sed diutius, vt pentaphyllum, rhododaphne pu-

ne pumila siue herbacea.

Ocimoides, capficum, bursam pastoris  
hyems superueniens diutius florere pro-  
hibet.

Quæ apud authores æstate florere legi-  
mus, aut fructificare, ad mensem Iunium &  
Iulium apud nos potissimum referemus.  
Maius enim aliqua ex parte vernæ, vt Augu-  
stus autumnalis constitutionis est, hic suo  
fine, ille principio.

Tota æstate florent.

Anagallides à Maio vsq; in autumnum.

Fraga vere & tota æstate, inque maximam  
autumni partem. Hyoscyamus ferè per to-  
tam æstatem, præcipuè Iulio.

Phu. Ranunculi secundum & tertium ge-  
nus apud Fuchsum.

Saxifraga pimpinellæ similis æstate in au-  
tumnum vsq; floret.

Sideritis prima Fuchsi, folijs marrubij,  
Iunio floret vsq; ad autumnum finem.

Symphytum magnum.

Autumnus velut alterum quoddam ver  
est, & multæ in eo florent, sed parcius incer-  
tiusque, quæ vere copiosius non solum her-  
bæ, sed etiam arbores apud nos aliquando:  
hæc dum scriberet Gesnerus anno 1553. ini-  
tio Octobris pyri arboris flores ad eam al-

## DE COLLECTIONE

lati fuerunt, vt ipfemet fcheda manu fua fcripta, teftatus eft.

### *De florum differentia, ob cultum.*

1 Anno 1556, cū apparuiſſet cometa, ver fuit fatis calidum, & flores pleriq; duabus aut tribus feptimanis præuenerunt.

2 Stirpes vetuftiores, quæ in locis ſubterraneis, aut cellis vinarijs, aut alioquin locis tepidioribus aut hortis per hyemē ſeruantur, multò citius flores edunt, quàm recens & modò ſatz plantæ.

3 Flores multiplices, *gefüllte Blumen*, an & prius incipiunt flores emittere & durant diutius in ſuo genere? & hortenfia multa quàm ſylueſtria prius diutiùſq; ob alimenti copiam, ſi frigus & vmbra, & loci natura nō prohibeat.

4 Nota, *Quædam* anno primo non flores, vt olufatrum, fœniculum noſtrum: nam dulce floret primo.

5 *Quæ* primo anno florent, eodē pereūnt.

6 Herbæ floribus multiplicibus, *gefüllte Blumen*, plerunq; ſteriles.

7 Herbæ aliquæ abſciſſæ, vel aliter læſæ, de nuò poſtea creſcunt & florent, ſed tardius.

8 An vbi in eodem genere albi, & aliorum colorum flores ſunt, albi præueniunt? in roſis, ca-

lis, caryophyllis, cyano, aquileia, ocimoides, &c.

9 Quæ feruntur, alia prius, alia tardius florent, prout vel autumnæo vel verno, vel vernalis initio aut fine aut etiâ æstate sata fuerint.

Eorum quæ in hortis quotannis feruntur, vel citius vel tardius, maior ex eo ipsa varietas est: & præstat scire quoto tempore à satione eorum vnumquodque floreat aut semen ferat. Cnicum Nouembri florere vidi, erucam etiam, nasturtium, fœniculum, sed rara.

10 Multum refert in vasis, vel in arcis plantari: hæc ferè proceriora fiunt, vel citius florent. In vasis tutiora sunt ab animalculis infestis.

*De nonnullis, quæ florent, semen verò non gignunt.*

Sunt ex plantis quædam, quæ florent quidem, semen verò non proferunt, vt omnes ferè stirpes, quæ florem multiplicem emittunt, Chamæleuce quibusdam dicta, Arthritica, Viola Martia dasypus, Sambucus aquatica, Ranunculus, Cerasi genus vt sequitur: quoniam vis omnis consumitur in florem. Aquileia tamen, Calendula, & pauca alia, semen ferunt.



## DE COLLECTIONE

Acer maius apud nos, ab omnibus cuius generis arbores quædam etiam florem non ædunt.

Cerasi genus in syluis prope Scaphusi-  
am ut audio flore magno, multiplici. Gfülle  
te wilde Friesse.

Erica. Seid.

Fraxinus in quibusdam locis.

Arbuscula quædam innominata in ri-  
pis fluuiorum quorundam, (Elzbeedre) odo-  
re nucleorum, persici ferè in folijs & cor-  
tice.

Pseudamomum sæpè apud nos. Nam in  
Gallia & Italia fructum maturat, ubi in hor-  
tis colitur. Nascitur apud nos sponte circa  
rîpas & alibi, folijs ut ribes vulgaris frutex,  
quem etiam magnitudine ferè æquat. Pseu-  
damomum autem esse, non piperis genus,  
ut quidam putant, ex veterum descriptione  
coniicio.

Salicem Homerus oleficarpon à sterilita-  
te nominauit. In syluestri tamen latifolio ge-  
nere pappos à flore auolantes loco seminis  
esse Tragus obseruauit.

Tamarix.

Thymus, cui flos pro semine.

Tilia syluestris.

Viola dasypus, Gfülle vionle.

Quæ

Quæ semen fructumue ædant flore non antegresso (aut nucamento floris loco) nulla aut quàm paucissima sunt, vt mali quædã apud nos (vt audio) & filix fortè. Omnino quæ nec florem nec semen ( aut semen non manifestum ) gerunt, toto anno virent pleraque, nimirum quod succus plantæ nativus non consumatur in semen: quæ verò semine abundant, vt ferulacea, & quæcunq; umbellulas gerunt in herbarum censu, hyeme ferè omnia intereunt, vbi semel fructum copiosè protulerint: quòd quædam primo statim anno faciunt: alia in secundum aut tertium annum caulis germinationem & fructificationem differunt, vt in angelica nostra observatum est.

Sabina apud nos alicubi nec florem nec fructum ostendit.

#### DE SEMINVM COLLECTIONE.

Semina cùm ficcari inceperint, legi debent antequam delabantur, Dioscorides.

Semina deligantur matura omnia, benè habita, plena & corpulenta, & quæ naturæ suæ vires proprias habeant efficacissimas, & odorem, saporem, colorem, sui generis

## DE COLLECTIONE

perfectissimum, si odoris, saporis est particeps. Sint præterea recentia, aut his proxima. Quæ enim diutissimè fuerunt reposita semina, & alia, vires habent imbecilliores, Syluius.

### *De seminum collectione & repositione ex Matthiolo.*

Non minori studio colligenda sunt semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, vt lithospermi, fœniculi, anethi, & cari: vel vasculis, aut capitulis inclusa, vt papaueris, nymphææ, melanthij, hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis tecta, vt fabæ, ciceris, phasioli, dolichi, & lupini: aut corniculis recondita, vt fœnigræci, fertulæ Campanæ, sinapis & crucæ: aut varijs inuolucris contenta, quàm ea quæ circa medullam quorundam fructuum intus conduntur, quale est mali medici semen, aurantij, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum & melopeponum, cucurbitæ & cucumeris. Veruntamen hæc assumere oportet, cum fructus, à quibus eximuntur, suam maturitatem planè senferint: illa verò vbi herbæ iam siccæ, non amplius virent. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas asseruent vires, ea tamen quotannis

annis renouare satius ac tutius erit, siquidē pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant: quo fit vt calorem nanciscantur extraneum, & sibi non cōgenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina arculis ligneis reponantur in locis siccis: facilē enim cōtrahunt locorum humores. Hæc Matthiol.

Quæcunque fruticosa (ἰσχυρά) sunt, qualis stichas est, trixago, polium, abrotonum, absinthium, seriphium absinthium, hyssopus, aliaq; his similia suis seminibus prægnantia legi oportet, Dioscor.

DE COLLECTIONE ET CON-  
*seruatione fructuum ex Matthiol.*

Cæterum fructus, quemadmodum pruna, serica, myrti baccæ, cydonia mala, cerasa quæ vulgò marascas vocant, corna, sorba, ficus, punica mala, & alia id genus, quæ in medicinæ vsum reponuntur, operæ pretiū est, vt maturi ex arboribus decerpantur: quamquam sorba, vt siccentur, immatura decerpere conueniat. At animaduertendum est, quod vbi astringente, & repressione sit opus, fructus astringentes vt paululū potius immaturi, quàm secus, demetantur oportet. Porro iuglandes, amygdalæ, pistacia, nuclei pinci, & auellanæ non prius ex arboribus

## DE COLLECTIONE

excutiantur, quàm planè vltimum maturitatis gradum fenerint. Id autem rectè cognoscitur, cùm extrema inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vnà cum fructibus decidunt, alioquin insolatu contrahuntur & fiderantur. Ex his igitur, qui siccati afferuantur, capsulis ligneis potius, quàm saccis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui verò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis, minimè asperginem redolentibus appendantur, vt assolet de vuis, pyris, malis cydonijs & punicis: aut super paleas expandantur, vt sit cum malis, sorbis ac mespilis: aut hordeo vel milio sepeliantur, quemadmodum medica, & aurtia mala, Matthio.

Fructus legi debent, inquit Dioscorides, maturi.

Lentiscum arborem quæ mastichè fert, & triplici fructu tria tempora monstrat arandi, Germania ignorat.

Malus medica regionibus calidis per totum ferè annum, si cura adhibeatur, floret atq; fructificat. Citronen/limonen / vnd pomeranzen.

Seminibus & fructibus omninò carent apud nos December, Ianuarius, Februarius & Mar-

& Martius. Aprilis paucissima nec solita colligi (vt hepaticæ terrestres & cyclamini fortassis) profert.

DE RADICIBVS COL-  
*legendis.*

Radices quas seruari oporteat, radicumque succos, & cortices, incipiente in plantis illis foliorum defluuio erui, excipi & auferri oportet: & per se puras locis sine humore, vt erunt, siccari: lutosas verò aqua prius lauari, Dioscor.

Et paulò antè, Sciendum ex herbarum medicamentis durare ad multos annos solum candidum & nigrum veratrum, reliqua ad triennium tantum habere usum.

*De collectione radicum  
ex Syluis.*

Radices omnes incipiente foliorum defluuio legendas, & cælo sereno, censuit Dioscorides, cui in quibusdam Galenus & Auienna & Mesues consentiunt, in alijs diuersa sentiunt. Sunt contrà quibus placet magis, radices esse legendas priusquam in caulibus, foliis, flore, fructu, serena, vis plantæ

propè tota erumpat. Defluentibus autem folijs, eas esse fœtis animalibus similes, hoc est, velut semianimes ac multum imbecillas, nisi si quæ tantum habebant virium, vt etiam earum satis retineant arefacto caule, vt scilla quomodo valida animalia etiam fœta adhuc robusta permanent, nisi dicas etiam in illis quæ viua & veteri radice repullulant saluam vitalem plantæ velut sanguinem per caulem priusquam arefcat, in radices, licet non totum, refluere, vt in arboribus fit.

Quouis tempore colligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnem anni partem vegetæ incidunt, quales ferè sunt hortenses, alimentosæ, vt apij vulgaris, buglossi vtriusq;, betæ, lactucæ, intybi, oxalidis, raphani, napi, pastinacæ, sisari, cari, panacis, cepæ, porri, allij: & præter has erraticæ, dauci, gingidij, caucalidis, ari, dracunculi, cyclamini, periclymeni, cotyledonis: nam hæc quinque, vt bulbosæ quædam aliæ, etiam æstate siccatis folijs, plenæ sunt, & frequenter autumno regerminant, alimenti pinguis & crassi copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut semel à nobis tempestiuè feruntur aut plantantur, ferè sunt optimæ solo aut vere,  
aut

aut (vt dixi) autumnno, paucissimæ æstate  
aut hyeme.

Quin & hæ quas multis anni partibus  
communes diximus, sunt præstantiores  
cùm tempestiuè satæ adoleuerunt & vi-  
gent: alijs verò tēporibus ignauiores, quan-  
do vi quadam & holitoris opera & irriga-  
tione coguntur adolescere sub cœlo sibi pa-  
rum propitio, quale æstium est ac autum-  
nale & hyemale.

Sic vère ipso quando primùm germinare  
incipiunt, nobis leguntur in annum inula  
(Augusto, paulò post) althæa, iris, acorus,  
symphytū, ruscus, (Ellebori albi radicē vere  
colligit Aëtius) asparagus, petroselinum, a-  
pium, fœniculum, bryonia, cyperus, rubia,  
saxifraga, valeriana, eryngium, tormentilla,  
pæonia vtraq; polypodium, gramen, lilium:  
nisi recentibus aliquando sit opus, sed quæ  
omnino erunt imbecilliores, quàm si quo  
tempore recentes colligi debent, in vsum  
venissent. Hæc omnia Syluius.

Et rursus, Radices autem legendas cū m  
folia cadunt, etiam censet Auic. canone 2.  
& Platearius in Aristolochia: quædam ta-  
men alijs temporibus Saladino leguntur,  
veris fine, aut ætatis initio, acorus, gentia-  
na: aut mense Augusto, quando etiam spina



## DE COLLECTIONE

alba vulgò bedegar, rufcus, bryonia, cypæ-  
rus, iris, enula campana, dictamn<sup>9</sup> vulgaris,  
pæonia, glycyrrhiza: vt Septembri peuced-  
num: Octobri cyclaminus recens & ficcus  
efficax: Decembri eryngium, ijsdem legun-  
tur. Hæc ille.

*Quo tempore radices eruendæ, & quo pa-  
cto ad vsum reponendæ sint,  
ex Matthiolo.*

Radicum vires, sicut & aliarum stirpium,  
partium, non eodem anni tempore æquè in  
omnibus reperiri: quandoquidem alia hoc  
tempore, alia verò illo humore prægnantes  
deprehenduntur. Tametsi non desint, qui  
haudquaquam infirmis rationibus innixi,  
radices à terra eruendæ asserant semper au-  
tumno, cùm videlicet folia decidunt, & cau-  
les cōtabescunt: alij verò ineunte vere, prius  
quam folia concrecant: siquidem hisce tem-  
poribus radicibus maior vis ineit, quàm cæ-  
teris partibus. Sed vt ingenuè in hac re fa-  
tear, quid sentiam, crediderim ego omni-  
nò maiorem succi vbertatem inueniri in his  
qui vere effodiuntur, quippe quòd plan-  
tæ nondum caules, folia, neque flores  
emiserint,

emiserint, à quibus omnis radicum succus exhauritur. Sed & rationi consonum mihi videtur, autumnales radices omnes, tum paucioris, tum imbecillioris esse succi, quàm vernaes, quod scilicet pauco ante tempore & caules, & folia, & fructus ediderint. Non tamen inficiari velim, quod quæ vèrè leguntur, copiosiore, quàm par sit, humore redundant, illoque longè minus concocto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini & corruptioni non sint magis obnoxia, præsertimq; si longo asseruentur tempore. Quare à Dioscoride animaduersa, is sanè iussit stirpium radices effodiendas esse, cum stirpes ipsæ folijs exuuntur. Quod cum varijs anni temporibus eueniat, pro natura diuersarum plantarum, curam impendere oportet, vt suo tempore vnaquæque radix integrè, si fieri potest, cum omnibus suis adnatis euellatur, & in ijs locis, atq; sub ea cœli constitutione, quam maxime familiarem habent.

Porro radices abundè nutritæ sint oportet, ac omni putredine, & labe vacantes: non ita tamen, vt præ nimio alimento expingui solo, vbi nascuntur, accepto, debitam & humoris copiam, & corpulentiam metam excendant, neque vt eiusdem alimenti inopia ina-

## DE COLLECTIONE

nes, & rugosæ reddantur. Quod cum maximè perspexisset Galenus de iridis radicibus differens libro primo de antidodis: In vniuersum (inquit) ex omni medicinarum genere illæ radices inutiles habentur, quæ inanes sunt & rugosæ. Atque illæ quidem deteriores sunt mediocriter nutritis, & medio crem magnitudinem nactis, quæ crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quam illis vsu veniat. Hæc Galenus.

Cæterum vbi radices à terra fuerint exemptæ, primum quidem tandiu aqua clara elui debent, donec omni vndique terra, vel limo penitus abstergantur: mox deraditum à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus vniuersim ferè omnes comantur: postremo siccare eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fuerint quales fœniculi, apij, asparagi, rusci, polipodij, rubiæ, intubi & consimilium, in vmbra, vbi orientales ventri respirent, diligenter siccentur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potior earum pars ab eis procul dubio euanesceret, vtpote raris & tenuibus. Verum enimuerò si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt, veluti gentianæ, he-

nij.

nij, mandragoræ, bryoniæ, & id genus alia, & aer sit nubilus, & hyems, ne in vmbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac vento tutò siccati possunt. Quod commodius fieri potest, si frustatim dissectæ, ita tenui funiculo traijciantur, vt partes non se contagant, aut cratibus impositæ quotidie sæpius manibus reuoluant. Atque curandum est, ante quàm siccantur, vt lignea matrix, quæ omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum fissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamque vim obtinet, etsi gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphaea, aliaque complures absque matrice suas præ se ferant radices.

Siccatis radicibus, quòd planè constat eas sine tabe, & teredine, per tempora asservari posse, ijs reponantur in locis, ad quæ solares radij non penetrent, neque fumo pateat aditus, & quæ neque vliginosa sint, neque puluerulenta. Sit igitur locus eminens & siccus, ad Septentrionem verges, vel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipsæ non prorsus exiccatæ reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austeri humidissimi flatus admittantur. Ita de-

## D'E COLLECTIONE

nique recondi ac seruari possunt tot annis, quot ab inanitate, teredine, & tabe vindicari valeant. Nam etsi quæ tenues sunt, vt asari, phu, asparagi, rusci, & id genus aliæ annoduntaxat perennent, veratrum tamen utrunque, quamuis radicibus constet tenuibus, ad 30. annum vsque perdurat. Hæc ex Mathiolo.

Videtur sanè radix quæque melior ante herbam vere, vel autumno herba denuo marcescente: deinde ante caulem, tertio ante florem, quarto ante semen aut fructum. Quamobrem utile fuerit scire quo tempore quæque herba floreat, aut semen maturet. Videntur enim quæ autumno florent & semen maturant, aut paulò ante maturaerunt, illarum radices colligendæ uere: contra quæ vere florent aut fructificant, autumno: aut certe vere antequam florent, cum primum scilicet germinare apparent. Porro quæ media æstate florent aut fructificant, harum radices vere autumnòue colligas parum referre puto. si tamen propius autumnum flos fructusue earum accesserit, vere potius radices colliges, & contra. Denique nunquam florentium, radices vere autumnòue colligi possunt, vt filicum: herbæ autem ipsæ earundem, mense Maio potissimum

mum carpendę. Filix quidem (vt Tragus docet) circamediam ætatem semen habere videtur.

Radices stirpium quæ florent colligendæ sunt aliàs

Citius, Augusto nempe vel autumno, vt artritice, ellebori nigri, consiliginis.

Tardius aut diu: vt species gentianæ, saxifragæ pimpinellæ similis, vère.

Sed utroque tempore (vère & autumno) quædam à principio, aliæ medio, aliæ & fine. Vt in fine veris, quæ autumno florent, & germinat tardius: in fine autumnii, quæ æstatis medio aut fine floruerint: initio autumnii, aut in fine hyemis, quæ vère aut initio æstatis florent, Gesnerus.

De radicum tempore collectionis, exsiccationis modo, & loco conseruationis siue repositionis, vide plura apud Nicolaum Præpositum lib. i. cap. 3.

## DE COLLIGENDIS ET

*asseruandis corticibus ex  
eodem.*

Cortices, qui fructibus auferuntur, vt cytrijs, punicis, & cucurbitis, quique arboribus decerpuntur, veluti thuri, ligno gua-

## DE COLLECTIONE

iaco, sambuco, ac fraxino : qui item herbarum radicibus detrahuntur, vt capparum, mandragoræ, thapfiæ, alypiæ, pytinæ, ac aliarum, non secus sunt siccandi, atque radices: quin etiam similiter reponendi, Matthiol.

Cortices, quæ ex radicibus stirpium colliguntur, colligi debent eodem tempore, quo radices legi debere modò dictum est, quæ verò ex seminibus aut fructibus, colligantur tempore seminibus aut fructibus præscripto, & eodem quoque modo reponendi ac siccandi. Durant verò tanto tempore, quanto ea ipsa à quibus illi sunt collecti: nisi quod fructuū cortices, vt citri, aranciorum, granatorum, seorsim à fructu diutius integri viribus conseruari possunt, ob superflue humiditatis exiccationem. Nicol.

Præpos.

TABVLA

## TABVLA STIRPIVM

PRIMA. ALPHABETICE ENVMB

*rans tum florendi, tum fructificandi initia &  
fines: nec non etiam alia, quæ ad earum cognitionem sunt non inutilia.*

**A** Bietes omnes Maio & Iunio folia vetera nouis succrescētibus abijciūt. Abrotonum mas, stabwurtz, floret Augusto.

Absinthium commune floret Iunio: in hort o, verò meo vmbroso, medio & fine Iulij floret.

Absinthij species, vt quidam non rectè putant, welsamen, flosculis luteis, qui siliquis suis præfiguntur, vt in filio ante patrè, floret Maio.

Absinthium in hortis floret Augusto.

Acer maius, aborn, huius generis arbores quædam Maio florent: aliæ nunquam florent, omnes quidem steriles sunt.

Acer minus, id est opulus, vt ego interpretor, in planis semen maturat messis tempore, hoc est Iulio mense: in montibus Septembr.

Aconitum cœruleum, napellus, in hor-



## EE COLLECTIONE

tis floret Iulio, & in montibus tardius ferè, nisi aprici fuerint. Semè fert Iulio in hortis.

Aconitum luteum, medio Iunij incipit florere. In horto meo Augusti principio, flore subalbido è luteo. Semen fert, Augusto.

Aconitum flauum in hortis, floret post cœruleum, & in fine Iunij.

Aconitum quod Lupariam vocamus, flore palido, wolffwurtz floret Iulij medio, vel in fine, nisi loco crescat aprico.

Acorus vulgaris floret Iunio: semen fert Septemb.

Acorus falsus officinarum, floret Maio.

Ægolethros vere floret: herba venenosa capris & iumentis, Plinius. Hanc ego in Boue cap. 3. descripsi, & ostendi esse illam, quam vinitores nostri malum Heinrichum vocant, aliqui hundts blumen, Saxones Schuppenwurtz.

Ægolethros nigra rotunda, semen fert Maio.

Alcali è semine natum, floret Iulij medio.

Alcea Sigmarwurtz, floret Iunio, Iulio & Augusto.

Algæ palustres & fluuiatiles (wasser violen: & Ampelos fluuiatilis) itè hydrôlaphth folio & flore quædam in lacu tantum putro, flo-

to, florent principio Iulij.

Alismatis genus, quod Fuchsius Ophryn nominat, Alysson Plinij, simile rubiæ, maius & minus, wald meyster/flein vnd groß/florent Maio.

Alifina Italorum, & centaurij floribus purpureis, principio Iunij floret.

Alliaria floret Iunio mense.

Allium alpinum radice reticulata: foliorum eius forma refert allium vrsinum, floret Maio.

Allium montanum radice oblonga, rubescente, folijs angustis, floret Augusto.

Allium vrsinum, waldfnobleuch/ramseren/lac exprimitur ei ex pericarpis eius triangularibus, floret in fine Aprilis, & Maij principio.

Allium hortense & syluestre, florent Iulio.

Alnus vide etiam in Betula. Alnus suis iulis, qui ei non decidunt, floret in Vere. Sed autumnus appetente semine maturat circa Nouembrem.

Alfina pennentarm vulgaris, flosculis albis, floret Februario.

Alfinæ species in vineis, folijs crassiusculis, angulosis, flosculis cæruleis, floret Februario.

## DE COLLECTIONE

Alfinę species duę, flosculis cęruleis quas pingit Fuchsius: quarum altera folijs est sub rotundis, angulosis, carnosis, pilosis, in vineis. Altera folijs parvis, ferratis. Item Alfine quędam recto caule, pilosa, flosculis candidis, minimis in corymbis, insipida: Cęteris sui generis siccior, florent Martio.

Alfine maior & minor florent Septem. & Octob.

Alfines species glutinosa, flosculo concavo, per summum multifido, floret Iunio.

Alfine semen profert Iulio.

Althęa floret Iulio & Augusto.

Althęa peregrina, luteo flore, floret Octobri.

Alysson Ruellij, pseudalysson in pratis, floret Maio. Alysson Ruellij, quę ego quidem herbam inutilem & minime Alysson arbitror, floret Iulio. Alysson pratense seu Ruellij, Flaffenfrut / crepitu seminum maturorum intra clypeos concussos, semen fert Iunio.

Alysson quorundam, floret Augusto. Sed aliud Patauio nuper ad nos missum est.

Amaracus, maiorana, samfuchum, floret Iulio, Augusto & Septemb.

Amaranthus communis minor, flos amoris

moris, quibusdam, folijs bliti ferè, spica purpurea, fòlbly, floret Augusto. Et alius flore non vt reliqui, sed herbaceo quodam verticillo floris loco, folij pars media ad pediculum, punicea est. Maior cuius folia nigram maculam habent, paniculis longis, ramosis, Augusto itidem.

Amaranthi Pliniani species procerior, rarior, longissimis paniculis, lange fòlbly, floret Octobri.

Ammi, floret Iulio & Augusto.

Ammi cuius semen simile est semini petroselinii vulgaris, floret Septemb.

Ammi in hortis nostris satum, floret Octobr.

Amomum falsum, pseudamomum, floret Aprili.

Amygdalus cum persico floret in vere, Aprili: fructum fert Septemb.

Anacampseros, fñabent frut, vide Telephium. Semen fert Iulio.

Anagallis, morsus gallinæ, floret Maio & Iunio.

Anagallis rubro flore, floret Iunio, Iulio & Augusto mensibus. Semen fert etiam Iulio.

Anagallis purpurea, in vitibus, floret Iulio.

## DE COLLECTIONE

Anagallis aquatica maior, floret Maio & Iulio.

Androsæmon, floret Iunio. Vide Bellis.

Androsæmon maius, caule quadrangulo cum eminentijs foliosis, & aliud caule rotundo, florent Iulio.

Androsæmon minus, perforata, floret Iulio.

Androsæmon, id est perforata, & androsæmon Fuchsi, cui paucioria, maioraq; sunt folia quàm perforatæ, fūnrat, ego posteriorem ascyroides dixerim. Sed sunt omnino congeneres herbæ. Vtræq; Iulio & Augusto florent.

Anemone lutea quædam, trollblumen/ floret ad finem Aprilis.

Anemone montana, semen profert Augusto.

Anethū floret Iunio, Iulio, & Augusto.

Angelica odorata, principio Maij floret.

Angelica odorata laser Gallicum, floret Augusto.

Angelica inodora, quæ vulgò Aquileia, floret Maio.

Angelica aquatica, floret Iulio & Augu.

Anguria in horto meo, folijs in cucurbitarum genere maximè diuisis, fert fructū Iulio.

Anisum,

Anisum, floret Iulio.

Anonis, floret Iulio.

Anthemis, flores Iulio.

Antirrhinon folijs hyssopi: & aliud aruense, flosculis purpureis, folijs perangustis, floret Iunio.

Antirrhinum folijs oblongis maius & minus, vel purpureum & album, floret Iunio.

Antirrhini genus, paruis folijs, floribus albicantibus, floret Iulio.

Antirrhini genus flore cœruleo, floret Aprili.

D. Antonij herba, sic dicta, quod igni sacro medeatur: aliqui Lysimachijs adnumerant, vt Fuchsius. Sunt qui filium ante patrē vocent, quod semina in exilibus & oblongis siliquis, antequam flos apparet contineantur. Plures huius sunt species. Floret Iulio.

Aphace Fuchsi, genus viciz sylvestris, floret Maio.

Aphacæ vel viciz, aut potius orobi species, floribus flauis in caule recto spicatim digestis: folijs è viridi candicantibus, quarum bina semper eminent cum capreolo medio, floret Iunio.

Apios quorundā, erdnuß, floret Iunio.

Apium, floret Iunio.

## EE COLLECTIONE

Apij genus palustre folijs cicutæ latioribus, floret Aprili, & Maio. Vide ne fefeli.

Apijs cognata herba umbellifera è semine nata anno 59. in vasis, folijs saxifragæ hircinæ, olens petroselinum, floret Iunio.

Apij genera, hortense & montanum Fuchsij, à quo ille petroselinum vulgò dictum nihil quàm cultu differre conijcit: apium verò hortense veterum id esse quod vulgò apium, & ppiū vocant: ego neutram eius sententiam probō, sed partim experientia mea, partim doctorum Galliæ Italiæq; consensu, apium vulgò dictum eleoselinon facio, id est apium palustre: petroselinum verò, vulgò dictum, veterum hortense. Vide quid Belonius. florent Iulio.

Apium, semen fert Septem.

Aquilegia, in fine Aprilis floret, & Maio.

Aquilinæ vel Aquilegiæ genera omnia, florent Maio, gfült/wyß/blauwe.

Arbutus in calidis regionibus per Galliam & Italiam, fructum fert Septemb. Germania arbutu caret.

Argemone altera, genserich, vulgò Potentilla, floret Maij medio, & Iulio.

Argentaria, quæ species herbæ stellæ existimari potest, floret Iunio.

Argem-

*Argentaria alpina*, floret Maio.

*Aristolochia longa*, floret Iulio.

*Aristolochia phragmites*, vt sic vocem, quam nostri hæcenus falsò pro rotunda habuerunt, purpurea & alba, floret Martio & Aprilis principio. In fine Aprilis semen fert: siliquæ etiam virides factæ statim dehiscunt: semina nigrore splendent.

*Aristolochia crematis*, floret medio & fine Maij, & Iunio.

*Aron*, Iulio & Augusto semen fert, floret Martio.

*Arthemisia*, floret Iulio.

*Arthemisia tenuifolia*, vide *Mellefoliū*.

*Arthritica communis sylvestris*, pallida floret Februario.

*Arthritica pallida*, quæ singulis pediculis singulos flores sustinet, *Curia Retorum*, incipit autem florere Decembri si tepor sit, & in Aprilem se extendit.

*Arthritica* die gfült/floret Maio.

*Arthritica* præcipuè odorata, & tardius ea montana in rupibus, quam aliqui *Lunariam*, aut folium montanum vocant, floret Aprili, & species illa *Curia missa*, tota ferè hyeme floret.

*Arthritica alpina lutea*, odoratiores flo-  
ribus, rubra folijs, Aprili floret.



## DE COLLECTIONE

Arthritica alpina, gāle/rote/wyſe in mō  
tibus iuxta Thunum, floret Iunio.

Arthritica, ſchlüſſel blümly, ſed pallida,  
inodora, præuenit odoratam, Martio floret:  
& locis tepidioribus etiam Februario emi-  
cat. Montana ſaxatilis propter loci frigidita-  
tem tardius floret.

Arthritica odorata

Montana, petræa, gāl/röt; in hortis  
floret Aprili.

Pratenſis

Hortenſis, gfült/vnd vngfült

Arthritica inodora

Pallida

Cœrulea

Species eſt illa Curia miſſa, cui ſinguli  
flores in ſingulis coliculis breuibus.

Omnes Martio florent.

Minor arthritica flore purpureo, ſed  
parum odorato, in horto meo, me-  
dio & ad finem Martij floruit.

Arundo, floret Auguſto.

Aſarum, floret Februario. Aliquando  
in fine Martij, vel etiam eius principio & me-  
dio, itemq; Aprili, Alicubi Auguſto. Circa fi-  
nem Maij & Iunio ſemen fert.

Aſclepias, quam vulgo hirundinariam  
vocant, circa medium & finem Maij floret:  
itemq;

itemque Iulio & Augusto.

Afcyron Fuchfij, hyperici seu perforatæ species, maius eo, Iunij medio & Iulio.

Asparagus, floret Maio & Iulio.

Aspergula herba repens in terra super muris (ciuitatum præsertim) rubiæ cognata, folijs per genicula quaternis, superius binis: plurimis ab vna radice coliculis, flosculorum albicantium corymbis, qui vt plurimum foris puniceo vel roseo colore sunt, floret Iunio & Iulio,

Asphodelus Germanis hætenus falsò creditur, goldgilgen. Ego omnino lilij genus facio. videtur autem lilium cynorrhodon dictum Plinio. floret Iunio.

Asphodelus marinus in Vere satus, floruit in Autumno & semen perfecit in Vere sequente demum, in cella seruatus, ac rursus flores emisit, partim eodem caule, partim à radice media, medio Aprili.

Aster Atticus Fuchfij, floret Augusto & Septembri.

Astrantia, floret Maio.

Astrantia, quam aliqui Laser Germanicum vocant: Ego non hanc, sed Anglicam odoratam Laser Gallicum aut Germanicum dixerim, floret Iunio.

Astrantia nigra in horto nostro, floruit Iunio.

## DE COLLECTIONE

*Astrantia nigra* in monte Pilati, Augusto floret.

*Astrantia vel imperatoria nigra*, maior & minor, floret Iulio.

*Attractylis vtraq;*, Kardobenedicten der sam vnd der wilt / Augusto florent.

*Atriplices* florent Iunio.

*Atriplicis sylvestris species*, Bonus Heinrichus, floret Iunio.

*Atriplex sylvestris*, floret Iulio in aruis & & alibi: semen fert Octobri.

*Avena*, floret Iunio.

*Auicularia*, Syluij, vide Viola.

### B

*Bären taepen*, *Spica celtica falsa*, floret in fine vel medio Iulij.

*Ballote*, in fine Iulij floret, & Iulij initio: Purpureo flore, in medio Iunij. *Ballote* floret etiam Septembri.

*Ballote rarior*, floret Augusto.

*Balsaminæ pomifera herba*, Augusto & Septembri floret simul & fructus profert.

*Barba caprina* quæ in syluis nascitur, floret Iunio: radice magna, lignosa, flore magno, muscoso, albo, odorato. Diuersum ab hoc genus locis humidis nascitur, Vlmaria quibusdā dicta, nostris Ymbentraut, quod & Iulio floret.

Barba

Barba caprina, floret in fine Maij & Iun.  
aliquando citius. Fructum facit Iunio.

Barba senis, vide Coronopodem, Sabero  
març.

S. Barbaræ herba, quam Galli carpenta-  
riam vocant, erucæ vel nasturtio congener,  
Maio & Iunio floret. In hortis Maio mense  
ferè desloruerat etiam eius initio: & siliquas  
ostendit. Italis herba sancta.

Beinhülzen frutex, floret Maio: semen  
fert Iulio.

Bellis vrbana & syluestris, Galli Pasquet:  
tam vocant, quod tempore Paschatis flo-  
reat, floret Aprili. Syluestris maior & minor  
floret Nouem. itemq; Augusto.

Bellis maior, quam vulgò à tempore quo  
floret Diui Iohannis florem nominant, (vt  
etiam Androsæmon seu perforatam, quæ Iu-  
nij tempore florere incipit) floret Iunio cir-  
ca 24. diem.

Bellis maior, floret Maio.

Bellis maior syluestris & hortensis, floret  
Iulio.

Bellis maior & minor, floret Septemb.

Bellis minor hortensis, floret Maio & Se-  
ptembri.

Bellis hortensis, floret Augusto, & De-  
cembris initio.

## DE COLLECTIONE

Bellis minor, quæ cælo & regionibus tepidioribus hyeme etiam non deest, floret Martio, eadem hortensis alba, purpurea, Martio.

Bellis albus & ruber in hortis; itemq; sylvestris, floret Iunio.

Bellis semen fert Septemb. floret etiam nonnunquam Februario,

Betæ duo genera, florent Iulio.

Betonica, floret Maio, Iunio & Iulio.

Betonica Pauli Turnero : quæ & Aprili floret & Maio : & fortè toto anno, si in loco aprico sit, flosculis parvis, subcæruleis, herba pulegio vel nummulariæ potius similis est, & similiter repit, (alijs puto, *Steinpoley* est illa betonica.) floret Martio.

Betonica Pauli pulegio similis, quam Turnerus describit. Similis est nummulariæ, sed flores exiguos albicantes ædit : seminum conceptacula, ut alysson vel bursa pastoris, floret Iulio.

Betonica altilis, floret Octob.

Beticum altile, floret Septemb.

Beticum altile, flores caryophylli vulgò dicti. *Steinnägele/wilde grasnägele/* florent Iulio. In cellis verò domuum vel caveis etiam Decembri floret.

Betonica altilis, caryophyllus flos, medio Iunij

Iunij incipit, albus puto prior, wyß/root/  
lybfarb/trenfft.

Betonica foetida vocetur, herba foetida,  
caule quadrangulo, cubitali, flore betonicae,  
pericarpis leniter aculeatis, vt & betonica,  
folijs oblongis, angustioribus quam beto-  
nica, floret in fine Iunij.

Betonicae species minor, friesen eugle/  
root vñnd wyß / principio & medio Maij  
florent.

Betonica Aeginetæ Turnero, floret Apri-  
li & principio Maij.

Betonicum montanum quoddam, flori-  
bus multum dissectis, purpureis, in pratis  
siccis montis Melam, floret Augusto.

Betonicum aliud montanum locis saxo-  
sis vbi ferrum eruitur, innummeris ab vna  
radice cauliculis, flosculis albis, radicibus  
longis, subruis, floret Augusto.

Betula suis iulis floret in vere, qui simili-  
ter vt alno ei non decidunt, donec autumnus  
semen perficiant: sunt enim illi loco semi-  
nis, vt alno quoq;.

Bistorta maior rugosioribus folijs, & mi-  
nor lenibus, Maio & Iunio florent. Limo-  
nium interpretor.

Blattaria Fuchsj, verbasco similis, aut po-  
tius species verbasci, floret Iunio.

## DE COLLECTIONE

Blitum album, floret Iulio.

Blitum hortense rubrum (puto & viride esse, Badæ vidi) contra dysenteriam calceis imponi iubent, floret Iunio.

Blitum maculis nigris in folijs. Item hortense succo rubro, floret Iunio.

Borrago, floret Iunio, Iulio, Augusto, Septemb. Octobri, Nouemb. & locis tepidioribus Decembri. Mihi quoq; Aprili floruit, & in fine Maij.

Borrago montana Curizæ, flore flauo, in fine Maij floret.

Botrys, floret Iulio & Augusto: semē fert etiam Augusto.

Branca vrsina, Iunio et Iulio mensibus colligitur, dū floribus & semine abundat, Fuchs. Facit autem duplicem huius nominis herbam, nempe Acanthum verum & germanicum, qui sanè nō Acanthus, sed Sphondylium est.

Brassica, floret Maio, Brassicæ species florent Augusto.

Bryonia seu vitis alba, floret medio & fine Maij. Itemq; Iunio, Augusto: florem fructui præterdit Iulio. Semen gerit Septemb. Vide etiam Vitis alba.

Buglossus maior, floret Iunio.

Buglossus vulgo dicta minor, quam alij  
Cyrion

Cyrsson esse conijciunt, floret Iunio.

Buglossus Italica, floret Maio.

Bulbine, Blaum meyen rößle, floret April. Primùm minor, postea maior, quæ toto anno viret. Bulbine maior, puto circa finem Martij floret.

Bulbus syluestris, flore luteo, instar calathidis, quæ Codiaminû dixerim, floret Martio.

Bulbina minor, flores ostendit Martio, sed aperit Aprili demum.

Bulbus ille Kyburgo, floret Martio.

Buphthalmus, siue cotula non foetida, Iulio & Augusto carpitur, & durat vsq; ad autumnum medium.

Buphthalm<sup>o</sup> von Augspurg, floret Iunio.

Buphthalmus ex Gallia missus, rücht wie die cotula nõ foetida, vel vt bellis maior suo flore, floret Iulio.

Bursa pastoris, floret Martio, Iunio, Iulio, August. Septemb. Octob. Nouemb.

Buxus, semen fert Septembri, floret Februario.

## C

Cacalia lutea, vnser frauen schûle, floret in Maio.

Calaminthæ genera tria Fuchsio: sed quam ille tertium genus Calaminthæ facit,



## DE COLLECTIONE

ego conyzæ genus tertium dixerim, iudicet eruditi, florent Iulio.

Calamintha aruensis, sisymbrio cognata specie & odore, floret Augusto. Item aquatica similis aruensi, sed in summo etiam florens: floret Augusto.

Calamintha, incipit florere in fine Iunij.

Calamintha montana, floret Iulio: in colibus passim circa Badam, Augusto & Septembri.

Calathiana verna, *Viendel blümle/ Junckheres blüm/* April. *Blauw* in fine Aprilis: alias enim autumnales trium generum novæ: floret Aprili.

Calathianæ, autumnales violæ cœruleæ, ex quarum genere Petilium florem Plinij dixeris, radicibus amarissimis, de genere gentianæ, floret Septemb.

Calceoli diuæ Mariæ, folijs ellebori, principio Maij florêt, & Aprili.

Calendula vel Caltha, floret Maio.

Calendula, floret Iunij medio, Septemb. Octob. Nouemb. Tota hyeme floret locis tepidioribus, & in domo condita.

Caltha siue Calendula, floret Iulio & Augusto.

Caltha palustris, *maßblümen*: mas ramulis rubentioribus, flore magis tinctor: *fœmina mi-*

na minor, albioribus, flore luteo minus tincto, floret Aprilis medio.

Campanula siue vuularia, *halß fraut*, Iulio & Augusto floret.

Campanula cœrulea, *zäpffle fraut*/ vide Vuularia.

Cannabis, floret Iulio.

Cantabrioa quorundam (sed non est, cum radicem habeat inutilem) caule vno, iunceo, cubitali: folijs vt polemonium ferè albicantibus: calycibus elegantibus, pentagonis, calathi forma, è quibus flos quinque foliorum roseus prodit. Sponte in aruis nascitur, & floret Iunio. Lychnis quorundam. *Cartheüßer Blümle*.

Capficum siue Cardamomum Arabicum (non placet) *Indianischer pfäffer/ rooter vnd Brauner Eglectischer pfäffer*/ cuius aliquot differentias, ex figura siliquorum Fuchsius describit: quidam hanc herbam siliquastrum nominant. Atqui capficum constat herbam non ita pridem ex nouis regionibus aduectam esse: siliquastrum verò Plinij tempore in vsu fuisse, de qua ille lib. 19. cap. 12. sic prodidit. Panax piperis saporem reddit, magis etiam siliquastrum, ob id piperitidis nomine accepto. Et mox: Libanotis seritur semine, &c. eadem & siliquaastro satio

## DE COLLECTIONE

(Tarchon non feritur semine, sed propagatur) nec alibi aliud quicquam apud veteres (quod sciam) de siliquaastro traditur, & quamquam à siliquis nomen habere videatur, non tamen est necesse, quoniam id veterum nemo scripsit. Potuit enim aliunde hæc vox detorqueri, ut fortè à Salicaastro, quæ omnino clematis altera est (ut nos obseruauimus) amplexi caulis planta, & vrens, piperis scilicet sapore etiam ipsa. Ruellius costum hortensem vulgò dictam siliquastrum facit, quæ & ipsa siliquas non fert. Sed hæc amariuscula, & quanquam acrimonia non careat, pipere tamen longè inferior est. Itaque quoniam tam angustis descriptionibus adhibendæ sunt coniecturæ, Siliquastrum esse dixerim herbam. Tarchon (Tarch) Arabibus & Symeoni Sethi vocata: quæ duorum generum est, vna syluestris, pyretro recentioreū quidam adnumerat, altera hortensis. Vidi enim in Sabaudia in hortis & piperitum vocari, ad cōdimenta laudatam, aiebant autem semine feri: aliqui draconem acetarium vocant. Vetus quidem nomen aptum, nemo adhuc imposuit.

Capficum, cardamomum Arabicum, floret Augusto.

Caput monachi, halicacabus puto Fuchsij, floret Iulio. Carda-

*Cardamomum Arabicum*, vulgò *piper rubrum*, floret Septemb. In nostris hortis florere ante hyemem (Octobri) non desinit, fructus interim maturans. In fine Septemb. vel Octobri potius fructum edit.

*Cardiaca*, quam *Lupi pedem* *Ruellius* vocat, *lycopodem*: floribus hirsutis, mediocriter amara, floret Iulio & Iunio.

*Carlina* noctu se claudit, ad Solem aperit: in horto meo floruit Iulio.

*Caros*, vulgò *Carui*, *fünich*, floret Aprili, & Iunio. *Carus albus* & *purpureus*, *wyffer vnd roter fünich* / floret Maio.

*Carduus asininus communis*, floret Augusto. Et alius quidam procerus in sylvis angustioribus folijs.

*Carduus asininus*, in nullo medicinæ usu, floret Septemb. & Nouemb. fert semen Octob. & Nouemb.

*Carduus aruensis maior* *purpureo flore* (qui flore nondum nato moschum olebat,) floret Iulio.

*Carduus aruensis*, *Hasberdistel* / floret Iunio.

*Carduus benedictus*, de genere *Cnici agrestis*, sed apud nos & cæteris mihi cognitis regionibus satius tantum, floret Iulio & Septembri.

## DE COLLECTIONE

**Cardui** genus maculis albis, quod à pleuride vulgò cognominatur, floret Iunio.

**Carduus palustris**, id est, humidis pratis nascens, flore purpureo, &c. nitt hasen & ol. floret medio Iunij.

**Caryophyllata** floret Iunio: fert semen Iulio.

**Caryophyllata vrbana & sylvestris**, floret Maio.

**Caryophyllata sylvestris illa**, quam aliqui **Lychnidem** putauerunt, locis saxosis, & apricis, floret Iulio.

**Caryophyllatæ sylvestris genus, müttwillen**, flore valdè dissecto, floret Maio & Augusto: dicta müttwill, à laceris & dissectis vestibus, quas referunt flores variè diuisi.

**Caryophyllata aquatica**, floret medio Aprili.

**Caryophyllus Indicus vel Portugallia minor**, floret principio & medio Iulij. **Caryophylli Indici domi inclusi**, vsq; ad natalem Domini florent.

**Castanea iulis**, floret vere: maturescunt verò Septembri.

**Caucalidis species puto**, multis caulibus, folijs paruis, dissectis vt in **Dauco hortensi**, tota læuis, radice vt apij, alba, subamara, umbellis albis, Caro similis est specie & radice, eiusq; sapore, floret Maio. Cen-

*Centaurij* maioris species minor & degener, in campis, flore puniceo, calyce squalido, & squammatim compacto vt *cyanus*: folijs indiuisis minor, in pratis, heuoblümen: diuisis folijs maior, calyce magnitudine *auellanzæ*, in collibus, florent *Iulio*. Vide *Rhaponticum*.

*Centaurium minus*, flore rubro: & quod rarius est, albo, floret *Augusto*.

*Centaurium minus*, circa finem *Iunij* floret. Item *Fleine rhaupnucken* principio & medio *Iunij*.

*Centimorbia*, nummularia *Fuchſio*, nater *Fraut/pfenningfraut*/ fortè *Echios* altera *Plinij*, *pulegio* similis, floret *Iulio*.

*Cepe*, floret *Iunij* medio & *Iulio*.

*Cerasus omnis*, floret *Aprili*.

*Cerasa duracina*, *Enellſrieſe*, quod crepēt sub dentibus edentium, minora cæteris, sicca, cum puncto eminente in summo: *Dulcia* etiam in alpibus, matureſcunt *Aug*.

*Cerasa dulcia* diuerſorum generum *matura* habem<sup>r</sup> *Iunio* & *Iulio*: *acida* verò tūm *rubentia* dilutiora, *amarella* vocant *noſtri*, tūm *nigricantia* ſolidiora, quæ *viſula* dicūt, *Iulio*. Sed omnium poſtrema matureſcunt.

*Cerifolium*, *chærephyllon* *maaßblümen*, floret medio *Aprilis* & fine, itemq; *Mai*o.

## DE COLLECTIONE

*Chamæbuxus*, vt nos vocamus: suffrutex multis à radice cauliculis pedalibus per terram stratis, folijs buxi, floribus vt viciarum dulcibus, sed colore partim ex albo, partim flauo. Nascitur collibus apricis & siccis, floret Aprili.

*Chamæcyparissus*, floret Maio.

*Chamæcyparissus*, *Cypriessenfraut*/quam aliqui abrotonū fœminam putant: ego verò aliam abrotonum fœminā noui, floret Iulio.

*Chamæcyparissus*, flosculis, qui se in ambitu capituli aperiunt, veluti galion habet, colore & figura, floret Iunio.

*Chamædrys vera*, floret Iunio & Iulio.

*Chamædrys fœmina Fuchsj*, cuius apud veteres quod sciam, nulla mentio, floret Iul.

*Chamædryi similis herba*, quā aliqui *Teucrium* putant, flore cœruleo, duorum generum, floret Maio.

*Chamædryi similis folio*, alpina herba, semine lanuginoso, semen facit Augusto.

*Chamæleontis genus*, quod nostri vulgò radicem apri vocitant, floret in horto meo Iulij medio.

*Chamæleuce Ruellij* (quam vulgò *moosblumen*/ id est, florem palustrem dicunt) hortensis, cui folia florum multiplicia, floret Aprili.

*Chamæma-*

Chamæmalum, floret Iunio, Iulio & Augusto. Floret autem bis in anno, vere inter segetes, & autumno in agris rapitijs, Septembri.

Chamæmalum nobile repens, floret in fine Iunij.

Chamæpithys, floret Iunio.

Chamæpithys in horto meo, stirps anni superioris, floret Maio & Iulio.

Chamæsyce in aruis, floret Augusto & Iulio.

Chamæsyce, flosculo singulari minimo, vix apparente in hortulo nostro, floret Maio.

Chelidonium minus, floret Aprili: & maius quoq; tempore calidiore.

Chelidonium maius, floret Iunio & Augusto, itemq; Maio.

Chelidonium minus locis apricis, floret medio Ianuar. & Feb.

Chondrilla, floret medio Maij, Iunio & Augusto.

Chondrilla minor propè Curiam, floret Iulio.

Christophoriana, cost<sup>a</sup> niger, floret Maio.

Christophoriana acinos nigros profert, cum calidius est ver, floret principio Aprilis.



## DE COLLECTIONE

• Chrysanthemon Fuchſij, ranunculo ſimile, floret Maio & Iunio.

Chrysanthemon verum, vnum magis flauum, alterum minus, floret Iunio.

Cicer, floret Iulio.

Cicer ſylueſtre floribus albis, radice polycari ferè, foris nigra, intus alba, dulci, cicerũ ſapore, grad wie fäſen, floret Iulio.

Cichorium, vide Intubus.

Cichorium ſatium in horto meo, Auguſto floret.

Cichorium vel Sonchi genus, flauis floribus, in muris ferè naſcens, folijs herbæ S. Barbarę, lacteſcit id, nec abit in pappos, milchen, floret Octob.

Cichoriũ, cuius flos cœruleus, Iulio menſe ferè deſloruit: frequentius verò floret illud cui flos luteus, quod Chondrillam eruditi quidam vocant.

Cichorium ſylueſtre, floret Septembri, Nouembri.

Cichorium, id eſt, intybus ſylueſtris, maior & minor, floret Auguſto.

Cici, floret Auguſto.

Cicuta, floret Iunio, Iulio & Octobri. Et Maio etiam: & ea quam ſuſpicabar Cicutam.

Cicuta aquatica, Barzenfraut, floret Iulio.

Cicuta

*Cicuta maior* semine magno aspero, Septemb. semen habet.

*Cicuta* 8. Iunij incipiebat florere *Zur-zachi*: herba cinericei coloris, odore graui, hyoscyami ferè (lacte nullo) puniceantibus per caulem & ramos maculis.

*Cicutæ* similis minor in prato, seminibus oblongis, quæ in fine Maij apparent, geminis, non grato odore aut sapore, radice simplici, foris fusca, *cicutaria* minor appellatur, floret Maio.

*Cicutariæ* quædam calidæ inter vites, duæ, florent Iunio.

*Clematis Ægyptia*, vulgò *Peruinca*, cærulea & punicea, floret April.

*Clematidis Ægyptiæ* genus, quod in hortis colitur, puniceis floribus, sed flores rari, vt & violæ hortensi nigræ, dasipodij, floret Octob.

*Clematis Ægyptia* in siliquis binis vel singulis, vt in hortensi obseruaui, fert semen Iulio.

*Clematis purpurea*, floret Maio.

*Clinopodium*, floret Augusto.

*Climenum* vtrunque *Scrofularia* alba & nigra, vt *Conyza collina*, floret Iunio.

*Cnicus*, vulgò *Cartamus*, floret Augusto.



gustis, caule cubitali, striato, fungoso, floribus per summos ramulos in ambitu subcæruleis, foliolis minutis, cum pappis in medio, qui mox ab initio apparent, radice alba cum paucis fibris, flor. Iulio.

*Conyza palustris* quædam floret Iulio.

*Conyza aquatica* flore calendulæ, floret Augusto.

*Conyze aquaticæ* species indora, insipida, folijs oblongis, serratis, lanuginosis, floret Iunio.

*Conyze* species, ut videtur, quam Lani floram dixerim, floret Nouemb.

*Conyze* genus flore luteo, latiore, minus cæteris, odoratum, floret Octob.

*Conyza* utraq., *Dürrwurz* Trago, floret Augusto.

*Conyze* species in aridis nascens in horto meo: item *aquatica* longis & serratis folijs, flor. Iun.

*Conyze* species alia, caule cubitali, singulari (puto) à quo singula folia tres aut quatuor digitos longa, angusta, alternis per caulem sine petiolis prodeunt, flos in summo luteus totus ut *Chrysanthemis*, radiculis minutis, rufis, acribus ut in *ptarmice* no-

## DE COLLECTIONE

*Astra*, nascitur collibus apricis: floret Iunio.  
Vide vtrum *Disterrmurtz* esse possit.

*Conyza* alia<sup>1</sup>, quam in horto habeo, in colle nascens, floret Iunio,

*Conyza alpina* in horto meo, flor. Mai.

*Conyza montana*, *Böny* / floret Augu.

*Conyzae* genus tertium, vide *Calamintha*.

*Conyzoides* quædam in collibus siccis puto, in hortis viuaz, flore calendulæ, floret Augusto.

*Conyzoides cœrulea*, *dérelariam* puto aliqui vocant, flos subcœruleus, mox ab initio pappos ostendit: calida, acris & sicca herba, in muris ciuitatis: & in quibusdam syluis in montis Tigurini superiore ad dextram parte, floret Aug.

*Conuoluulus maior*, semen fert Septembri.

*Conuoluulus maior*, cui flos totus albus, & minor alternis purpureis & albis in flore partibus: qui & *helxine cissampelos* vocatur, & a fine vel iasione Theophrasto, vt nos obseruauimus, floret Iulio. Nascitur propè aquas, sed fluentes ferè, vt *solanum perpetuum* circa stantes.

*Conuoluulus maior*, itemq; minor, quæ & *Cissampelos*, floret Augusto.

Con-

*Conuoluulus minor* (helxine *Cissampelos*) sine lacte, vel potius paucissimo in venis foliorum: nam maior lac habet: & sepiarius rarior adhuc, floret Iunio.

*Conuoluulus peregrinus*, hirsutus, flore cœruleo, lactis nihil habet, saporem betæ vel cyclamini, floret August. Granum nil vocant in horto.

*Conuoluulus aruensis* & sepiarius, floret in fine Maij.

*Conuoluulo* similis præter quam flore, quam Galli tineam vocant, Germani *spyn/oder schwarzwinden*. Ruellius & Traugus *Orobanchen* esse suspicantur, sed nos aliam *orobanchen* nouimus, floret Iulio, & Augusto, fert semen Octob.

*Corchorus* ille, genus apij degeneris & vitiosi, floret Iunio.

*Coriandrum*, semen fert in fine Iulij.

*Cornus* interdum Februario floret, frequentius Martio tantum.

*Cornus* femina, virga sanguinea, capris grata, vnde nomen apud Gallos, floret Maio.

*Cornus* medio & fine Augusti, itemq; Octobri fructum fert.

*Coronopus*, cornu cerui vulgò, floret Iunio.

## DE COLLECTIONE

*Coronopus* quidam flore cœruleo, calyce ceu squammis, multis tenuissimis, aridis, floret Iulio.

*Coryli* ante folia ædant flores rubros croci staminibus breuissimis similes: nam iuli, quos nonnulli flores putant, colore luteo sunt, flor. Feb. & Martio suis iulis.

*Corylus sativa*, cui nux oblongior, fructum fert Augusto: sylvestris nuces fert Septembri.

*Costus hortensis minor*, floret in fine Iunij.

*Costus hortensis*, floret Septembri & Octob. Semen habet Nouemb.

*Costo hortensi cognata*, herba Iulia dicta, Septemb. floret.

*Costi hortensis* genus minus, quod aliqui herbam B. Mariæ vocant, in hortis nostris satum, floret Augusto.

*Cotula fœtida*, *Parthenium Brassauolæ* & *Fuchsio*, floret Maio, & Iunio.

*Crocus Vergiliarum* occasu floret, id est Septembri, neque ultra mensis spatium flores durât, qui postquam deciderint, mox folia prodeunt, virentq; tota hyeme.

*Crocus montanus*, in fine Februarij floret: aliquando medio.

*Crocus montanus* in partibus circa *Curiani*

etiam copiosè, cœruleus, candidus, & ex utroque mixtus, principio Martij, in horto meo Martij medio. Vnus tantùm ex plurimis bulbis mihi floruit.

Cruciata folijs per genicula quaternis, herbula hirsuta, flosculis luteis, florere incipit Aprili.

Cruciata rubiæ congener, floret Maio.

Cruciata Gallio cognata, floret Maio.

Crucis flores, dicti à Festo, quod crucia hebdomadam vocant, albi, cœrulei, purpurei, medicis in nullo usu, floret Aprili.

Cuculi flos, mûrwillen/ floret Maio.

Cucumeres, florent Iulio.

Cucumis anguinus, floret in fine Iunij.

Cucumis anguinus in hortis nostris, floret Iulio, vel ex superiore anno, si planta hyeme seruata fuerit in cella vinaria: vel quod nobis rarum est, ex planta eiusdem anni, vere sata.

Cucumis erraticus, quem aliqui asinum cognominant, floret Augusto, & mihi relictus ab anno priore, medio Maij floruit.

Cucurbitarum genera, florent Iulio, Augusto, & Septembri: maturescunt Septemb. & Octob.

Cumini syluestris genus, quod vulgè



## DE COLLECTIONE

consolidam regalem vocant, *Ritterspödy*,  
floreth Iunio, Iulio & Augusto.

*Cyanus*, fo: nblumen, floreth Iunio.

*Cyanus albus*, cœruleus, puniceus, floreth in fine Maij, & Iulio.

*Cyanus montanus*, floreth in fine Aprilis, & Maio, in Iunio ferè defloruit.

*Cyanus* in arvis & hortis, floreth Maio.

*Cyclaminus*, floreth principio & medio Augusti, & Septemb.

*Cyclaminus*, ex floribus autumnalibus semen fert Aprili.

*Cyclaminus* prima in hortulo nostro, floreth Iulio.

*Cyclamen* puto tardissimè suum semè maturat, quod super terram iacet, nescio an in fine Iulij adhuc maturuerit, cum florem Apriliamiserit, aut Martio fortè.

*Cynoglossus minor*, flosculis cœruleis, wie vergiß min nitt, propè Curiam Rhetorum, floreth Decemb. initio.

*Cynoglossus puniceo flore*, floreth in fine & medio Maij.

*Cynoglossus*, floreth Iunio.

*Cynocrambe Fuchsj*: Est autem genus Mercurialis sylvestris, floreth Martio & Apr.

*Cyperus*, floreth Iulio. In orto meo Augusti principio & medio.

*Cytisus*

*Cytisus suffrutex* ligno duro in colle  
prope Schaphusiá floribus luteis, wie trauben  
fröpple/floret Iulio,

## D

*Daphnoides Fuchsi*, *Thymelea* potius  
species, 3<sup>o</sup>land/floret Aprili.

*Cassutha*, id est *cuscuta*, floret Iunio.

*Daucorum* & *Apiorum* genera confinia  
videntur: sed fortè *apiorum* genera umbellulas  
nudas habent, *daucorum* vero foliola  
subnexa eis in orbem radiata. Itè illa fortè  
diuturniora sunt, hæc ubi semen tulerint, in  
tereunt. Iulio ferè florent,

*Dauci* umbellis albis sunt, aliqui etiam  
roseis puto

*Daucus palustris* in horto meo, floret  
in fine Iulij.

*Dauci* genus paruum asperiusculum,  
quod circa sepes & muros nascitur inutile,  
floret Iul. semen facit Augusto.

*Daucus sepiarius* floret Iunio.

*Dauci* genera tria, & inter alia, vnum genus  
cuius semina hirsutiora sunt & multò  
maiora, quam in alijs generibus, flores  
extremi in umbella medijs latiores, locis cultis  
nascitur, floret Iunio.

## K

## DE COLLECTIONE

Dauci inutilis genus in aruis, folijs cori  
andri, glyſſen/ſemen facit Auguſt.

Dauci genus in fossa ranarum, in cuius  
umbella media nihil purpurei, flor. Auguſt.  
Vide Paſtinaca ſyl.

Dauci genus aruenſe, magnis, latis &  
hirsutis ſeminibus: floriflus latioribus in um  
bellæ ambitu, flor. Aug.

Dauci ſylueſtris ſpecies folijs non hirsu  
tis in prato, flor. Iul.

Daucus quidam ſylueſtris, flor. Apr.

Daucus creticus vel alpinus, βάρβαρος,  
Meon vt aliqui coniiciunt, alijs tordilion:  
nec multum intereſt, quando vires (ni fal  
lor) eadem ferè omnium, flor. Iul.

Daucus ſylueſtris maior, (quē Matthio  
lus paſtinacam ſylueſtrē appellare mauult)  
macula in medio umbellæ plerunque alba,  
aliquando purpurea, in collibus apricis. I  
tem minor inter ſegetes & alibi, florent  
Iulio.

Dentelaria quam aliqui Irionem vocât,  
flor. Iun.

Dentelaria *εὐκροτὶς*, humilis herba, à  
Textore medico miſſa, flor. Iul.

Dentelaria *κελευθὶς* petræa, Vide cony  
za muralis.

Dictamnus vulgo dicta, flor. Maio.

Digitalis

*Digitalis Fuchſij*, incipit Maij medio florere vel in fine, itemq; Iunio.

*Digitalis duplex*, flore minore, albidior: & alia, flore maiore, pallidior & intus vario, florent Iun.

*Digitalis minore flore*, vulgaris, albicans & maiore flore, tum aliàs luteo, tum purpureo circa Coloniã, folio minus lævis, florent Iunio.

*Digitalis lutea & purpurea*, florent in principio Iulij: & albicans in montibus.

*Digitalis vtraq;*, semen fert Auguſt.

*Dipsacus albus & purpureus*, flor. Iun.

*Dipsacus* floret Iulio. Et ſimilis ei herba carduo exiguo, echinato, rotundo.

*Dipsacus* flor. Septemb.

*Dipsacus minor*, floret Auguſto: & ſemen fert Nouemb.

*Doronicum* in alpibus, flor. Aug.

*Doronicum* vulgò dictum, in horto noſtro, circa Aprilis finem, in montibus: propter niues tardius, *gemenwurtz/graſſoy/* floret Maio, & Octob.

*Dorycnium* quorundam, floret particulatim Aug.

*Dorycnium Monſpelij* putatum, floſculis albis per ſummos ramulos, veluti in orbem diſpoſitis: figura quæ piſorum vel

## DE COLLECTIONE

loti, sed parvis, floret Septembri.

Doricnium quibusdam falsò dictum, toto Iulio floret.

Draco hortensis, medio Iulio & fine. Item aquaticus, Iulio medio floret ferratis folijs.

Dulcis radix, Iunij fine floruit mihi in horto.

### E

Ebulus floret in fine Iunij, medio & fine Iulij: baccas fert Augusto.

Echion floret toto Iunio, itemque Septemb. Fert quoque Septemb. semen.

Echion verum, quod Fuchsius triplex facit, floret Iulio.

Echinopus meus, crocodilium quorundam, floret Iulio.

Echinopus carduus, in cuius capitibus flores nulli ferè apparent, sed aculei albicantes vndiquaque in diuersum tanquam in echinis rigent, folia puto scissa, angusta, & albicantia, anno 57. defloruerat omnino Aug.

Elleborus albus, floret Aprili: niger quoque eiusdem principio.

Elleborus albus circa lacum nostrum ultra Albium montem, floret Iulio.

Elleborus albus, itemque niger, flor. Apr. initio.

initio. Mas maior & durior : & fœmina maior, & mollior, ex locis ad Larium habui.

Elleborus Agyrtarum, folijs abrotoni ferè, flor. Apr. & Mart.

Elleborus niger, locis tepidioribus, circa natalem Domini, vnde nomen ei apud nos frist wurtz/floret Decemb.

Elleborus niger noster & ex Italia allatus, flor. Febr.

Elleborus niger, Martio.

Eiusdem genus à Trago exhibitum (Anemones species potius) folijs nigellæ, flore ranunculi, magno, luteo, ad solem se conuertente, quo defluente semen etiam vt in ranunculis subnascitur, Aprili mense, &c. flos Mart. fine erumpit.

Elleborus niger noster mas, floret Mar. & fœmina, quam ex Italia habui, non tamen purpureus.

Elzenbaum/floret in fine April.

Elzberg ad ripam Silæ, acinis nigris, magnitudine piperis, osse duro, singulari intus, &c. fert fructum medio Iulij.

Enneadynamis Polonorum, Jäberblümle/in fine Iul. flor & Septemb.

Erica vel Solago, Heid/floret Augusto & Septemb.

Eruca vera, floret Ianio, Iulio & Augt.

## DE COLLECTIONE

*Eruca hortensis*, floret Maio.

*Eruca sylvestris*, flor. Iun.

*Eruca sylvestris nostra*, flor. Maio.

*Eruca sylvestris non foetida*, tenera, floret Iulio.

*Eruca sylvestris foetida*, florebat Maio, pallidis, tanquam in spica, flosculis.

*Eruca sylvestris Fuchsj*, quam sinapi album sylvestre interpretatur, flor. Maio. Itē *eruca sylvestris nostra*.

*Eruum sylvestre minus* (nam maius in monte Albio reperi) folijs binis, longiusculis cum capreolo per medium: floribus in corymbo pulchris, luteis, loti genus, quod ab ingluvie columbina denominamus, referentibus, flor. Iul.

*Eruum Fuchsj*, flor. Iul.

*Eryca montana Glarona allata*, floret ut aiunt rupibus adnata, toto anno, (siue reuera, siue quod flores etiam siccati fortè colorem retineant) aliàs Feb. & Martio.

*Eryngij* id est cardui cuiusdam odorati species, reddi stel/*manethrüw*/ flor. Maio.

*Eryngium marinum* in horto Argentinensi, ad finem Iul. flor.

*Eryngium alpinū cœruleum*, edler di stel/ flor. Aug.

*Erysimon Fuchsj*, quod interpretatur sinapi sylvestre, flor. Iun. Erysi-

Erysimon hortense, cruca nobilis vel  
vel minor, flor. Iul. & August.

Erysimon, aliquando Maio incipit flor.

Erysimi sylvestris species, vide in Ver-  
bena.

Erysimon hortense, parcè florebat O-  
sobri.

Efulæ tria genera, flor. Iul.

Efula, pityusa, flor. Apr.

Efula (pityusa Dioscorid.) sed infre-  
quens, flor. Aug.

Efula dulcis, Congener Militari Plinij,  
florete Aprili.

Efula rotunda, peplos, flor. Iul.

Efula, flor. Maio.

Efulam scabiosam nunquam florere pu-  
to: & fortè seminis loco ei sunt asperitates il-  
læ in folijs supinis, vt filici, polypodio &  
alijs.

Euphrasia, argentrost/ flor. Iul. & Aug.

Eupatorium, Augusto florete sed rarius,  
ferè enim iam defloruit.

Eupatorium Græcorum, agrimonia,  
florete Iulio.

Eupatorium Auicennæ vt aliqui pu-  
tant, quod iuxta aquas nascitur, in hæcraff/   
floribus ferè origani communis, Iulio, &  
Augusto.



## EE COLLECTIONE

Eupatorium Mesue secundum quosdam, costo hortensi cognatum, flor. Aug. Eupatorium aquaticum, manserast.

Eupatorium aquaticum. Vide in Iulio.

## F

Faba, floret Maio & Iunio.

Fagus suis iulis circa diem D. Georgij, in Aprili.

Fagus, fert glandes Septemb.

Fagus sepium apud nos dicta, hagenbûch/ cuius lignum durissimum, fructum Septemb. fert.

Ficus principio & medio Septēbri mihi in horto maturuerunt, licet loco ymbroso plantata.

Ficus, in Italia fructum fert Augusto.

Filipendula, floret Maio: principio Iulij ferè defloruit

Filius ante patrem maior & maximus, qui rododaphne cognatus videtur: hîc iam in Augusto ferè defloruit, & canos in siliquis hiantibus ostendit.

Filius ante patrem maior & minor: vñd Des feur frant/ id est maximus, floret Iulio. Species vna mollibus & lanuginosis folijs am Katzen see/ floret Iunio.

Filij

Filij ante patrem species maior ad aquas, floret Iunio.

Filius ante patrem minor, in muris ciuitatis, floret Iunio. Et tertia species sylvestris maxima, rhododaphne folijs, floret Iunio.

Filius ante patrem maximus, rhododaphne cognatus fortè, semen fert Augusto.

Filix in nocte, quæ diem D. Ioannis sacrum præcedit, vide Tragum, quo tempore semen faciat.

Filices effodiuntur vergiliarum occasu.

Flos Iouis, incipit florere Maij medio: floret etiam Iulio.

Flos Iouis purpureus & albus, florent Iunio Augustoque. *Die himmel blümle*, Septembri.

Flos Portugallicus vel Indicus minor, floret Iunio & Iulio.

*Flübirle*/propè Curiam, florebat Decembri 63. anno, & fructus nasci incipientes habebat.

Fœniculum floret Iunio, Iulio, Augusto, Septembri & Octobri: semen habet Septembri.

Fœnogræcum floret Iulio.

Fragaria floret Aprili & Iulio: semen fert Iunio,

Fragaria vere, & tota æstate, floret in-

## DE COLLECTIONE

quam maximam autumnii partem.

Fragaria minor sterilis ad sepes apricas (mas) quaternis folijs florum inter se discretis, principio Martij aut prius floret.

Fragaria sterilis, hirsutior, minor, marem dixeris, Feb. floret.

Fraga in altis montibus, Augusto semen ferunt.

Fraga rubra, alba, principio Iulij habentur.

Fraga in fine Maij florent: quædam in medio, pauca. Fructus fragariæ, æstatis initio, ante cerasa, & aliquandiu cum cerasis inveniuntur, montanis quidem locis, & frigidis, tardius quàm contrarijs. Alba Maio & Iunio florent.

Fraxinella, vide Dictamnus.

Fraxinus aucuparia, floret in fine Maij.

Fraxinus, fructum fert Septemb. supra Tigurum ad 4. milliaria copiosè in montibus: apud nos non fert fructum. Bey Walslstatt: fructum fert Octob.

Frumentum Turcicum, floret Iulio.

Frumentum Turcicum Fuchsj, quadruplex, granis rufis, purpureis, luteis, subcandidis, florent Augusto.

Fumaria, sed rarissima, floret Febr. aliàs Maio, Iunio, Iulio, aliquando & Nouemb.

Fungo-

Fungorum genus præcipuum, & cibo gratissimum gignitur verno tempore, ab Aprili mense, usque ad Maij principia, hoc Germani vocant *Morchlen* (suillos) pileoli instar, foraminulentum foris, hinc dictum pro uerbium, *Du nimmet zu wie die Morchlen im Meyen*,

Fungi vulgares, qui vulgò coqui solent, *Heiderling* dicti, Iunio mense primum cernuntur, & ab eo tempore ad Augustum usque mensem, pileolis rotundis, & latis similes.

Fungi genus magnum, quod à figura vocant *hasenrötle*, cinerei ferè coloris, Augusto mense reperitur in sylvis propè radices quercuum.

Fungi etiam esculenti vulgò *Röddling* dicti, frutetis & arbutis cæsis, exustisque, & terra frequentibus pluuijs humectata nascuntur per sylvas, Augusto mense.



*Galiopsis* secundum aliquos, *Brannwurtz*, floret Iulio & Augusto.

*Gallion*, *Gälber augentrost*, floret Iunio & Iulio.

*Genista* maior, floret Maio, aliquando autumno.

*Genista* minor non spinosa, circa Pentecostem.

## DE COLLECTIONE

costen floret, mense Iunio, vt plurimum, inde nomen apud nos, *Pfingstblumen/ferbblümen*: Flos tinctorius Fuchsj, Iunio & Iulio floret. Spinosa & foliosa citius floret.

Genistella, genista minor spinosa, Maio, sed copiosius Iunio circa Pentecosten, *Stechendpfrimmen*.

Genistella aculeata, & altera caule foliato, semen facit Augusto.

Gentiana floret Iunio.

Gentianæ species, *madelgâr* dicta vulgò, floret in fine Iunij.

Gentianæ species quam cruciatam aliqui vocant, *madelgâr*, ab incisione radicis cruciformi, floret Iulio.

Gentiana cruciata, à dissecta crucis instar radice, semina minima, subruffa, subrotunda, cum gentiana magna lata habeat semina, profert Aug.

Gentiana minor in alpibus, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis vel duorum crassitudine, amariore quàm gentianæ maioris, *wachst höher vnd wilder*/floret Augusto. Item die groß Bitterwurtz in alpibus. Item Gentiana palustris florent Augusti medio & fine.

Gentiana pumilla, flosculo cœruleo instar calathi, in pratis humidis, radiculis albis, rara,

bis, rara, floret Octobri.

Geranium primum, Storckenschnabel,  
floret Aprili.

Geranij genus secundum, folio maluacio  
tertium & quartum, quæ vulgò dicuntur  
Taubenfuss, Rüpprechtskraut/ Kranetsbals  
Fuchsis, floret Maio.

Geranij genus, quod gratiam Dei vocât.  
floret Iunio. Et eiusdem genus montanum,  
quod radicem sanguinis appellant.

Geranium maius seu montanum, floret  
in fine Aprilis.

Geranij, vel sideritidis species, quæ vul-  
gò gratia Dei dicitur, floret Augusto.

Geranij species, apij ferè folijs, floret De-  
cemb. princ.

Geranium montanum, Blutwurz, medio  
& fine Maij floret.

Gerontopogon vel herba illa quam ali-  
qui Tragopogona vocant, habermarck, lu-  
teo flore, & alia species puniceo, ex Italia,  
Girasole, vel barba de becco, floret Maio.

Geum, benedicta, caryophyllata, floret  
Augusto. vide Caryophyllata

Gladiolus seu Xiphium, floret Iunio.

Gladiolus aquaticus., Maio floret.

Glycyrriza, dulcis radix, floret Iulio, & se-  
men fert Septembri.

## DE COLLECTIONE

Gnaphalij genus, sed mollius, *Baserps* dicitur, cuius flores non decidunt, candidi rosei, subpurpurei, floret April.

Gnaphalion, *Kürkraut* / floret Iulio.

*Matteusflachs* / cuius flores non obseruari, & nescio an villos habeat, pappi eius instar lanæ xylinæ dependent, fert fructū Iun.

Graminis genera diuersa, florent Maio.

Gramen Fuchsi, floret Maio.

Graminis genus radice geniculata, denticulata, culmo cubitali, flosculis albis, p. spica puto ceu folijs floret Iulio.

Gramen collinum, panicula vel spica florum pallida, dodrantali coliculo, *ευσορία* est foliorum, per transversum, radiculae albæ, floret Maio. Vide an Schoenantho cognata herba?

Gramen vulnerariū, floret in fine April.

Gramen in arenosis & muris minus plerisque in genere graminis, radicibus denticulatis (sunt autem dentes initia germinum) & articulatis reptat, floret Iun.

Gramen quoddam duriusculum, floribus subflauis, Martio.

Graminis vel auenæ sylvestris genus, radicibus nodosis vt in xiphio, sed pluribus interdum nodis, in fine Iun. fructum vt auena ostendit. Radicum sapor puto nitrosus.

Grami-

Graminis genera varia fructum faciunt  
Iunio.

Granum nil, vide conuoluulus.

Granum Nil, cuius flores noctu se ape-  
riunt, in meridie pereunt, floret Septemb.

Gratiola quam centaurium aquaticū di-  
xeris. Hoc fortè est polemonium palustre  
amarum, cuius meminit Hippocrates vete-  
rinarius, in Hippiatricis Græcis ca. 32. inter  
remedia hepatica, equo per nares infundi  
iubens cum vino colatum. Sic autè inquit,

ἢ ἐν ὄνυο διυθέσας δίδω πολυμάγισιν τὸ ἐν ἡλίῳ τιμώμενον, κα-  
λαμίνθη τοίκος, ποιότῃ τε ἔχει πικρὸν Hoc est, aut polo-

monium, quod in paludibus nascitur, & ca-  
lamintham refert, amarū gustu, vino perco-  
latum dato. (Incipit aliquando Maio flore-  
re.) nisi de Hydropipere Ruellij sentiat,  
quod & ipsum pro Eupatorio (Auicennæ)  
à quibusdam accipitur: floret Iul. plerunq.

Gratiola minor, floret in fine Iunij. Sic vo-  
co herbulam fruticosam, etsi subdulcem: se-  
mel tantum mihi visam.

## H

Hæsentöl/ floret Iulio.

Hedera terrestris vulgò dicta, gundelra  
floret Martio, Aprili, & Maio.



Heliotropium minus, folio ocimi, odore graui, floribus albis in se retortis *ελικοειδές*. Semen quidam commendat ad quartanas puto, floret Iulio.

Heliotropij genus quoddam, vergiß min nit, floret Iulio & Iunio.

Heliotropio congener, aut scorpioidi herba, flore cœruleo, in palustribus nascens vergiß nit mein, floret Aprili.

Helxine, parietaria, floret Iulio & Oëtob.

Helxine in horto meo, floret Aug.

Helxine cissampelos, vide conuoluulus.

Helxine cissampelos, floret Aug.

Helxine semen fert Oëtob.

Hepatica terrestris, trinitas, circa initium Aprilis ferè defloruit, & post florem folia noua producit, hyemalibus amissis.

Hepatica terrestris vulgò dicta, Italis trinitas, guldin läberfrut vel aurea, floret Martio, hæc per hyemem etiam florum calyces ostendit, & cum primū calor inuitat, aperit.

Hepatica terrestris, semen fert Aprili.

Heptaphyllon, Tormentilla, principio Iunij floret.

Herba Iulia, vel S. Mariæ, vt aliqui vocāt, costo hortensi congener, floret Oëtob.

Herba Iudaica, floret Iulio. Cognata ei quædam ex loco vmbroso, vß dem hard/ in horto

horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ, dilutioribus.

Herba nascens in aruis, similis ferè folijs herbæ Iudæicæ (vide ne sit illa ipsa: videtur sanè) vel tetrahit dictæ, dodrantalis, graui odore, floribus albis vna, altera purpureis, semine nigro, quaternio vt in vrticæ mortuæ speciebus, flores & semina Augusto mense profert.

Herba S. Antonij, Augusto semen fert.

Herba Trinitatis cœrulea sex plerunque folijs florum, alba, id est, albo flore, folijs nouem, vt in meo hortulo apparet: audio etiā purpuream, inueniri, floret Martio.

Herniaria de anno superiore, floret Iul.

Herniaria, floret medio August.

Heydenbysop, floret Iulio.

Hieracium vtrunq;, floret Aug.

Hieracij genus in pratis, floret Iunij fine & Iulio, herba pauci succi, folijs molli lanugine, &c. & in muris ciuitatum.

Hieracium pratense asperum, quod & in muris ciuitatis, floret Iulio.

Hieracium syluestre in pratis, herba asperæ lanuginis, caule striato, folijs tres aut quatuor digitos longis, integris ferè ambitu modicè angulosis: horum quæ inferiora versus

## DE COLLECTIONE

radicem sunt, initium habent angustius, & in latius abeunt: superiora verò contrà è latioribus contrahuntur. Caulis simplex, flos luteus, floret Aug.

Hieracium minus, vulgò dens leonis, floret Aprili.

Hieracium minus, sed rarius. Item procerum in pratis, floret Maio.

Hieracium minimum, calyculo nigrante, floret Septemb.

Hieracium quoddam radice satis magna, sed folijs quàm in còmuni minoribus, Martio floret.

Hieraciũ alterũ, & ð:lefraut, floret Octob. & semen profert Octob.

Hippofellinum, olusatrum, floret Iul.

Hippuris vtraq;, floret Iulio.

Hippuris lacustris quædam, folijs mansa arenosis, in fine Iulij floret, vt puto.

Hirci barba, herba dulcis lactaria, habet marcet, alia quàm Tragopogon veterum, floret Iunio.

Hirundinaria, vide Asclepias.

Hordeum Iun. sine fructum fert.

Hordeũ metitur alibi Agu. alibi citius.

Hyacinthi siue bulbi sylvestris, floribus cœruleis genera quatuor, florent Martio.

Hydropiper, persicaria acris, semen fert Aug. Hydro-

Hydropiper, id est, persicaria sine maculis, floret Aug. & subinde semen profert.

Hyoscyamus tota æstate, sed præcipuè Iulio floret.

Hyoscyamus vulgaris, floret medio & fine Maij.

Hyoscyamus communis & Syriacus, floret Iunio.

Hyoscyamus è sylua semine luteo, floret Iul. medio.

Hyoscyamus Syriacus, semen fert Aug.

Hypericon Fuchsj, perforata, floret Iul. (species maior, caule quadrangulo, folijs nõ perforatis.)

Hypericon, vel androsæmon perforata, floret Augusto.

Hypericon minus, floret initio Iunij.

Hypoglossis vel laurus Alexandrina, floret initio Decemb.

Hyssopus, floret Iulio.

Hyssopus alba, floret Iulio.

Hyssopus rara, floret Nouemb.

Hyssopus in horto meo, floret Aug.

## I

Iacea, Iunio floret.

D. Iacobi herba, floret Iun.

D. Iacobi flos, floret Iul. & Aug.

Iasminum, medio Iunij incipit florere, & Iulio.

## DE COLLECTIONE

Iberis, *gauchblumen*, genus nasturtij syl-  
uestris, floret Maio.

Iberis Matthioli, floret Aug. & Octob.

Ibiscus, floret Iunio, Iulio & Augusto.

Herba ignota, Lepidion vel Iberidi cog-  
nata, puto, flosculis albis, priusquam se ape-  
riant puniceis, folijs serè nasturtij maioris,  
ramulis multis distortis, bipedalis: radice al-  
ba, simplici, intus nervosa, acri, cùm superfi-  
cies insignem acrimoniam non habeat, flo-  
ret Septemb. Est autem Iberis Matthioli.

Ignota circa lacum Felium, flosculis cœru-  
leis, vt in hederâ terrestri, geminis semper,  
& c. floret Iul.

Herba ignota, quam heliotropium puta-  
bam, folio ocimi, læui, Corchorus vocari po-  
test, floret Iulio.

Innominata quædam fœtida, pinguis, fo-  
lijs vt botrys, floribus senecionis, floret  
Iulio.

Ilex aquifolia, *Stechend palmen*. Fructû  
Septemb. fert.

Illecebra, vel Telephium sedi genus mini-  
mum, floret Iunio.

Indici flores crocei, Caryophylli Indici  
dicti: minor & maior specie, floret Septerm.  
(Sed maior nunc primum incipit florere:  
minor Iunio) simplices & cōfereti in utroq;  
genere.

Intubus

Intubus satius Iunio & Iulio floret. Cichorium etiam, id est, sylvestris intubus eodem tempore incipit florere, in autumnum usque durans.

Intubi genus quoddam luteo flore, scabrum, subtenerum, ex amaro subdulce, floret Iunio.

Intubus, vide supra Cichorium.

Inula, floret Iulio, Augusto.

Iouis flos, Dondernägele/himmelrösle, floret Iulio.

Iouis flos, floret Octobri, purpureus & albus.

Iouis flos rarissimus, floret Nouemb.

Irio non foetidus (dentelaria quibusdam) acerrimus, in horto meo fructum ferebat Octobri.

Iris, floret in fine Aprilis, Maij principio & medio.

Iris minor sylvestris in horto meo, floret Maio.

Ex sativa itidem in horto meo Maio floret,

Isatis sylvestris, floret Maio.

Iua illa aruensis, fortè arthemisia heptaphyllos: quæ & pro scordio videtur substitui posse, paulò minus efficax amarore, simili flore, toto similiter viscido, floret Iulio.

Iulia Italica dicta, sub finem Iun. incipit flo

## DE COLLECTIONE

rere. An Iulia à mense Iulio dicitur?

Iuniperus Maio mense, cùm pluuium fuerit cœlum, luteam è cortice sudat lachrymā, quæ magna in copia tanquam fungi exigui arbori adhærent, nec admodum adorata est.

Iuniperis, Maio mense tenuissimus, ac luteus puluis in auras auolat: quod semen illi esse animaduerti, quanquam & è nucleis lapidosi, quæ baccis continentur, nouæ iuniperi plantulæ fructificant, Tragus.

Iuniperus cuius baccæ altero demum anno maturescunt, Septemb. fert.

Iuniperus, baccas fert Octob. maturas.

### L

Lactucæ, florent Iulio & Sept.

Lactuca sylvestris, qua pro endiuia hætenus vsi sunt Pharmacopolæ, Fuchsius: floret Iulio.

Lactucæ sylvestris genus in muris, flosculo cœruleo instar calathi exigui, floret Sep. & eodem semen fert.

Lactucæ sylvestris genus quoddam procerum, flosculis exiguis luteis, pappis nullis, floret Iun. Lactuca sylvestris Galeni in muris sæpe nascens, rote Bletter, floret Iun.

Lactucæ sylvestris genus læuis, floribus lauis, in area mea, floret Aug. La-

*Lactucam syluaticam*, quæ cœruleum flo-  
rem apud nos fert, in altis montibus, vidi  
melino flore, mensis Augusti fine florere.

*Lactucæ syluestres* semen habent No-  
uembri.

*Lagopus, aruense trifolium*, floret Iunio,  
Iulio.

*Lagopus, fastigiale flos*, floret Aug.

*Lampfana*, floret Maio.

*Lampfana*, flore luteo vel *Lapsana*, (& al-  
bo flore puto *rapistrum*) floret Iunio.

*Lancea Christi*, quæ locis riguis prouenit,  
folijs oblongis, dissectis, quadratis caulibus,  
verticillatis, vt in *marrubio*, flosculis albis,  
cum exiguis parpureis punctis, floret Iulio.  
*Sideritin* primam facit *Matthiolus*.

*Lantana* vulgò *Italis* dicta frutex, virgis  
lentis, floret Maio & Iun. dictus fortè à len-  
tis ramulis: *Fleiner mälbaum*.

*Lantana frutex* rubros potius adhuc aci-  
nos habet, in Iul. qui Aug. demum puto ni-  
grescunt, & Sept.

*Lappa maior*, vide *Personata*.

*Lapathi* genera quatuor, florent Maio.

*Lapathi* seu *rumicis* genus, quod vul-  
gò bonum *Heinrichum* vocamus, *Fuchsius*  
tertium genus *Lapathi* facit, floret Sept.

*Lapathū*, cuius radicis vsus est ad scabiē,  
floret Octob.



## DE COLLECTIONE

*Lapathum hortense* magnū, floret. April.

*Lapathum aquaticum*, *hydrolapathum*, folijs angustis, parum lanuginosis, ad fossas aquarum. *Hydrodracuntium* Aldrouando à floris similitudine cum *bistorta*, floret Iul.

*Lapathi* genera semen faciunt Iulio.

*Lapathum*, *oxalis*, fructum fert Iunio.

*Lathyris* floret in fine Maij & Iunio.

*Lathyris*, *cataputia minor*, floret August.

*Lattoris* Plinij secundum aliquos, in hortu meo, genus *lactucæ sylvestris*, floret Octobri.

*Lauendula* floret Iunio.

*Lauendula* Iulio mense ferè defloruit.

*Lauendulæ* paucæ, florent Septemb.

*Laureolæ* illud genus, quod vulgò *Syländ* vocant nostri, ante folia floret Feb.

*Laureola vulgaris*, *Syländ* in alpibus semen fert Augusto.

*Laureolæ* puto species in monte propè Curiam, parua, angustis folijs, paulò maioribus quàm *rorismarini*, flosculis purpureis, odoratis, ut am *Syländ*. Cauliculus lignosus, sed valde lentus est, non ultra septem digitos altus, floret Iunio.

*Lens palustris* flosculis tripartitis, floret Maio.

*Lens* floret Iunio & Iulio.

Lenti-

Lentibularia, vide Meon aquaticum.

Lepidium Æginetæ, in horto meo floret Iulio.

Lepidium folijs lauri, semen profert Octobri.

Lepidium Æginetæ folijs laurinis maioribus, floret Iunio.

Leucoij genera tria, florent Maio.

Leucoia, florent Septemb.

Leucoium, keiri, Martij principio emergens, statim floris rudimenta ostendit, integer apparet ad finem eiusdem.

Leucoium, keiri: & Strasburger nägely puniceum, & Roseum, odoratius, rari- usque: & album, flor. Maio.

Leucoiō bulbosum, weißho:nung blü- men/violas subolet.

Leucoium bulbosum, Theophrasti, floret Mart.

Leucoium, floribus violaceis, in horto Didymi, flor. Iul.

Leucoion luteum, & album, floret Aprili.

Leucoia medicorum, florent Aug.

Leucoium purpureum, Strasburger nägely/flor, Octob.

Leucoium sylvestre floribus luteis, parvis, flor. Iul. Argent.

# DE COLLECTIONE

Leucoia, rara, floret Nouem.

Libanotis, coronaria, rosmarinus, floret  
Septem. & Octob.

Libanotis Italica vel Ferula, floret Iulio.

Libanotidis species ex Italia, floribus luteis in umbellis, &c. flor. medio Iul.

Libanotidis ferulaceæ genus, ex Italia missum, his annis, in hortis nostris satum nō potuit semen perficere ante frigora, etiam Octob. Perfecit postea anno 57. circa medium Octobrem pauca, eadem planta, quæ iam annos durauerat circiter octo, & fortè diutius durat, quod seminibus maturandis non exhauriatur & radices, validas ac liquore plenas habeat.

Lichen, hepatica, flor. Iun.

Lichen, flosculis stellatis, loco humido, Sym rad (non videntur odorati, vt in lapidibus) flor. Iul.

Ligustraria, qua pro elleboro nigro quidam vtuntur, flor. in fine Apr.

Ligustrum, incipit florere Maij medio.

Ligustrum, vel (vt aliqui putant) phillyrea, Iunio plerunq; floret.

Ligustrum, Beimbultzen / Ferngerten / fructum fert Sept Octob. & Nouemb.

Ligustrum aquaticum, faulbaum / 3ae  
pfeile

pfenbaum/in medio medicinæ vfu, Septem.  
fructum habet.

Lilium Mariæ, quod quidam narcissum  
putant: mihi non videtur, vnser frauen gül  
gen/flor. April.

Lilij genus quod pro Asphodelo vsur-  
pant, floret Maij medio & fine.

Lilium rubrum flor. Maio.

Lilium album in fine Iunij: & croceum,  
vel rubrum, medio eiusdem floret.

Lilium aquaticum, vide Acorus fal-  
sus.

Lilium conuallium, cui & nomen a-  
pud nos ab hoc mense, Meyenryß / floret  
Maio, & aliquando April.

Lilium conuallium, fert semen Iulio.

Limonium Fontanoni, in horto Didy-  
mi, flor. Iul.

Limonium nostrum, vide Bistorta.

Limonium, bistorta rara, floret Au-  
gusto.

Linaria, floret circa finem Iunij, aliàs me-  
dio eiusdem: itemq; Iul.

Linaria, quam aliqui veterum osyrim  
putant, flor. Aug.

Lingua herba, Matterzung / flor. Maio.

Linum, floret Iun. & Iul.

Linum syluestre, flor. Iul.

## DE COLLECTIONE

Lithospermi florum principia Decem.  
se ostendunt locis tepidis.

Lithospermon, vnicaule locis cultis, flo-  
ret Aprili.

Lithospermon minus, aruense, vnicau-  
le & multi caule, Maio florent.

Lithospermon, floret Iun. & Iulio.

Lithospermum, milium Solis, semen  
fert Augusto.

Locusta herba, *Nüßle fraut* / in acerarijs  
grata, floret Iulio & Maio & præterea No-  
uembri.

Lotus vrbana *gäl stund fraut* / id est, Tri-  
folium caballinum, floret Aug.

Lotus vrbana, floret Octobri & sylue-  
stris, aliquando, pro sationis diuersitate.

Lotus syluestris, floret in fine Iunij, *Das  
gmein stund fraut mit wyssen blümen* / Vr-  
bana eiusdem generis, eodemque odore, flo-  
re tantum luteo, & siliquis differt, tardius in  
horto meo, ex Italia nuper missa, floruit Au-  
gusto, Septembri, & Octobri mensibus, Ita-  
li veram melilotum putant.

Lotus syluestris, id est trifolium caballi-  
num, floret Iunio, & semen fert Augusto.

Lotus syluestris, *ziger fraut* / principio  
Iul. ferè defloruerat.

Lotus inodorus floribus luteis, crispis,  
flor. Iun. Loti

Loti vel Meleloti quædam species inodora, gæle Dubenfröpple / primo quo nascitur anno, florem edit Iulio. Itemq; species alia maior, am Farzen see.

Lunariæ species folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in umbello subflavis, singuli flosculi foliolis constant quaternis, reflexis. Seui initio veris, & Octobris nono primum, in vna stirpe flores apparuerunt: in alijs nulli dum.

Lunaria Græca, toto Aprili floret.

Lunaria montana circa stabula pecorû, Bðni / floret Maio.

Lunaria Græca, quæ siliquas latas producit, vna rotundiores, altera oblongas, Augusto semen fert,

Lunarea lutia Alyssos quorundam, floret Aprili.

Lunaria Fuchsi, Non Fraut, alia quam lunaria arthritica, floret Iunio.

Lunaria in horto meo flûblûmen / gâl / audio & albas inueniri circa Vesam. Græca, siliquis argenteis. Alia à Gratorolo missa, siliquis scabris, flosculis luteis, in planta à superiore anno relicta, florent Maio omnes.

Lunaria Græca fert semen Iulio.

Lupinus floret Maio, & Iunio, & in horto meo Iulio.

## DE COLLECTIONE

Lupus salictarius flor. Aug. & eodem mense semen habet.

Lyfimachij genus secundum quosdam, quod herba scilicet Antonij vocatur, & filius ante patrem. Habet autem cum flore, semen quoq; partim maturum, partim etiam elapsum Augusto mense.

Lyfimachium luteum & rubrum radice lignosa, weiderich/ flor. Iul.

Lyfimachium flauum, incipit Iunij sine florere, paulò post purpureum lyfimachiũ.

Lyfimachij genus, in quo flosculus purpureus exilibus siliquis extremis enascitur, flores & semina profert Aug.

Lyfimachij genus flore rubro: & alterum luteo, floret Augusto.

## M

Mahaleb ad Vuesam semen facit Iul.

Maiorana, flor. Iul.

Maluæ tria genera Fuchsis: quorum primum vocat hortense, Ern roffen/ nobis dictum quod messibus floreat, flore magno, & patulo rosarum instar, & similiter aut multiplici, aut simplici flore, purpureo, vel candido: hanc Apuleius videtur hastulã regiam dicere: (malua maxima,) Sed hanc veteribus

bus pro hortensi, & fatiua in cibis vsitatam fuisse, non est veri simile: quin potius vulgarem maluam: siue punilam siue maiusculam (quam Fuchsius arborescentem vocat. Nos longè aliam dendromalachem id est arborescentem maluam cognoscimus) fatiuam olim fuisse crediderim. Hortensis (inquit Fuchsius) floret Iulio, & Augusto præcipuè, flos ei diuturnus. Syluestris minor per totam æstatem & in maximam autumnii partem durat: maior Iunio, & Iulio mensibus in primis floret. Est & aliud maluæ hortensis genus, paruum, pulcherrimum, quod Tragus depingit, & alceam peregrinam seu Venetam vocat, id quoque Iulio floret: Item aliud flore flauo, folijs integris in acutū desinentibus, fatiuum.

Malua maxima, hastula regia Apuleij Fuchsi o, *Ernrosen/gfult/einfach/wyß/vnd rot/flor Iul.*

Malua hortensis maior, cui nomen a pud nos à messe, flor. Aug.

Malua magna hortensis *ernrosen / flor. in fine Iunij.*

Malua vulgaris, flor. Aug.

Malua quædam domestica, item sic *ernrosen/Septemb.*

Malua crispa, magna, magnis & crispis



## DE COLLECTIONE

ambitum folijs, floribus paruis; floret Augusto.

Malua crispa in horto meo, Septembr. floret & Octob.

Malua sylvestris, flor. Maio.

Malua sylvestris maior, Iunio & Iulio in primis floret.;

Malorum genera initio Maij ferè florent.

Mala diuersorum generum, Augusto & Septembri maturescunt.

Mali vernæ, Theophrastus meminit Iunio fructum facere.

Malus præcox, paradysle baum, fructû Iunio fert, & Iulio.

Mala quædam in primis cotonea, & sylvestria (quæ sint ex malis priora, quæ tardiora) Octob.

Mala insana maturantur Augusto: herba personatæ ferè folijs, & caule.

Malum insanum Fuchsj & aliorum, flore cœruleo, apicibus luteis, flor. Augusto.

Malum insanum, in horto meo 59. Septemb. florebat, nullum ostendebat fructû, neq; Augusto.

Marrubium floret, Iunio, Iulio, & Augusto.

Marrubio similis herba, verticillis suis aculea-

aculeatis, purpureis floribus, folijs mercurialis, &c. Veteres quidam huiusmodi alysson describunt, flor. Aug.

Malua crispa, flor. Iul.

Medica duplex. Sativa flore violaceo, Iunij fine floret: crescit ad duos cubitos, & vix iam sustinet seipsam: tertio anno altius crescit, hominis statura, & citius floret. Altera sylvestris, medio & fine Iunij floret, corymbis flosculorum luteis: sapore eodem & reliqua specie similis: folia vtrisque modicè mucronantur: & versus mucronem margines leuiter exasperantur. Calidæ sunt in secundo gradu, inodoræ. Crescit hæc ad murum & in muro, & albi ad margines aggerum, & fossarum siccos.

Medica sylvestris & hortensis, flor. Iun.

Medica ex Italia floribus violaceis, floret Aug.

Medica cœrulea in fine Maij flor.

Medica, vide inter Trifolia.

Melampyrū vel Myagrus in horto meo, floret Maio.

Melampyrum, vide Myagros.

Melissa Fuchsij, flor. Maio & Iun.

Melilotus albus, flor. Iun.

Mellissophyllon flosculis albis, & peregrinum (quod fœtidius & magis cimices

## DE COLLECTIONE

refert) cœruleis, floret Augusto.

Mellissophyllum floribus pallidis, flor. Julio.

Melilotus, lutea & alba, *guldiner fleecins guten geruchs / sunderlich so er für ist* als Theophr. leert. Medica quibusdam credita, vtraque flore coloris violacci, & altera apud nos vulgari (locis saxosis) flauo, meliloto nostro similis inodora, &c. flor. Iul.

Melilotus lutea, & alba, odorata, florent Augusto.

Melilotus inodora folijs ternis à caule remotis, & ad caulem binis, *gäle Duben frö pfe* Lotus puto Fuchsj, flor. Iun.

Melilotus crispa, flore crispo, inodora, semina conuoluta habet cochleatim ferè vt medica, sed minus & minora, floret Iunij initio.

Meliloti inodori species in muro fossæ ciuitatis, in fine Maij flores habet in corymbis luteos. Calida est in secundo gradu, subacris, tenuium partium: non reperiò in Trago. An Medicæ species?

Meliloto similis inodorata, capitulo florum rotundo, flauo, *stein fleec*. Medicæ species aliquibus, flor. Aug.

Meliloti inodori species *stein fleec*, quæ Medica syluestris dici potest, flor. Iun.

Meliloti

Meliloti sylvestris species humilis, binis  
 & regione foliolis, cuius lutei flores, suauem  
 quendam & ferè lactis odorem referunt: in  
 prato infra turrim in Gard / floret Maio &  
 Iunio. Siliquas curuas & vnguium specie  
 profert Iunio adulto, vel in fine Iunij.

Melilotus agrestis, flor. Iun.

Meliloti loco quidam herba trifolia flo-  
 ribus luteis, sed inodora vtuntur: stem flec.  
 Sed est alia quoque saxifraga lutea, quam  
 sic nominant, in Germania inferiore, fo-  
 lijs ferè aquilegiæ, radice lutea, floret Iu-  
 lio.

Melo, vel Melopepon, floret Augu-  
 sto.

Menthæ genera, flor. Aug.

Menta, flor. Iul.

Mentastrum florere incipit initio Iunij,  
 Iul. & Aug.

Meum quorundam, alijs species seselis,  
 Bærwurtz / flor. Iun.

Meon aquaticum circa lacum felium,  
 folia enim vt Meon Bærwurtz exilia & si-  
 militer diuisa habet, ijsque adnatas passim  
 bullas quasdam *φαιοειδεις*, floret Iulio  
 dentibularia nominetur (nam Meon alij a-  
 liud ostendunt) sine radice floribus fla-  
 uis, &c.

## DE COLLECTIONE

Mercurialis, floret Maio, Iulio, Augusto.  
Septemb. Nouemb.

Mercurialis fœmina, flor. Iun.

Mercurialis syluatica mas & fœmina,  
sed ille rarior nobis, Martij medio floret.  
Mercurialis syluatica, teste Trago, se occul-  
tat vel interit Maio vel paulò post.

Mercurialis mas & fœmina semen ferūt  
Augusto.

Mespilus nostra, in fine Aprilis, quando  
que in Maio floret: fructum Octob. profert.

Millefolium vulgò dictum, garben/ al-  
bum & rubens, flor. Iul. & Aug.

Millefolium flore rubro, floret Iunij  
medio.

Millefolium luteis floribus: item pere-  
grinum vel odoratum, flor. Iul.

Millefolium aquaticum quoddam, flo-  
re albo ranunculi, insipidum, &c. floret  
Maio.

Milium, flor. Aug.

Milium Indicum vel Æthiopicum, an-  
no 58. in horto meo flor. Iul.

Mießbeere fructum ferunt ad finem  
Martij, sub niuib. maturescunt, Bünfas  
Gen see.

Morsus diaboli, flor. Aug. & Sept.

Morus fructum fert Augusto.

Musca-

Muscicella Cordi (Ophiogloss.) Maio interit vel se potius occultat.

Myagrus aliquando, relictus nimirum à superiore æstate, Feb. flor.

Myrica floret medio & fine Maij & Iul.

Myrica Iunij initio ferè defloruerat.

Myrrhis, id est cicutaria, vt quidam putant, flor. Maio.

Myrrhis cerefolij ferè sapore, dulcior, floret anno secundo, medio & fine Apr.

Myrrhidis (sic nominemus vel cicutariæ, vel Pastinacæ syluestris) species in vijs inter vites versus Sollicfen. Item Peregrina quædam satiuæ: vna olet folijs cuminum Romanum, alia veluti raphanum syluestre, habent radices magnas & validas, flor. Iun.

## N

Nardus vulgaris, pseudonardus floret Iun. Iul. deflorescit.

Narcissus ille quorundam, & Tragi veras, qui mihi potius anemone limonia videtur, nostri Liliū diuæ Mariæ vocant, cuius floris odor suauissimus sed lenis, floret Apr. & Maio.

Nasturtium floret Iun. Sept.

Nasturtium pratense, gauch Blümen/

## DE COLLECTIONE

floret April. Itemque hortense anni superioris.

Nasturtium palustre, floribus melinis, parum acre, flor. Maio.

Nasturtium aquaticum, floribus flauis, circa lacum, flor. Iul.

Nasturtium petraeum, herbula omnium minima, flosculis candidis, floret April.

Nigella, flor. Maio.

Nigella flore luteo, flor. Iul.

Nigella coronata calyce, fatiua, maior, foliosa. Minor syluestris puto flore è luteo subuiridi: prior cœruleum florem habet, floret Iunio.

Nigella fatiua, flor. Octob.

Nigella, *Sphabab* semen edit Iulio, Augusto.

Noli me tangere, flor. Iulio, & Iunio: locis verò frigidioribus & vmbrosis, medio, & fine August.

Nummularia floret in fine Maij (& genus minus acutius erectum in syluis) floret & Iunio.

Numularia Fuchsj, Vide Centimorbia.

Nux Juglans, iulis verè floret: Augusto & Septembri maturescit fructus & excutitur.

Nux

Nux vesicaria, pimperiſſe/floret Maio; matureſcit Septemb.

Nux Methel, Vide ſtrammonia.

Nymphæa vtraq; apud nos Maio, Junio que floret.

Nymphæa lutea floret Iulij principio in lacu noſtro.

## O

Ocimū baſilicū fl. Iun. & Aug. Baſilien.

Ocimi duo genera, ſlein vnd groſß Baſilien/florent Iulio.

Ocimum, baſilicum medium, album & purpureum, & ocimum citratum, odore meliffæ in horto meo, flor. Aug.

Ocimi folijs herba circa ſæpes naſcens, ſoſculis albis, poſt quos verrucæ relinquuntur, flor. Aug. Heliotropij genus aliquando putabam.

Ocimum Tragi, heidenkorn: quod aliqui cryſimon Theophraſti putant, flor. Iun.

Ocimoides, flor. Sep.

Ocimoides album duplex, rubrum duplex, & flauum, quod ſemel tantum vidi Lindauiz in horto Matthiæ Kurtz mercatoris, floret Iulio.

Ocimoides rubrum, quod floret in Iunio, in hortis conſitum.

Ocimoides rubrum, rarum inuentu:



& facilius in montibus quam alibi, floret Augusto

Ocimoides rubrum alpinum, Maij medio floret: & mox etiam album, quod tamen aliàs Iunio primum floret. Huius flores in sole flacescunt, vesperi & nocte redintegrantur: rubri semper integri manent, minusq; odorati sunt. Videtur & Ocimoides quoddam album minus odoratum esse in horto meo.

Ocimoides albo flore, calyce purpurascens vel viridi: vnum, medio apicem exerit; minus odoratum: alterum non, odoratius, quod eodem die marcescit: eadem differentia est in purpureis, floret Iunij fine.

Ocimoides albis floribus odoratis, quod aliqui non rectè ben album vocant, vt alij polemonium, Lidweich mit linden/hasenblättern/gstaltet wie die großen Basilien/vt ego interpretor, flor. Aug.

Ocimoides purpureum floret in fine Apr. & Octob.

Ocimoides purpureum dilutum albo cognatius odoratiusque alpino, etiam die se claudit: at album alpinum non clauditur, flor. Maio.

Ocimoides croceo flore, floret Iunij medio. Vocari verò sic potest propter floribus

ris speciem, omnino inodorum tamen.

Ocimoides peregrinum maius perenne:  
& minus, quod eodem anno floret, floret  
Augusto.

Ocimoides peregrinum minus, floret Se-  
ptembri.

Ocimoidis species peregrina minor, Au-  
gust. semen profert.

Ocimoides iam rarum, circa finem No-  
uemb. mensis floret.

Oenante herba filipendula, floret Iunio.

Oleæ plantula, in calidioribus locis Ger-  
maniæ, ut circa Rhenum, floret circa S. Ioan-  
nis diem, in Iunio.

Olusatrum in horto nostro floret Maio  
anno secundo puto à satione.

Ononis floret in fine Iunij & Iulio.

Ophrys Fuchsj, quæ alifinatis species vi-  
detur, Maio & Iunio mensibus floret, dein-  
de evanescit circa festum D. Ioannis Ba-  
ptistæ.

Orchis, vide Satyrium.

Orchis, genus bifolium ante caulem, cum  
& bulbum vnicum ostendit, postea caulis ac-  
cedit, flores è viridi pallidi, & foliola alia in  
caule, floret Maio.

Orchis genus illud rarius & elegãs, quod  
in flores habeat albicantes, minutos &

## DE COLLECTIONE

punctis rubicundis asperfos, capitulum ostendit puniceum, quod floribus nondum apertis constat, floret in Maio.

Orchis gen<sup>o</sup> illud quod *Tüfelse angficht* vocant, flore albo, item flore purpureo, vel communi, floret Iunio. In genere testiculorum, odoratiores sunt, quibus flosculi minores.

Orchis, id est, testiculi herbæ genera quædam: ex quibus id quod Serapiadem vel triorchin aliqui esse putant, in fine Maij, & initio Iunij apparet, deinde nusquam inveniri potest.

Oreoselinum aliud circa Basileam, floret Iulij principio.

Oreoselinum von Baden, floret Iul. & alię species duę oreoselini.

Origanum vulgare, floret Iunij fine, Iulio & Augusto.

Orminum hortense & pratense *scharlach*, floret Iulio: ferè enim tardius floret satiuo. Sed Fuchsius orminum vtrunq; Iunio mense floribus & semine prægnans esse scribit.

Orminum hortense, id est, Gallitricum, vt recentiores multi putant, *Scharlach*/vel potius *alectorolophos*, id est, gallicrista, à folijs cristæ gallinacæ instar ferratis, vnde & gallitrici vox corrupta videtur, floret Iunij

Iunij principio & medio.

Orminum sylvestre, floribus purpureis, nunquam prius mihi visum, floret 8. Iunij.

Orminum sylvestre, vel schlarea sylvestris, flore albo: & commune cœruleo, floret Maio.

Orminum sylvestre, quod & cœruleum & album inuenitur, floret Iunio.

Orminum vel gallitricum sylvestre, flore cœruleo, semen fert Iulio.

Ornithogalum, floret April.

Ornus, grosser málboum/wielâsch, ut ego interpretor, floret Iunio.

Ornus aucuparia, wielâschen, Aug. fructum fert, & Sept.

Orobanche nostra, quam nonum satyrij genus Tragus facit, floret Maio.

Orobanche Ruellij, floret Aug.

Oxalis, floret Maio.

Oxyacantha, Berberis, Erbßlen. Sed aliqui spinam albam vulgò dictam oxyacantham potius esse asserunt, quibus assentior: utraq; floret Maio, fructum facit Aug. Sept. & Octob. Augusto autem collibus & locis calidioribus.

Oxylapathum vulgare, floret Aug.

Oxys, alleluia, floret April. & Maio.

# DE COLLECTIONE

## P

Panaces Chironium, herba Doria, ni fallor, quorundam, nonnulli Limonium Matthioli vocabant, quod tamen non probo: in horto meo floruit Iunio, aliàs Iulio, primo gradu amara.

Panicum, floret Iunio.

Papaver sativum, floret Iunio, & Iulio.

Papaver cornutum, floret Iunio, Iulio & in fine Maij. Semina fert Nouembri.

Papaver erraticum, floret in fine Maij, Iunio, Iulio et Augusto: semen fert Septembri.

Paris herba, quam aliqui non rectè aconitum pardalianches faciunt, floret Maio.

Parthenium, matricaria, floret Maio, Iunij medio vel principio potius, & quandoq; Iulio.

Pastinacæ genera tria, radicum colore distincta, florent Iulio.

Pastinaca maior, Pastancy, semen fert Augusto.

Pastinaca erratica purpureo apice in medio umbellæ candidæ, vogelnâst, floret Iunio & Augusto: semen profert Septembri et Octobri.

Pastinacæ genus erraticum umbellis luteis, elaphoboscus quorundâ, floret Iunio.

Pastinaca sylvestris, umbellis luteis, Bren

frant/

*Frant*, diuersa à *Dauco syluestri*, quem *Dioscorides* *Pastinacam syluestrem* vocat: floret Iunio & Iulio.

*Pecten veneris*, floret Maio, in aruis, qui post flores albos relinquit siliquas tanquam acus: & Iulio.

*Pelecinus* floret Octob. *Securidaca*.

*Pelecinus syluestris*, herba & frutex in colle propè *Scaphusiam*, floret Maio.

*Pentaphylli*, id est, quinq; folij, tria genera, florent Maio.

*Pentaphyllum*, floret Iulio.

*Pentaphyllum minus*, quod locis apricis & siccis nascitur, præcipuè collibus, floret Mart. aliàs Septemb.

*Pentaphyllum petræum*, in saxis iuxta aditum fodinæ *Ferrariæ* in monte supra *Sergans*: sed plantæ erant paucissimæ, floret Augusto.

*Pentaphyllum erectum*, magnam, candidum subdus, trib<sup>9</sup> aut amplius à radice caulibus, floret Iunij initio

*Peplus*, esula rotunda, floret Iunio

*Peplus*, floret Maio.

*Perfoliata*, *Surcradye*, floret Iunio.

*Perfoliata alia*, quam aliqui ineptè *centaurium maius* vocant floret in fine Iunij in colle vbi calamentum gegit *Ser sylb:ugg.*

## DE COLLECTIONE

Flores in corymbis sunt lutei, folijs octenis conditi, subamari, bono sed leui odore. Item in colle ob der Spitaaler wesen.

Perfoliata rubra, Iunio floret.

Perforata, vide Androsæmon.

Periclymenon, caprifolium, incipit florescere Maij medio & fine, Iunio & Iulio: itemque Augusto, semen Septembri producit.

Periclymenon, Specf gilgen, principio Septembris floret. Bis floret in anno eadem ætate, sed fructum post secundum florem non potest perficere.

Periclymenus minor, gemellis acinis, rubentibus viscosis, Iulio fert acinos.

Perficus cuiuscunq; generis (trium generum) floret April.

Perficus Armeniaca, Berillele, floribus albis, odoratis, floret Mart.

Perficus, fructum Sept. profert.

Parfica duracina, carne rubenti, matura sunt Octob.

Perficaria maculata, quam aliqui molybdænam vocant, flore purpureo & albo, floret Iulio, & Iunio.

Perficaria, vide hydropiper.

Personata lappa maior, floret Iulio & Septembri.

Personata

Personata, Lappa maior, cuius seminis ad calculum vsus laudatur, semen fert O. Stobri.

Pes anserinus Tragi, & Fuchsj, Sewtod, nimirum Chenopus Plinij, floret Iulio.

Pes leonis, Sinnaw, floret Iunio.

Petasites, pestilentz wurtz, floret Martio, Aprili, & quandoq; Feb.

Petroselinum Fuchsj, si in hortis seratur: putat autem id esse quod officinæ vulgò amomum vocant: nesciens fortè Galenū scripsisse petroselinum, verum & Macedonicum propriè dictum, adeo amarum esse, vt amarore suo totam Theriacam inficiat, quod amomo vulgò dicto non conuenit, id ego igitur potius ammi verum, aut cuminum Æthiopicū esse suspicor. Pro vero autem petroselino astrantia nostra, vti consulo, donec verum adferatur. Iam enim ex Macedonia & Cōstantinopoli nuperrimè quosdam detulisse audio.

Peucedanum Fuchsj, floret Aug.

Peucedanum in horto meo, caule dorantali, folijs crassiusculis per terram sparsis, vmbellis albis, floret Maio.

Phalangitis, grassgilgen, asphodeli femina quibusdam: Et eiusdē species maior montana, odore & sapore in flore radiceq; lilij albi, floret Iul.



## DE COLLECTIONE

**Phalangium** vel phalangites Kentmanni, in fine Iunij floret, *Die wilden gras gilgely.*

**Phalaris** folijs arundinis, flore gramineo, pallido, spica elegante & conferta, latiuscula. Olingerus Norinberga misit, floret Iulio.

**Phillyrea** nostra, *fern gerten* floret Maio.

**Phoenix**, roren wilden haber. Iunio floret.

**Phu**, tota æstate floret. Fuchsius, qui Phu in maius, hortense, & minus, vulgare distinguit. Est & saxatile quoddam montanum, & palustre minimum, quod Aprili floret.

**Phu** hortense (& sylvestre in horto meo) circa finem & medium Maij floret & semen fert Iulio.

**Phu** (maius) **Dioscoridis**, floret Iunio.

**Phu** saxatile, & phu paruum saxatile, quod in vmbrosis & humidis montium faxis crescit, floret Aprili.

**Phu** minimum sylvestre, geniculatis radiculis, floret Aprili.

**Philosella** maior & minor. Maio & Iunio florent.

**Pimpinella**, floret Aprili, Maio & Iunio: Maior in pratis humidis Iulio: semen facit Iunio & Iulio.

**Pimpinella**, quæ & sanguisorba, Maio & Iunio floret.

**Pirus** plerumq; cum ceraso, floret Aprili.

**Pirorum**

Pirorum genera diuersa maturescunt August. & Sept.

Pira quæ à fœno denominamus *heerwbyren*, quod hæc sola immatura etiam fœno obruta & calore emollita, edantur, Iulio maturescunt.

Pira præcocia, & superba, *Muscat byrle*, Iulio maturescunt.

Pira quæ nostris *heerenbyren*, maturescunt Aug. medio.

Pira quæ *schürbyren* à nobis, maturescunt in fine Aug. & Sept.

Pira quæ nostris *Grauw cugstler* dicuntur, à calore nomen habent, boni saporis, & succo mediocri prædita, id est, non sicca aut friabilia, maturescunt medio August. & post.

Pira quædam, præsertim strangulanea & syluestria, matura sunt Octob.

Pirola vulgò dicta, *wintergrün*, quam quidam limonium putant, floret Iunij principio: ego bistortam pro limonio semper habui, nec dum muto sententiam.

Pisum, floret Iunio

Plantagines florent Maio & Aug. Iulio item, quo & semen edit, itemq; August. Nouemb. & Sept.

Plantago maior vel media potius, floret Iun.

## DE COLLECTIONE

Plantago minor, floret Iul.

Plantago aquatica, quam aliqui alisma veterum esse putant, floret Iunio.

Plantago aquatica semen fert Iul.

Pœonia, floret Maij principio & medio.

Pœonia, floret circa finem April. Mas in principio in horto meo, alias in fine, loco vmbroso & hyeme longiore.

Polemonium, floret Maio & Iulio, præsertim eius principio.

Polemonium Dioscoridis, floret Iul.

Polemonium petræū, floret Iulio: & hoc & Dioscoridis dictum, suavius olent vespere: in meridie flos ferè euanuit, vt hesperides dici mereantur, vtriq; ferè idem odor, suavis, non plenus.

Polemonium: quod duplex esse puto, vnum maius & longioribus folijs, nisi natalitij soli differentia est, floret Iun.

Polemoniū, Widerstoss, vt ego interpretor quod aliqui ben albū nō rectè vocitant, vt aliqui ocimoides album, in quo genere etiam rubrum habetur. Polemonium verò album tantum, floret Aug.

Polemonium Fontanoni in horto meo, floret Iunij principio.

Polemonium viscosum vel saxatile, floret Iunio.

Polemo-

Polemonium palustre, vide Gratiola.

Polemonium petræum, floret Maio, semen fert Iunio.

Polium nostrum Maij fine & Iunij principio floret.

Polycnemon, langer doß, floret Aug.

Polycnemon, origano simile, floret Iulio & Septemb.

Polycnemon origano vulgari simile, sed rarum, Lunariz speciem refert, folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in vmbella subflauis, singulis flosculi foliolis quaternis constant. Scui initio veris, & Octobris nono primum flores apparuerunt, in alijs verò nulli dum.

Polycnemon origano simile, quod & Clinopodion fortè appellari posset à figura: nam verticillum florum, aut seminum in summo caule impositum habet, veluti capitulum, vna hæc herba, quod sciam, semen Octob. facit.

Polycnemon vel Clinopodion maius semina gerit rotunda & subruffa, Nouembri.

Polygonatum, Weyßwurtz vtrumque, initio Maij floret, vel medio: alterum tamen prius sæpe Aprili.

Polygonatum erectum, semen fert Aug.

## DE COLLECTIONE

Polygonon, wāgtritt, floret Aug.

Polypodij radix colligenda est in fine Augusti.

Polytrichum Apuleij, vt quidam vocant, guldenreiderthon, floret Iun.

Populus suis iulis, floret Mar.

Populi nigrę gemmę turgentes colliguntur mense April.

Populi nigrę gemmę, mensis Sep. 19. turgere succo suo flauo vidi: & fortè is hoc tempore vtpote sicciore melior est, & minus aqueus quàm vere.

Porrum, floret Maio & Aug.

Porrum sectium syluestre in rupibus ripę Rheni zu Laufenberg, floret Iun.

Portulaca, Iunio & Iulio floret.

Potamogeton, Samfraut, floret Iul.

Prunella vulgò dicta, floret Maio, Iunio, Iulio, Augusto. Septemb. Octob. & Decemb. mensibus.

Prunus plerunque cum ceraso, floret Aprili.

Pruni genera quędam vrbana, inter quę tardissima sunt minima, cerea ferè per maturitatem. Supparten, maturescant Septe. & Octob. Alia verò cerea magna sunt, quę Augusto, si benè memini maturantur.

Pruni genus, maturescit fructibus circa finem

finem Iulij, cui fructus parui cœrulei dulciores, Blauw frieden.

Pruna cerea vel cereola, magna subdulcia, minima subcœrulea, acida, parum humida, Wynn frieden, maturescunt Aug.

Pruna nostra maturescunt Augusto.

Cœrulea, Blauw frieden.

Haber frieden fleiner dan die anderen.

Weyn frieden / fleine sure, subcœrulea vt & Haber frieden.

Wyß frieden / tardi⁹ aliquando matura gar vnd gar wyß.

Bockshödle halb wyß / halb rotlecht / aluum puto magis soluunt: & hæc aliqui alba vocant, sed minus propriè.

Prunus syluestris, in fine Martij floret perunq;, & April. principio.

Prunus syluestris, spinus, Schleehenbaum, Sept. & Octob. maturus est fructus.

Pseudamonium, floret April.

Pseudochamædrys, Schaafftraut der wild, caule puto simplici & longiore, floret Iunio.

Pseudochamædrys, gamanderle, floret Maio.

Pseudocyperus corymbis foetidis, semen fert Iulio.

Pseudomelanthium, Ratten, floret Iunio. men fert August.

## DE COLLECTIONE

*Pseudonardus*, vide *Nardus vulgaris*.

*Pseudorhaponticum*, folijs oblongis, florere puto mense Iunio circa finem.

*Psyllium*, Iulio & Aug. floret.

*Parmice*, floret Iunio & Augusto, quam *Ruellium* quidam sequati *pyrethrum palustre* esse putant. Ego verò aliam noui *ptarmicem montanam*, folijs ferè *plantaginis*, flore aureo, radiculis rufis, non sine odore, acribus, *Bäbe müſter wurtzen*.

*Pulegium saxatile* (regale puto quibusdā) *polycnemon* fortè, floret Iulio.

*Pulegium ceruinum*, floret Iulij fine *Monspelij*.

*Pulmonaria Plinij*, floret Mart. & April.

*Pulmonariæ Plinij species*, sine maculis foliorum, *elene waltwurtz*, floret April. Vide *Symphytum*.

*Pulmonaria Gallis* vulgò dicta, floret Maij fine, semen fert in Iulio.

*Pulmonaria muralis*, *Büchſpitz*, species syluestris *Lactucæ*, fortè *reseda Plinij*: nam similis eius vsus est hodie apud nos ad collectiones aut inflammationes sedandas, præsertim *Paronychias*, in quarum remedijs multi etiam incantationes adhibent, magis quàm ad vllas alias inflammationes, &c. floret Augusto.

Pyre-

Pyrethrum, in Aprili floret.

Pyretrum alpinum chamæmalo simile,  
(perenne) radicibus repens, floret Iulio in  
alpibus nostris.

## Q.

Quercus circa diem D. Georgij flores seu  
cachryes suas emittit.

Quercus quædam fructificant, circa diem  
D. Bartholomæi, aliæ tardius.

Quercus quædam glandes ferunt, quæ-  
dam etiam pilulas fungosas : in quibus ver-  
miculi conduntur : aliquando squamu-  
las rotundas, candidas, in sinistro foliorum  
latere, quas rustici flosculos vocant, indicati-  
copiosi prouentus glandium anno sequen-  
te: glandes Septemb. producit.

Quinquefolium, floret Iunio.

Quinquefolium minus in locis siccis, ra-  
dicibus suis repit, floret Aprili & Maio.

Quinquefolium palustre floribus puni-  
ceis, radicibus repens oblongis, floret me-  
dio Maij.

## R

Ranunculi genera hortēsia & syluestria, sar-  
doniū, aruenſe, echinatis seminib. Aquaticū  
flore plantaginis : & alterum minimū folijs



## DE COLLECTIONE

minimis, multifidis, vt in cottula. Item flammeus. Item maior albus nō hortensis, tantū puto apud nos: florent Maio.

Ranunculi species diuersæ, & quæ apium risus vocatur, florent Iunio.

Ranunculi genus primum, Martio floret & initio Aprilis, deinde disperit.

Ranunculi genus quartū Fuchsio, quod vulgò vocamus Martios flores, qui albi & purpurei sunt: & secundū Fuchsium etiā lutei, apparent Martio & Aprili.

Ranunculus fardonius, quem apium risus vocant, & alius quem aliqui flammulam, floret Aprili.

Ranunculus fardonius semen fert Maio.

Ranunculus hortensis, albus flore denso, florem ostendere incipit in fine Aprilis.

Ranunculi quidam (hortensis, flauus, dēsus) florent Iulio.

Ranunculi pratenses pauci, florent Oct. vt & hortensis, flore denso; paucus.

Ranunculus pratensis sine plumbo: cæteri enim præter aquaticos, pleriq; plumbum id est, maculas nigras habent, Causticus: florent Aprili.

Ranunculus pratensis, floret Septembri.

Ranunculus pratensis, hirsutus, floret Augusto.

Ranuncu-

Ranunculus albus in summo Braulio, monte Rhetorum, folijs simplicibus oblongis, angustis, &c. flor. Iul.

Ranunculus sylvestris, albus, fidertsche/ medio April. flor.

Ranunculus alpinus petreus, albus, ex monte Pilati mihi translatus, flor. Apr.

Ranunculus palustris, quem Dodonæus ouibus exitialem esse scribit, flor. Jun.

Ranunculus palustris am farzen sec/ floret Iulio.

Ranunculus chamæmeli folijs, rara herba & caustica, locis palustribus, flor. Apr.

Ranunculus, rarus, flor. Nouem.

Ranunculus hannen fuß/ plumbum habet: interea serpit, in olera recipitur, flores habet maiores, iuxta semitas crescit, Maio floret.

Ranunculus humilis, radice crassa digitali, causticus, rarus, flor. Apr.

Ranunculus parvus calyce inuerso, floret Maio.

Ranunculo cognata herba, quæ in olera admittitur, flor. Aug.

Raphanus æstate, floret Iul. & Octob.

Raphanus maior, flor. Maio.

Raphanus sylvestris rapistrum, siliquis acumn atis, acribus, flore albo, flor. Maio.

## DE COLLECTIONE

Rapistrum flore albo, vel sinapi agre-  
ste, flor. Iun.

Rapistrum flauis floribus, heiderich/ flo-  
ret Iul. August. & Octob.

Rapum, flor. Iun.

Rapum syluestre, flore

Calathi, cœruleo (Vuularias etiam vo-  
cant.

1 Maius, quod medium putant, &  
albo etiam flore inuenitur.

2 Minus, quod suis radicib. serpit.

3 *Oie rā ften rapünzle* / in quibus  
cœruleus color dilutior est.

4 Petræum, in muris.

5 Partense, flore in corymbos col-  
lecto.

6 Vnguium instar recuruatis in sum-  
mo floribus, in collibus & montib.

7 In spica quadam, in syluis, folia ma-  
culosa.

8 Non Maculoso.

Rapum syluestre, *rapünzle* / floret Iun.  
Iulio. Itemq; minus.

Rapi syluestris species parua in muris,  
campanulis cœruleis: primum & fermè vio-  
læ folijs minoribus, flor. Iul.

Rapi syluestris genus pratense, puniceo  
flore in corymbis, confercto, & syluaticum  
in mon-

In montibus cœruleo, floret Maio.

Rapum sylvestre petræū, augen Fraut/  
fleckent raht, flor. Aug. Vide Vuularia.

Rapum sylvestre, Rapünzle / duorum  
generum, commune quod procerissimum  
est: minus cui corymbi sunt in summo: me-  
dium folijs latiusculis, non longis vt primū,  
(sunt & sylvestria quædam genera.) Item  
minimum petræum in muris ciuitatis, flo-  
rent Iunij fine.

Rapunculi sylvestris genus floribus cœ-  
ruleis in se recuruis: Item die rächten Ra-  
pünzle / flor. Maio.

Rhamni genus Sandthorn / fronthorn /  
fructum fert Septem.

Rhaponticum spurium, flor. Iun.

Rhaponticum ignobile, collinū vel pra-  
tense folijs angustis, valde dissectis, flo. Aug.

Rhapontici genus degener, flore rubro,  
calyce squaroso, flor. Septem.

Raponticum minus & degener, calyce  
infra florem, protuberante squamis alter-  
nis viridibus & fuscis corticato, flor. Iul. Vi-  
de Centaurium.

Rhododaphne vera, in horto Massarij,  
flor. Iul. medio.

Rhododaphne, pumila, vel filius ante  
patrem maximus, flor. Iul.

## DE COLLECTIONE

Rododaphne minor vel herbacea *feure*  
*frant* / floret in fine Iunij aliàs in principio.

Ribes vulgò dictum, floret Martio, April,  
 li, Maio.

Ribes frutex vulgaris, cuius fructus, à  
 tempore, acinos D. Ioannis vocamus, Iunio  
 producitur.

Ribes sylvestre, aquaticum, sabinæ ferè  
 odore, flor. Apr.

Rosa Maij sine spina, floret April. me-  
 dio & fine.

Rosæ minoris fruticis, quæ à Maio de-  
 nominantur, *Alleyen rōsele*: circa Maij medi-  
 um florent in monte Alpjo propè Tigu-  
 rum copiosè proueniunt: inde in hortos  
 transferuntur.

Rosa vna & altera etiam Augusto, in ro-  
 seto meo nascebatur.

Rosæ, primum albæ, deinde purpureæ  
 vel incarnatæ, tertio rubræ, florent Iun.

Rosæ albæ & incarnatæ dictæ: & cynor-  
 hodon, flor. Maio.

Rosæ semina Septembri maturescunt &  
 Nouemb.

Ros solis, die 20. Iulij iam ferè deflo-  
 ruerat:

Rosmarinus, flor. Maio.

Rubia satiuâ in horto meo, floret Iu-  
 lij fi-

lij, fine, minima squinantia.

Rubię genus prauum, asperula puto, folijs per genicula inferius quaternis, superius binis, floribus albis, specie vt in Phu, floret Iun. & Iulio.

Rubia syluestris, flor. Iun. & Aug.

Rubia alia parua syluatica flosculis paucis violæ dilutæ colore, flor. Iul.

Rubea syluestris, waldmeyster / floret Augusto.

Rubea minor syluestris, flor. Maio.

Rubiæ syluestris species hepatica, herzfroyd / flor. medio & fine Maij, & Iun,

Rubea syluestris, floret Augusto, Sonchi genus vt videtur, floribus luteis, pastillicantibus, barbatis multis, calyce foliosa (vt & lactucæ syluestris genus quod in area creuit, & aster Fuchsi) folijs molliter aculeatis, flor. Augusto.

Rubia palustris parua, flor. Iul.

Rubus humilis, chamæbatus, floret Maio & Augusto.

Rubus maior, & minor siue chamæbatus sua mora maturant Aug.

Rubus maior Augusto, & Septembri fructus fert.

Rubus maior, & florem adhuc, & fructum Augusto mense producit.

## DE COLLECTIONE

*Rubus Idæus*, hindbeere/ Maio & Iulio  
flore.

*Rubus idæus* in montibus semen fert  
Augusto. Et quidam in monte Pilati sine vl-  
listiplois.

*Ruscus* in horto meo semel perpaucis  
flosculis Martio floruit, anno 1562. & rursus  
62. pluribus.

*Ruscus* floret medio & principio Apr.  
in horto, medijs è folijs flosculi radiati cum  
orbiculo puniceo in medio.

*Ruscus* florú rudimenta viridia, sed clau-  
sa Decemb. ostendit.

*Ruta* floret Iunio, Iulio, & Augusto: se-  
men fert Octob.

*Ruta capraria*, floret Maio: semen fert  
Augusto.

*Ruta*, rara, flor. Nouemb.

*Ruta pratensis*, cui flos capillaris, vt viti  
syluestri causticæ, flor. Maio.

*Ruta pratensis* circa finem Aprilis

## S

*Sabina*, flor. Apr.

*Sabina* fœmina rudimenta quædam ger-  
minum exiguum ceu flosculos subluteos  
in summis ramulis in Martio & Aprili o-  
stendit.

*Sabina*

Sabina medio & fine Maij floret exiguis flosculis quadripartitis.

Sabina baccas profert Septembri, & Octobri.

Sabina flosculis exilibus, quadrangulis, albicantibus, flor. Iunij principio.

Salices incipiunt florere Martio, & Aprilis mense, sed ante cæteras sylvestris latifolia.

Saliunca in horto meo è montibus Vallesiae allata mensis Septemb. 7. flosculos ostendere incipit.

Salvia, flor. Iul.

Salvia nobilis, floret Iunio: communis etiam incipit florere medio Iunij, Iulio.

Sambucus Maij medio floret & circa finem eius, Iunio etiam: baccas fert Sept.

Sambucus montana vel rubra, floret Aprilis.

Sambucus montana, Buchholzer/ acinis rubris, non in umbella, sed ~~horis~~ fert, in Iul. & Aug. maturescunt.

Sambucus aquatica Tragi, schwelcken/ in fine Maij floret, & eadem floribus densis hortensi cultu.

Sambucus aquatica flore denso sterilis: item in sepibus nascens, flor. Apr.

Sambucus aquatica Tragi; fructum Septembri facit,



# DE COLLECTIONE

Sampfucus, maiorana, flor. Iul.

Sanicula vulgò dicta, floret Maio & Iun.

Sanicula alpina, flor. Apr. & Iul.

Sanicula alpina, guttata, id est guttis sanguineis in flosculis albis, flor. Maio.

Saponaria vulgò dicta, quam Struthium aliqui malè nominant, floret in fine Iunij, Iul. & Aug.

Satureia, flor. Iul. semen fert Octob.

Satureia sed rara, flores simul & semina matura habet Octob.

Satyrium basilicum, quod palmam Christi vocant, (vti etiam Ricinum) mas, sine maculis foliorum floret Maio & Iunio.

Satyrium basilicum foemina, maculosa folijs, Maio flor.

Satyrium basilicum alpinum flor. principio Iulij: Ruffölbly an à colore fuliginoso? sicut & Brendle? Styracem olet calamitham.

Satyrium basilicum alpinum, Brendle à colore, ruffölbly, ab odore suauis puto, quo etiam rosas vincit. Rölbly verò à figura flores in capitulum quasi clauæ coacti, floret Augusto.

Satyrium genus exiguum, in apricis montibus, flor. Iun.

Satyrium genus quoddam exiguum, autumno

tumno appetente, floret in vliginosis campis, & pratis, Septembri nempe.

Satyrion trifolium Fuchſij, quod potius orchis ſpecies fuerit, floret Iunio.

Satyrionis genus quadrifolium, folijs anguſtis, floribus purpureis, paucis, odoratū, lactis quodam odore, vt genus quoddam meliloti, flor. Iun.

Satyrion Erythraicum Auguſtæ in horto Herwarti/ flor. Apr.

Saxifraga Fuchſij, floret Iunio, *Mauranten*, vere, & æſtate inuenitur, potiſſimū autem Iunio, hanc ego adiantum nigrum dixerim, ſed ea nunquam floret.

Saxifraga maior ſeu alba, cui radix multis granis orbiculatis compacta eſt, flor. Maio: Deinde ſtatim euanescit.

Saxifraga alba in fine Iun. flor.

Saxifraga granata flor. albis, flor. Ap. Semen verò habet in fine Auguſti, & Septem.

Saxifraga pinpinellæ ſimilis, vel hircina minor & maior. Item maior alpina, purpurea umbella in Pilati monte, flor. Iunio, Aug. & Nouemb.

Saxifraga hircina pimpinellæ ſimilis, maior & minor: & maior montana, floret in horto meo in Iul.

Saxifraga montana, radice alba, nodosa,

## DE COLLECTIONE

quam nulli alteri compares nisi *Saniculae albae* *Hesperum*, aut *ægolethri* radicibus initio: duplex est: alia folijs quinis, alia septenis, in vno coliculo, flor. Apr.

*Saxifraga alba* radicibus granulosis, floret Maio.

*Saxifraga montana* folijs quinis flore purpureo: alia septenis flore ex albo pallescente, floret ad finem Martij in horto meo.

*Saxifraga aurea* *Dodonei*, flor. Apr.

*Saxifraga aurea* *Dodonei* florebat Feb. cum tepidior ille esset.

*Saxifraga lutea*, umbella parua, floribus albis sui generis, radicibus luteis, flor. Iul.

*Saxifraga* semen fert Nouemb.

*Scabiosa*, (trium aut quatuor generum,) floret in fine Maij, Iunio, & Iulio. Paucæ florent Octob. & Nouemb.

*Scabiosa lævis*, flor. Octob.

*Scabiosa lævis* & *hirsuta minor*, floret Iulio.

*Scabiosa lævis* & *hirsuta minor*, insipida ferè & *hirsuta maior* in montibus florèt Augusto.

*Scabiosa maxima* incipit florere Iunij medio. Item communis *lævis* & *media aspera*, floret vt prima.

*Scabio.*

Scabiosæ

Hirsuta folijs

Semper integris, in collibus & montibus, humidioribus locis.

Diuisis, in der spitaler wysen alicubi.

Læuis, plenus est ager polij hac herba, flor. Iul. decimo simul omnes.

Scolymus, cinara, Artischoc / floret

Iulio.

Scordium, floret Iun.

Scordium in horto meo, floret Iulio, &

Augusto.

Scorpioides secundum aliquos herba palustris odore borraginis, flosculis cæruleis, &c. vergiß nit mein / floret Maio, Iunio, & Iulio.

Scorpioidi palustri cæruleæ cognata herba, sed floribus albis, nec ita in se retortis, floret Martio.

Scorpioides minus, in muris, Fleiner uer giß nit nun / flor. Apr.

Scorpioides Matthioli in horto meo, floret Iulio flosculis luteolis, binis, an semper?

Scrophularia maior, Brunwurtz / floret medio Maij. Vide Climenum.

Secale, Roct en / non (vt alij volunt) fili-go, flor. Iun.

## DE COLLECTIONE

Securidaca, flor. Iul.

Sedum, id est, semperuiua, & species eius vermicularis dicta, florent Iunio.

Sedum maius vulgare, flor. Iul.

Sedum minus (vulgare) album & purpureum, flor. Iul.

Sedum minus obtusioribus folijs, flor. Iunio.

Sedi genus tertium, illecebra, *Mauro pfeffer*, floret Maio.

Sedi montani genus, *fischzung* / floribus candidis, guttis sanguineis, vt fanicula alpina, flor. Maio.

Sedi vel Phylli montani genera quædam, vnum longè minimis foliolis in orbem circinatis candicantibus, flosculis albis. Et duo sedi minoris genera floribus crôceis, maculosis perpulchris, flor. Aug.

Sferra cauallo Italis, floret Iunij principio.

Senecio, *freitablium* / floret Martio, Aprili, Maio, Iun. Iul. Octo. Nou. & Decemb. initio: In vineis Febr. Semen facit Octob.

Serpillum, flor. Iul. Aug. Septemb.

Serpilli quædam gênera, odore inter se differentia: alia pilosa, albi ora, alia glabra, alia satui eiam odore refert quàm proximè & acrimonia ferè: quædam marginibus foliorum

rum punicañtibùs, florebat Iunij initio.

Serpillum acinarium, Moosbeere/acinis rubentibus, subacidis, astringentibus, floret Maio. Incipit autem eodem tempore in paucis à superioribus fructus se ostendere.

Sesamoides Anglor. flor. Maio.

Seselis genus in pratis palustribus, floret Aug.

Seseli montanum, semen fert Aug.

Sideritidis vel geranij species, herba Roperti, Iulio floret. Herba Iudaica. (Cognata ei quædam ex loco umbróso, vñ dem Gard/in horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ dilutioribus.)

Sideritis prima quæ & Tetrahit, in aruis, floribus albis, flor. Aug.

Sideritis prima Matthioli : lancea Christi, flor. Iul.

Sideritidis species, gratia Dei, flor. Maio, & Iunio, & Octob.

Sideritis prima, Vide Lancea Christi.

Sideritis, Blütwurtz/ floret Maij medio, & fine.

Silybus in montibus, äberwurtz/ floret Iulio, & Aug.

Sinapis duo genera Fuchsio, florent Iulio.

# DE COLLECTIONE

Sinapi sylvestre vel lapsana floribus luteis in arvis, flor. Iun.

Sinapium sylvestre quoddam luteis floribus, floret Maio.

Sisarum hortense, flor. Iul.

Sisarū sylvestre Fuchsj, wildpasteney/ floret Iulio.

Siser, girgelin/ semen facit Septemb. maturescunt Octob.

Sisymbrium capitulis purpureis & albis, flor. Aug.

Sium, cardamine, Brunnenfressich/ floret Augusto.

Smilax hortensis, id est phasiolus, floret Iulio.

Smyrnum vulgo Libisticum, flor. Iul.

Solanum, floret Iulio, Aug. & Septemb.

Solanum commune & lignosum semen habet Nouemb.

Solanum perpetuum vulgò dictum ali quibus, ie lenger te lieber/ cui flores cœrulei, acini rubri, fortè Malacocissus, floret Maio, Iunio, Iulio, & Augusto, semen facit Aug.

Solanum vesicarium, halicacabus, alkekengi, flor. Aug.

Solanum Indicum, floret medio & fine Iulij strychnodendron ad aquas stantes ferè.

Sola-

Solanum pomiferū, poma amoris vul-  
gò, flor. Aug. Iul. Iun.

Solanū syluaticum, baccæ vna cum flo-  
re, Aprili.

Solanum syluaticum tetraphyllum, non  
propagat sese in horto, flor. April. & princi-  
pio Maij frützele fraut.

Solanum somniferum vulgare, schlaff-  
beere/ flor. principio & medio Iulij.

Solani somniferi genus, flore purpu-  
rascente, cauo, instar calathi, vt hyoscyami fo-  
rè, floret Maio.

Solidago Saracenica heidnisch wunde-  
fraut/ flor. Aug. Virga aurea. Species eius a-  
lia maior neruo folij p uniceo, &c. in monto  
prope Sergans, flor. Aug.

Sonchus vterq;, Iunio, & Iulio floret, ci-  
cerbita, gens distel.

Sonchus agrestis marginibus foliorum  
aculeatis, Augusto mense semen & flores e-  
mittit, semen fert Octob.

Sonchi genus quoddam syluestre, pro-  
cerum, luteis floribus, subdulce, in horto  
meo, folijs non dissectis, angulosis, totum læ-  
ue est, id est sine aculeis, flor. Aug.

Sonchi species, terra crispa, lactuca syl-  
uestris Gal. flor. Iun.

Sonchi vel lactucę syluestres, flor. Nou.



## DE COLLECTIONE

Sonchi species lævis, floribus lactucæ paruis, luteis : herba est odore grauiore quā aliæ huius generis, frigidior scilicet, in muris nascitur, floret in fine Iunij, & Iulio.

Sonchi species, milchen/ flor. Iul.

Sonchus pinguis, caulibus & neruis rubicundis, floret & semen facit Octob.

Sorbus, fructum fert Septem.

Sorbus torminalis, quam Tragus pingit, fructum fert Octob.

Sorgi, welscher hirs. Panicum Indicū vocant Parisijs, Iulio, & Aug. floret.

Spatula foetida, quam aliqui veterum xyrin esse coniiciunt, flor. Aug.

Spica nardi herba vulgò dicta, flor. Iun.

Spina ceruina, flosculis viridibus circa nouos furculos cōferētīm erumpētibz, odoratis, odore fragorum ferē perquam suaui, flor. Maio.

Spinæ ceruinę acini leguntur, messis tēpore Iul. mense, ad cōroceū colorē: autumnō (initio Septem.) ad viridem: circa D. Martini diem, ad puniceum.

Sphondylium, floret Iunio, Aug. Vide Branca vrsina.

Spina alba vulgò quam eruditi oxycantham putant, floret initio Maij.

Spinæ albæ species Fuchsio, vulgò carduus

duus Mariæ, stecchifrut/floret Iunio & Iulio.

Spina alba Dioscoridis, cardui genus, semen habet Augusto.

Spina alba quorundam fructu echini marini specie rotunda, floret Iulio.

Spina solstitialis, &

Spina citrina, Argentinæ, in horto D. Didymi Obrechtii, floret principio Iulij.

Spina appendix, frutex spinosus, quem aliqui oxiacantham putant, vulgò spina alba dicitur, *ωϋβδοιν*, Augusto fructificat, Septemb. & Nouemb.

Spinachia olus, floret Iunio.

Stachys herba alba, hirsuta, odorata, marrubio congener, locis ficcis & asperis nascens, bicubitalis ferè, caule quadrato, subacris, nulla verò amaritudine, quam suæ Stachyi Galenus tribuit, marrubio congenerem esse figura odorq; ostendunt, *μηλίζει γὰρ πῶς τὸν ὄσων ὁμοίως τῇ πρασίῳ*, descriptio Dioscoridis planè cum hac herba facit. Habet non modò verticillos vt marrubium, sed stachyn quoq; id est spicam supra in qua flores partim albi, partim purpurei, figura ferè vt in vrticæ mortuæ floribus, minores, floret Iulio.

Stachys Fuchsi, *Riechender andorn*, floret Iun.

## DE COLLECTIONE

*Staphisagria*, floret Iulio.

*Stichas*, floret Iunio.

*Stichas citrina*, quam aliqui *stichadem* veterum, alij *ageraton* esse putant, *Reinblümen*, floret Iulio.

*Stramonia*, folio oleracio, grauis odoris, vt venenatz herbæ frigidæ. Flos conuoluu li, maior candidus: suaui odore nescio quali, medicato, alijs nux methel dicitur: Augustæ etiam albo flore reperiri audio, floret Aug.

*Symphytum maius* April. floret: semen Augusto fert.

*Symphytum alterum*, floret Maio, Iunio, Iulio, *walwurtz*.

*Symphytum alterum minus* flore cœruleo purpurascente, *Blauwer augentrost*. V. *Pulmonaria*, floret April.

## T

*Tamarix myrica*, floret in vere, Iun. pappos verò suos fundit, in quibus nimirum semen continetur, Septemb.

*Tanacetum*, floret Iulio & August. semen fert August.

*Tanacetum fatuum*, floret in fine Iunij.

*Tanacetum minus* dixerim, quòd Basileæ circa *Birsam* nascitur, locis arenosis, odore &

& sapore tanacetum referens, imbecillius tantum: umbellis ad millefolium accedit. Ramosa est herba, multis ab una radice caulis, cubitalis ferè, folia quoq; nonnihil ad tanaceti folia accedunt, minora. Flores sunt minuti albicantes, radix lignosa, fibrosa. Meminit eius Tragus in millefolio & tanaceto, ambigit inter utrumque, floret Iunij initio.

Tarchon, floret Iulio.

Tarchon sylvestre serratis folijs, floret Iulij medio.

Taxus floret Martio: Acinos rubros umbilicatos fert Sept.

Telephium, id est, crassula maior seu faba inuersa, ut quidam interpretantur. Sed mihi diligenter conferenti Telephium Dioscor. (quod caput in veterib. exemplaribus non legitur) eadè planè herba cum tertio sedi genero (Maurpsäffer) illecebra siue portulaca sylvestri (quod nomen utriq; tribuitur) esse videtur. Cæterum faba inuersa fortè fuerit epipetron Aristotelis, quod lib. 4. cap. 5. de partibus animal. etiam absolutum à terra, & suspensum diu viuere scripsit, & Hippocrates in lib. de vlceribus, ubi Cornarius non rectè ligustrum transtulit. Hippocratis locum citat Galenus lib. 4. Methodi, epipetro siccandi vim tribuens, ut doctissimus medicus

Michael Alysius nos admonuit. Eadem & Anacampseros Plutarchi in libro de facie apparente in orbe Lunari mihi videtur, quã ait euulsam etiam virere & germinare adhuc: id quod facit ferè cacumine reflexo, nimirum quia paulatim siccatur, & ceu spasmo conuellitur, vt inde veluti amoris etiam redeuntis seq; reflectentis vim quandam habere superstitiosè existimata sit. Aniculæ nostræ talem vim vocant *æderthou*, vt in Adianto Apuleij. Hoc est quod Plinius dicit, vi anacampserotis herbæ amores vel cum odio depositos redire. Varinus quoq; meminit, apud Plutarchum non rectè anacampseros legitur. Nec aliud apud veteres reperio.

Thaliætrum, Aprili floret.

Thlaspi quod Matthiolus pingit, bursæ pastoris dictæ planè similis herba, vt pro ea fallere legentem possit, adeò floribus, folijs, fructu & magnitudine totaq; specie illam representat, sed gustu acris: floret Iunio. Aliud est thlaspi Syluij, quod alliũ redolet. Thlaspeos folia non sunt incisa, vt bursæ pastoris adultæ.

Thlaspi Lucæ Gyni, amarum, floret Iulio in horto meo, Augusto & Octobri.

Thlaspi verum Tragi in aruis nascens, folijs cauli adhærentibus, vt in sesamo, vnicaul  
le, &

le, & alterum multicaule in hortulo nostro, floret Maio.

Thlaspi allium redolens vnicaule, idem fortè Tragi, Maio floret.

Thymelææ genus illud (Zylānd) & Februario & Martio floret, nisi nix impediat.

Thymelææ generis quod nostri Zylānd vocant, baccæ Septemb. rubent, cum florem Februario ædat, vt nulli fortassis fructus à flore tardius perficiatur.

Thymelæa, vide Daphnoides.

Thymus, huic flos etiam pro semine est, Maio & Iunio floret.

Tilia urbana, circa diem D. Urbani ( qui est Maij 25. ) floret, syluestris tardius quàm sativa.

Tilia urbana: nam syluestris sterilis est, Augusto fert semen.

Tithymalli quidam, vt helioscopius, & myrsinites, floret Februario.

Tithymallus myrtites, principio Aprilis floret.

Tithymallus folijs myrti serè subhirsutis, vnicaulis in aruis, alibi multicaulis, floret Maio.

Tithymalli species myrti folio, floret Iun.

Tithymalli genus paruum in cultis nascens, quibusdam peplus videtur, floret No-  
uemb.

## DE COLLECTIONE

*Tithymallus minimus* flores & semina ostendit Augusto.

*Tithymallus heliotropius*, floret Octob.

*Tithymalli heliotropij* semina in medio Nouemb. nondum matura reperi.

*Tithymallus Helioscopius*, floret principio Decemb.

*Tithymallus Paralius albicans*, in horto meo, floret Iun.

*Tomentum* (vulgaris herba) floret in horto meo Iul. medio.

*Tormentilla*, heptaphyllum serò apparere incipit, & cùm iam vites florent, Iunio floret.

*Tormentilla*, floret Iul. Aug. semen fert Augusto.

*Tormentilla*, vide *Heptaphyllum*.

*Tribulus terrestris* in hortis satus, floret Iun. & August.

*Trichomanes*, carpitur estate, & autumnii initio.

*Trifolij pratensis* tria genera, florent Iun. Maio, Octob. & Nouemb.

*Trifolium pratense album*, floret Iun. August. Sept.

*Trifolium pratense purpureum*, floret Iunio & Aug.

*Trifolium steinfleec* (sapore medicæ) luteis  
Tri-

floribus, nullo odore, flor. Iul.

Trifolium odoratum Fuchfij, quod Matthæolus ineptè cytisum facit, omninò est Lotus, siue fatiua, siue potius sylvestris: vide supra, Lotus, floret Iun.

Trifolij species alta, inodora, florum corymbis flauis, circa aggeres & dumeta, nitroso sapore, folijs in summo tantùm incisis, floret Iunio.

Eiusdem puto species alia in horto meo sata, est Medica, flore violaceo, floret Iun.

Trifolium asphaltites, floret Iunio & Augusto.

Trifolium asphaltites verum. Primo quo nascitur anno, floret Iul.

Trifolium acre maculis foliorum, & ipsum albis, aliquando nullis puto, in collibus siccis & aruis aliquando, floret Iun.

Trifolij genus calidius & tenuiorum partium flore purpureo, rariore (folijs minus latis nec maculosis) aliquando per ambitum purpurascens, acris in gustu, calidis in tertio gradu, nascitur in collibus, itemque aruis, floret in fine Iunij.

Aliud genus in area mea (Medica est) floret Iunij fine, folijs mucronatis parum, post medium ferratis, flosculis purpurascens, sapore nitroso.



## DE COLLECTIONE

Trifolij species floribus purpureis ad cœruleum inclinantibus per corymbos quinis aut senis, aliquando nouenis aut pluribus inodora, folia leuiter post medium serrata, Medica est, floret Iunio.

Trinitas, Das guldinlârerkraut/alba, cœrulea, maior & minor, floret Februario.

Trinitatis (vt Itali vocant, nostri Hepaticam auream) flo. rudimenta, cœruleo colore proximè terram se ostendunt Decemb.

Triticum, floret Iunio.

Triticum vaccinum, Brand/fûweizen, à Trago descriptum, inutile medicinæ, vitium tritici, floret Iulio.

Tusfilago, Martio floret & etiam Feb. & Aprili.

Typha, fûospen, floret Iulio, herba nascēs in locis palustribus, gladioli aquatici folijs. Vocant autem locum palustrem Græci τίφος per iota, & sic typha etiam herba scribi deberet, nisi fortè differentię gratia à typha tritici genere per y scriberetur.

## V

Valerianæ diuersæ, vna plantaginis folio, odoratissima, floret in Alpibus nostris, Iul.

Valeriana minima, semina fert in fine  
Maij

Maij cauliculis pedalis cauis.

Valeriana, vide Phu.

Verbascum, floret in fine Innij, Iulio & Augusto: Germanis wulfrant.

Verbascum murale, in muris ciuitatis nostræ flores lutei in pappos soluuntur, vt in Conyzis in corymbis, floret Aug.

Verbasci genus apicibus purpureis, floret Aug.

Verbasco similis herba in muris nascens, flore luteo, &c. in nullo vsu, floret Sept.

Verbenaca supina, vt ego nomino, consolidam quibusdam dicta, flore cœruleo, Blauw oder guldin gunfel, floret Maio & Aprili.

Verbena, floret Augusto & Sept. semen fert Octob.

Verbena fœmina seu supina Fuchsiij circa canis ortum floret, & colligi debet. Item verbenæ recta & mas floribus luteis, sed aliquando citius. Sed posterior erysimi herbæ potius, aut sinapis similitudinæ (nasturtij, erucæ) genus syluestre fuerit: nā cum verbenâ nihil commune habet.

Verbena lutea Fuchsiij, floret Aug. & Sep.

Verbena altera Fuchsiij, floret Iun.

Verbena alba in locis vmbrosis, flor. Iul.

Verbena quædam rarior (è prouincia)

## DE COLLECTIONE

pulchrior & maioribus floribus, si benè me-  
mini, floret Iul,

Veronica, Erenbryß, floret Iunio.

Vetonica, floret Maio.

Vetonica, vide Betonica.

Viburnum: vide vitis sylvestris, floret Au-  
gusto.

Vicia, floret Iunio.

Vicia minor, vogel wick, filique subrubre  
antequam maturescant, floret Maio. Tüben  
wick. Vicia maior, ist schier wie erbe, eodem  
floret.

Viciæ genus floribus flavis, vide Aphace.  
Viciæ quædam species (an Aphaca) angu-  
stioribus, longioribus folijs, locis humidis,  
floribus è cæruleis ferè, ad ripam lacus, flo-  
ret Iunio.

Alia flore luteo, folijs binis: an orobus syl-  
vestris? floret Iunio.

Viciæ sylvestres, florent Iun.

Vicia quædam sylvestris (circa sepes & a-  
libi) floribus cæruleis, floret Iul.

Vicia montana, folijs latioribus, floribus  
subcæruleis, radice nigra. Vicia floribus ru-  
bicundis: Vicia sylvestris flore purpureo,  
florent Maio.

Vincetoxicum, vide Asclepias.

Violæ Martiæ purpureæ seu nigræ odo-  
ratæ

ratæ & inodoræ: item albæ, quæ nigris præueniunt, florent. Mart.

*Viola purpurea* vel *Martia*, Iunio semen fert.

*Violæ nigræ syluestres*, florent Aug.

*Viola matronalis* Fuchſij, alba, purpurea, punicea, quam aliqui bacharin eſſe putant. Fuchſius hoc nomen ad imitationem vocis Germanicæ, *ſchäpfen veiol*, effinxit, nos quòd circa pentecoſtem florere incipiant, vocamus *pſingſtânâgels*, floret medio Maij, Iulio & Auguſt.

*Viola trinitatis* vel *septicolor*, *heptachr<sup>9</sup>*, floret April. Maio, Iunio, Octob. Nouemb. Decemb.

*Violæ purpureæ odoratæ*, *inodoratæ* & *septicolores dictæ*, florent April.

*Violæ inodoræ* genus, quam vulgò *Trinitatis* appellant, à triplici colore florû, aliqui iaceâ, Iul. mense & flores & semina edit. Itali *Trinitatem* vocant *hepaticam terrestrem*.

*Violæ inodoræ*, quas nostri vocant *septicolores*, Iulio mense florent & semina proferunt.

*Viola inodorata*, quam *septicolorem* dicimus, floret Sept.

*Viola multicolor inodora*, floret Maio.

*Viola quædâ anonymos inodora est*, è vio

## DE COLLECTIONE

laceo purpurea, inter fruges (Auicularia Syl  
uij) floret Iunio.

Violæ genus inodorum, in aruis, albicâs:  
in hortis purpureum & maius colunt, floret  
Augusto.

Viola flammea, ut quidam vocat, Caryo-  
philli Indici vel Portugallici, floret Sept.

Viola dasypus, vide paulo ante in Clema-  
tide.

Viola alpina, folijs asari minoribus: floscu-  
lo cœruleo, campanulæ instar conglobato,  
sed minutatim dissecto, floret Maio.

Virga aurea, solidago Saracenica, floret  
Iulio.

Virga aurea, vide Solidago.

Virga sanguinea Plinij (quam aliqui cor-  
num fœminam putant) Itali sanguanum vo-  
cant, hartrygel, floret Maio & Iunio: semen  
fert Septemb.

Viscum, veris initio floret.

Viscum baccas fundit Septemb. & Octo.

Vitis sativa floret Maio & Iunio, & quæ-  
dam Iulio: locis verò calidioribus fructum  
profert Iulio & Augusto, & Septembri.

Vitis alba & nigra, floret Maio.

Vitis Idæa, heidelbere, ut ego ex Theo-  
phraستي descriptione interpretor, floret Ma-  
io: acinos suos cum cerasis maturat mense

Iunio

Iunio & Iulio. Itemq; moosbery, vitis Idæa maior Suevis sic dicta.

Vitis Idæa duplex in alpibus nigra & rubra, cuius acini acidiores sunt, sine umbilico, maturescunt Augusto.

Vitis sylvestris caustica, nielen, quam & viburnum aliqui vocant, ab usu viendi. Galli viornam vulgò. Fuchsius non rectè vitem nigram facit; Iulio & Augusto florent: semē profert Augusto, Octob. & Nouemb.

Vlmus ante folia florem Martio producit, qui & fructus eius est.

Vlmaria, in fine Iunij floret: semen fert Septembri.

Vlmaria, vide Barba caprina.

Vnifolium palustre, läberblümly alicubi, semen Iulio fert.

Vrticæ, florent Iunio & Augusto.

Vrtica mortua flore purpureo, Martio floret.

Vrtica mortua, Binsaug, floret Aprili, & Augusto.

Vrtica mortua, floret Octob.

Vrtica mortua, Galliopsis, floret Decem. principio, & semen facit Augusto.

Vrtica mortua, Lamium, floret Maio.

Vrtica mortua, & cognata ei quædam in ripa lacus nostri, conceptaculis floram spi-

## DE COLLECTIONE

noſis. Vim habet diſcutiendi, floret Iul.

Vua criſpa, Fruſelbeere, floret Mart. April. Maio.

Vua criſpa, Galli groſſularium vocant, unde Germanica vox corrupta videtur, nimirum quod acini eius craſſi quodammodo, hoc eſt, pleni, & ſolidiusculi ſint, matureſcūt Iunio: Fructui præpilantur reliquæ floris, etiam maturo.

Vua quercina circa radices quercuum, ſub terra vere inuenitur, vt Chriſtophorus Encelius obſeruauit.

Vulneraria quædam corymbis florum luteis, dulcibus, glauis quibuſdam, non rectè. Flores ſunt penè wie gâle rubenfrôpſic/haſenſſee, floret Maio.

Vuularia ſiue campanula vulgaris, halsfraut, alia quàm laurus Alexandrina, quam aliqui vuulariam vocant, floret Iulio.

Vuularia maior, flore intus piloſo, ex cœruleo purpureſcēte. Campanula, halsfraut, floret Aug.

Vuularia minima, Blauwer argentroſt: cuius flos calathi vel campanulæ inſtar, cœrulei coloris eſt, herba lacteſcit, naſcitur in muris & locis ſaxoſis, floret Aug.

Vuularia pratensis, Beune gloggenblumen, vide Rapum ſylueſtre, floret Maio.

Vuula-

Vuularia illa quæ flores cœruleos habet, qui prodeunt è singulis per caulem folijs alternatim positis, multos verò & conferctos in summi caulis corymbo, floret Iun. Hæc puto humilior & pratenfis est. Item altera maior, in horto meo, durat annos aliquot, radicibus puto se propagat, floret itidem Iunio.

Vuularia, vide Rapum syluestre petræū.

## X

Xanthium, Lappa minor, Flein Fletten, semen habet Sept. & Octob.

Xiphion siue gladiolus, floret Iun.

Xiphium radice simplici Curio missum, floret Iulio.

## Z

Zea, spelta, Zinzon, floret Iunio.



# TABVLA SE.

CVNDA STIRPIVM NOMINA

LATINA ET GERMANICA

continens, quæ singulis mensibus  
aut florent aut fructum  
maturant,

IANVARIO FLORENT.



*I*frigidior sit, vt solet apud nos, nullæ  
florent stirpes, nisi paucae forsan in  
cellis aut hypogeis inclusæ: Sin tepi-  
dior, circa finem eius aut florent, aut  
florere incipiunt, cædem quæ Februario Circa  
medium huius mensis, locis præsertim apricis,  
floret

*Arthritica*, cui flores singuli in singulis petio-  
lis: hæc tepida ferè hycme tota floret, & inde vsq;  
ad aprillem, Schlüsselblümle.

*Chelidonium minus*, Flein schellfrant.

FEBRVARIO MAXIME CIRCA  
finem, & locis calidioribus, florent.

*Alsine*, hennerdarm, albis flosculis.

*Alsine cæruleis* flosculis.

*Arthritica*, de qua in Ianuario:

*Arthri=*

*Arthritica communis* syl.]

*Asarum*, haselwurtz.

*Bellis*, Mäulenblümen.

*Buxus*, Buchsbaum.

*Chelidonium minus*, Klein schellwurtz.

*Codiaminum*.

*Cornus interdum*, thierlinbaum.

*Coryli*, haselstand.

*Consiligo*, leißfraut.

*Crocus montanus*.

*Elleborus niger*, Christwurtz.

*Erica montana*.

*Fragaria sterilis*.

*Fumaria*, erdranch.

*Leucoium bulbosum*, weiß Hornung Blümen.

*Myagrus*.

*Petasites*.

*Saxifraga aurea*, guldin steinbrech.

*Senecio*.

*Tithymallus Helioscopius*.

*Tithymallus myrsinites*.

*Trinitas*, guldin läber fraut.

*Tussilago*, Roßhub/Brandlattich.

*Zyland*.

# MARTIO FLORENT.

*Alfine duæ species*, hânendarin.

*Anemone species*, Anemon rößlin.

*Aristolochia phragmites*.

*Arthritica species*.

# M A R T I V S.

*Arum*, teut scher pfäffer.

*Azarum*, Haselwurtz.

*Bellis minor*, Müllenblümlin Flein.

*Betonica Pauli Turnero*.

*Bulbus sylvestris*. Ackerzwibel.

*Bulbina minor & maior*.

*Bursa pastoris*, Teschelkraut.

*Caltha palustris*, Moßblümen.

*Clematis peruinca*, Blauw vnd Braun syn-  
grün/yngrün.

*Consiligo*, Leüßkraut.

*Cornus*, Thierlinbaum.

*Corylus*. Haselstaud.

*Crocus montanus*.

*Erica montana*.

*Fragaria minor sterilis*.

*Gramen duriusculum*, Riedtgras.

*Hedera terrestris*, Gündelrüb.

*Helleborus vterq;*, weiß vnd schwarz Nieß-  
wurtz.

*Herba trinitatis cœrulea*, Dencckenblümlin/  
oder Dreyfaltigkeit Blümlin.

*Hepatica terrestris vel aurea*, Guldiläbers-  
kraut.

*Hieracium quoddam*.

*Hyacinthi genera quatuor*, Hyacinthen.

*Leucoion*, Keiri, Geldnegeli.

*Leucoion bulbosum Theoph*.

*Mercurialis syluatica*.

*Penthaphyllon minus*, Flein stünffinger Frut.

*Persicus*

*Persicus armeniaca*, Berillen.

*Petasites*, Pestilenzwurtz.

*Populus*, Sarbachbaum.

*Prunus sylvestris*, Schlehdorn.

*Pulmonaria*, Lungenkraut.

*Ranunculi genus primum*, Ranenfuss/ Moß

blumen. *Ranunculi genus quartum*.

*Ribes*, S. Johans treibdel.

*Ruscus*, Meißdorn.

*Sabina foemina*, Senybaum.

*Saxifraga aquatica*.

*Saxifraga montana*.

*Salices*, Wydenbaum.

*Senecio*, Creutzkraut.

*Taxus*, Iberbaum.

*Thymelæa genus*, Syland.

*Thussilago*, Kossbüß.

*Viola martia diversæ*, Violen.

*Ulmus*, Ulmerbaum.

*Urtica mortua purpureo flore*.

*Vua crispa*, Krußelbeer.

## APRILI FLORENT.

*Aegolethras*, Bößblüm.

*Allium ursinum*, Waldknoblauch.

*Alliaria*, Knoblauchkraut.

*Alnus*, Erlenbaum.

*Amomum falsum*.

*Amygdalus*, Mandelbaum.

*Antirrhinum*, flore cœruleo. Vian.

# A P R I L I S

- Apij* genus palustre.  
*Aquilegia*, agleyen.  
*Aristolochia phragmites*.  
*Arthritica odorata*, schlüsselblumen.  
*Arthritica alpina lutea*.  
*Arthritica pallida*.  
*Asarum*, haselwurtz.  
*Asphodelus marinus*, ein geschlecht der gold  
wurtz.  
*Bellis urbana & sylvestris*, Müllen blümle.  
*Borrage*, Guretsch.  
*Bryonia*, hundtsfürbe.  
*Bulbine*, Glaw meyen rößlin.  
*Betonica Aegineta*.  
*Betula*, Bircken baum.  
*Castanea*, Festenen baum.  
*Chamæmalum*, Chamomillen.  
*Calathiana verna*, Brendel blümli.  
*Caryophyllata aquatica*.  
*Cerasus omnis*, Firsy baum.  
*Chameleuce Ruellij*.  
*Chelidonium minus*, Klein schell Fraut.  
*Clematis Aegyptia*, Peruinca, Ingrün.  
*Consiligo*, LeüßFraut.  
*Crucis flores*.  
*Consolida quædam*, gurselen/Bugla.  
*Cruciata folijs in geniculis quaternis*.  
*Cyanus montanus*.  
*Cynocrambe Fuchsi*, id est, *Mercurialis syl-*  
*uestris*.

Christo-

Christophoriana.

Chamaebuxus.

Caros, Kümch.

Cerisfolium, Rößblykraut.

Calceoli diuæ Mariæ.

Caltha palustris.

Daphnoides Fuchsj, Zyland.

Daucus quidam sylvestris.

Elleborus agyrtarum.

Elleborus uterq;, weiß vnd schwarz Nieß-  
wurz.

Esula, pityusa.

Esula dulcis.

Fagus suis iulis.

Fragaria, Erdberkraut.

Fungorum genera, Pfifferling.

Geranium primum, Storchenschnabel.

Geranium maius, vel montanum.

Gnaphalij genus, Mattenflachs.

Gramen vulnerarium.

Hedera terrestris, Gündelrâb.

Hieracium minus, dens leonis.

Heliotropio congener, Vergiß mein nüt.

Hepatica terrestris, trinitas, guldty leberkraut

Iris, Blaw gilgen.

Lapathum hortense, magnum, groß Lend-  
wurz.

Lapathi vel acetose species.

Leucoion bulbosum.

Leucoion luteum, Geiß negeli.

# A P R I L I S.

- Lugustraria.*  
*Lilium conuallium*, Meyenryßli.  
*Lilium Marie*, vnser frauen gilgen.  
*Lithospermon*, Meerhirs.  
*Lunaria Græca.*  
*Lunaria lutea*, alyssos quorundam.  
*Mespilus*, Nespelbaum.  
*Myrrhis*, Wilder Forßel.  
*Narcissus quorundam*, quibusdam *lilium diuæ virginis.*  
*Nasturtium pratense*, Wyssen Kressich.  
*Nasturtiolum petræum.*  
*Nux iuglans*, Nußbaum.  
*Ocimoides purpureum.*  
*Ornithogalum*, Erdnuß.  
*Oxys*, Saurenflee.  
*Pœonia mas*, Pconien rosen.  
*Pentaphyllum minus.*  
*Persicus cuiuscunq; generis*, allerley pfer sich  
 bûum.  
*Petasites*, pestilenzwurtz.  
*Phu minimû syluestre*, Baldrian gschlechter.  
*Phu paruum saxatile.*  
*Pimpinella*, Bibinell.  
*Polygonaton*, Weißwurtz.  
*Populus nigra*, schwarz Sarbachbaum.  
*Prunus*, Riechen ald pflaumenbûum.  
*Prunus sylvestris*, Schlehendorn.  
*Pseudamomum.*  
*Pulmonaria Plin. species*, Kleinwalwurtz.  
*Pyretrum,*

Pyretrum, Bertram.

Pyrus, Byrbaum.

Quercus, Eichbaum.

Quinq;folium minus.

Ranunculi genus, quod flores Martij appellant,

Wosblumen, ranenstüß.

Ranunculus alpinus, petraeus.

Ranunculus hortensis.

Ranunculus sylvestris albus, Fidertsche.

Ranunculus Sardonicus.

Ranunculus quem flammulam dicunt.

Ranunculus chamæmali folijs.

Ranunculus humilis.

Ranunculus pratensis.

Ribes vulgò dictum, Sant Johans tretti-  
bel.

Ribes sylvestre, aquaticum.

Rosa Maij sine spinis, Aleyenrößlin.

Ruta pratensis, thaliëtrum.

Ruscus.

Salices, Wydboum.

Sambucus montana vel rubra, Holder-  
boum.

Sambucus aquatica.

Sanicula alpina.

Satyrion erythraicum.

Saxifraga aurea Dodonei, Steinbrech.

Saxifraga granata.

Saxifraga montana.



## A P R I L I S.

*Senecion*, Creütz Kraut.  
*Solanum syluaticum*.  
*Symphytum maius*, Schmärwurz.  
*Symphytum alterum minus*.  
*Tithymallus myrtites*.  
*Thymelæa*.  
*Tuſſilago*, Roßhüb.  
*Valeriana*, Baldrian.  
*Verbenaca ſupina*.  
*Vetonica*, Graß blümen.  
*Viola heptachrus*, *matronalis*, Winteruiolē.  
*Viola purpureæ odoratæ*.  
*Vitis nigra* & *alba* puto.  
*Viſcum*, Miſtel.  
*Vrtica mortua*, Taubneſſen.  
*Vua criſpa*, Krüſelbeer.  
*Vua quercina*.

## S E M I N A   P R O F E R V N T & fructum.

*Aristolochia phragmites*.  
*Cyclaminum*, Seiw brot.  
*Hepatica terreſtris*.  
*Mieß Beere*.

## M A I O   F L O R E N T.

*Abietes*, Dannen.  
*Absinthij ſpecies*, Wurmſet.

*Acer*

*Acer maius*, Uhorn.

*Acorus falsus*.

*Alismatis species*, Archus Fuchſ.

*Alliaria*, Knoblauchkraut.

*Allium alpinum*.

*Allium ursinum*, Waldknoblauch.

*Alfina species*.

*Alysson Plinij*.

*Alysson Ruellij*.

*Anagallis aquatica*, Wafferpungen.

*Angelica inodora*, Angelicken.

*Angelica odorata*.

*Antirrhinum*, Vrant.

*Aparine*, Klebkraut.

*Aphace Fuchſij*.

*Apij aquatici genus*.

*Aquilegia genera omnia*, allerley agleyen.

*Asclepias*, Schwalbenwurtz.

*Asparagus*, Spargen.

*Argemone*, Genserich.

*Aristolochia clematis*, gſchlecht der Oſter-  
lucey.

*Argentaria alpina*.

*Barba caprina*.

*Barba senis*. Habermarck.

*S. Barbaræ herba*.

*Barba hirci*, Bocksbart.

*Bellis maior*, Mullenblümlin.

*Betonica*, Battonicken.

*Betonica Aeginetæ*, Turnero.

# M A I V S.

*Betonica species minor*, Frießnägell.

*Bistorta maior*, Waterwurtz.

*Borrago*, Buretsch.

*Brassica*, Kabis/Edelkraut.

*Bryonia, vitis alba*, Hundskürbs.

*buglossus Italica*.

*Cacalia lutea*.

*Calceoli D. Mariae*.

*Caros albus & purpureus*, Wyßkümich.

*Caryophyllata urbana* & sylvest. Benedicke  
wurtz.

*Caucalidis species, caro similis*.

*Cerifolium, charephyllon*, Rô:blykraut.

*Chamaecyparissus*, Cypress.

*Chamaedry similis*, Schaffkraut.

*Chamaepithys*, Je lenger je lieber.

*Chamaesyce*.

*Chamaesyce flore unico, paruo*.

*Chelidonium maius*, Großschelkraut.

*Chalidonium alpinum*.

*Cheiri*, Hälbe negeli.

*Chondrilla*.

*Christophoriana, costus niger*.

*Chrysanthemon Fuchf.* Hancenfüß.

*Cicuta*, Scharling.

*Cicutaria minor*.

*Clematis purpurea*.

*Colytea Fuchf.*

*Consiligo*, Leißkraut.

*Convolvulus arvensis*, gschlecht der windē.

Cona

- Convolvulus separius.*  
*Conyza alpina.*  
*Cornus foemina*, Thierlin boum.  
*Cotula foetida*, Hundsdill.  
*Cruciata rubrae congener*, Gulde waldmeyer.  
*Cucumis erraticus.* (ster.  
*Cyanus*, Kornblumen.  
*Cyanus montanus.*  
*Cynoglossa*, flore puniceo, gschlecht der hunds  
*Cynorrhodon.* (Zungen,  
*Daucus Tragi.*  
*Dictamnus vulgo dicta.*  
*Digitalis Fuchf.* Si. gerhüt.  
*Doronicum vulgo dictum.*  
*Eruca hortensis*, Pfeffer senff.  
*Eruca sylvestris Fuchf.*  
*Eruca sylvestris nostra.*  
*Eruca sylvestris foetida.*  
*Eryngium*, Raddistel/manstreu.  
*Erysimum*, Hederich.  
*Esula.*  
*Esula scabiosa non floret.*  
*Flos louis.*  
*Fraga, alba, rubra*, Erdbeere.  
*Fraxinus aucuparia.*  
*Fraxinella.*  
*Fungorum genus praecipuum*, Pifferling.  
*Genista maior*, groß pfrimen.  
*Genistella*, klein pfrimen.  
*Geranium*, Blutwurz.

- Geranii genus secundum*, Storchenschnabel.  
*Geranium montanum*.  
*Gladiolus aquaticus*.  
*Graminis genera diuersa*, allerley gras.  
*Gramen fuchſij*.  
*Gramen collinum*.  
*Gerontopogon*.  
*Geum*, Benediktenkraut.  
*Gratiola*  
*Hedera terreſtris*, Gündelreb.  
*Heliotropium flore albo*, Krebskraut.  
*Hieracium*, Habichtkraut.  
*Hyoscyamus vulgaris*, Bilsamkraut.  
*Iberis*, Gauchblüm.  
*Illecebra*, Maupfeffer.  
*Iris*, Blaugilgen.  
*Iris minor ſylueſtris*.  
*Iſatis ſylueſtris*, Wilderweyd.  
*Iuniperus*, Weckholttterſtaud.  
*Lampsana*, Wildſenffkraut.  
*Lantana frutex italarum*.  
*Lapathi genera 4.* Lendywurtzen/grind-  
wurtzen gſchlechter.  
*Lathyris*, Springkorn.  
*Lens paluſtris*, Meerlinſe.  
*Leucoion*, Keiri, Gelb negeli.  
*Leucium puniceum*.  
*Leucium roſeum*.  
*Leucium album*.  
*Ligustrum*, Beinhülzen.

*Lilium*

- Liliū conuallium, Meyenrößlin.  
 Liliū genus, quod pro Asphodelo vsurpatur.  
 Liliū rubrum, Rottgiltgen.  
 Liliū aquaticum.  
 Lingua herba, Mäterzung.  
 Limonium nostrum.  
 Lithospermon, Meerbirß.  
 Lithospermon minus.  
     Vnicaule  
     Multicaule.  
 Locusta, Müßlefrant.  
 Lunaria Græca, Monatsfrant.  
 Lunaria, Glüblumen/gäl.  
 Lunaria montana,  
 Lunaria lutea.  
 Lupinus, Feigbaum.  
 Malorum genera, Villerley öpfelbüm.  
 Malua syluestris, Wildpapelen.  
 Medica cœrulea.  
 Meliloti syluestris species, Wilderstein flec.  
 Meliloti inodori species.  
 Melissa Fuchsj.  
 Melampyrum, Rüweysen.  
 Mercurialis, Scheißfrant.  
 Mercurialis syluatica.  
 Millefolium aquaticum.  
 Moschatella Cordi.  
 Myargus, Flachsdotter.  
 Myrrhis, cicutaria, Wilderßößel.  
 Narcissus, Narcisen blümlin.

Nasturtium, Kressich.

Nasturtium palustre, Binnenkressich.

Nigella, Schwaartzkümich.

Nummularia, Pfennigkraut.

Nux vesicaria, Dimpertüßle.

Nymphaea utraq;, Seebiumen.

Ocimoides rub. alpinum.

Ocimoides album.

Olusatrum.

Orchis genus bifolium, geschlecht des Fna-  
benkrauts.

Orchis herbae genera quaedam.

Orchis genus rarum,

Orminum sylvestre, Wilderscharlach.

Orobanche nostra.

Oxalis, Sauampferen.

Oxyacantha, Eibfelen.

Oxys, aleluia, Sauwölze.

Paeonia, Paeonien.

Papaver cornutum, Gehörnter Magsamē.

Paris herba, Wolfsbeer.

Perthenium, Mutterkraut.

Pecten veneris.

Pelecinus sylvest.

Pentaphylli tria genera, Waldwinden,

Perichlymenon.

Peplus, Teuffelsmilch.

Peucedanum.

Phu, Baldrian.

Phyllirea nostra, Kerngarten.

Piceae

Piceaster.

Pilosella maior & minor, Nagelkraut.

Pimpinella, Bibinell.

Plantagines, Wegerich.

Polygonatum, Weißwurtz. vtrung.

Polemonium.

Polium nostrum.

Porrum, Lauch.

Prunella vulgaris, Braunellen.

Pseudochamaedrys, Gamenderly.

Pulmonaria Gallica, Lungenkraut.

Quinq; folium minus, Fünffingerkraut.

Quinq; folium aquaticum.

Ranunculi genera hortensia et sylvestria, allee

Raphanus maior, Rettich. (ley benensfuß.

Rapi sylvestris genus.

Rapunculi syl genus, flor coeruleo.

Ribes vulgò dictum, S. Johans treübel.

Rose, Rosen.

Rosa minor. Meyenrößlin.

Rose albe, Weißrosen.

Rose incarnate, Leybsfarbrosen.

Rosmarinus, Rosmarin.

Rubia minor, & syl. zame vnd wilde röte.

Rubus humilis, Niderbrombeerstaud.

Rubus idaeus, Bindebeere.

Ruta, ruta pratensis, Rauten.

Sabina, Seuybaum.

Sambucus aquatica Tragi, Bolder.

Sanicula guttata, alpina, Sanicel.



*Sanicula.*

*Sanguinea virga.*

*Saxifraga alba*, Wyffersteinbred.

*Satyrium basilicum.*

*Scabiosa*, Apostemkraut.

*Sclarea sylvestris.*

*Scorpioides*, Vergiß mich nit.

*Scrophularia mas*, Brunwurtz.

*Sedigenus tertium*, Maurpfäffer.

*Sedum mont.* Fischzung.

*Serpillum acinarium*, Moosbeere.

*Sesamoides Anglor.*

*Seselis genus*, Bärwurtz.

*Sideritis*, gratia Dei, Gottes gnad.

*Sideritis*, Blutwurtz.

*Sinapium syl.* Wilder senff.

*Spina alba*, oxyacantha, Erbselen.

*Spina ceruina.*

*Spina appendix.*

*Solani genus* syluat.

*Solanum somniferum.*

*Symphytum alterum.*

*Thlaspi alterum Tragi*, Wilderfressich.

*Thlaspi allium redolens.*

*Tilia urbana*, Linderbaum.

*Thymus*, Thym.

*Trifolium pratense*, Wylsenflee.

*Trifolium*, Biberflee.

*Valeriana minima*, Baldrian geschlecht.

*Valeriana saxatilis.*

Vene=

Veneris pecken.

Verbenaca supina, guldin gansel.

Veronica, Ehrenbreyß.

Vetonica sylvestris, Nütwill.

Vicia flor. rubicundis, wicken.

Vicia montana.

Vicia sylvest.

Vicia minor, vogelwicken.

Viola Alpina.

Viola matronalis, pfingstnägle.

Viola multicolor.

Viola trinitatis, dencfenblümle.

Viola alba & nigra, Violen.

Virga sanguinea, cornus foem.

Vitis, weynrâb.

Vitis idea, Heidelbeer.

Vnifolium.

Vrtica mortua, taubnessel.

Vulneraria, hasenflee.

Vua crispa, kruselbeer.

Vuularia pratensis, Brune glockenblümle.

# MAIO SEMINA FERUNT.

Aegolethros, Bößblüm.

Asarum, haselwurtz.

Cerasa, Kirse.

Fraga, Erdtbeere.

Ranunculus Sardonius.

Saxifraga alba, weyßer steinbrech.

## I V N I O F L O R E N T.

*Absinthium commune*, Wermut.

*Abies*, Tanne.

*Aconitum luteum, ceruleum, flavum*, Wolfswurze.

*Acorus vulgaris*, Gälb wassergulgen.

*Alcea*, Louwenzai.

*Alliaria*, Knoblauchkraut.

*Alfinae Italicae*.

*Alfinae species*, Heiendarm.

*Amaracus*, Mavoran.

*Anagallis*, Gauchheyl.

*Anagallis aquatica*, Bachpungen.

*Anagallis rubro flore*, Gauchheyl mit roten blümen.

*Androsmon*, Unser frouwen Bettstrouw.

*Anethum*, Dill.

*Antirrhinum purpureū, album*, Sterckkraut mit roten blümen.

*Antirrhinum folijs hyssopi*.

*Antirrhinum aruense*, Großer süßer flec.

*Aphaca species*, S. Chustoffels kraut.

*Apios quorundam*, Erdnuß.

*Apium*, Garten eppich.

*Apium montanum*, Berg eppich.

*Argentaria*.

*Arthemisia tenuifolia*, Wildercypress.

*Aritritica alpina*, Gschläche der schlüsselflumen.

*Aristea*

- Aristolochia clemat.* Lange osterlucey.  
*Asclepias siue hircundinaria*, Vincetoxicum,  
 Schwalmenwurtz.  
*Ascyrhoides*, Gschlächt des S. Johannis  
*Aspergula*, Kläberkraut. (Kraut.  
*Asphodelus*, Goldgilgen.  
*Astrantia*, vulgò Laser.  
*Astrantia nigra*, Schwarzmeisterwurtz.  
*Atriplices*, Burckharts Kreüter.  
*Auicularia Syluij*.  
*Avena*, Haber.  
*Ballote*, Stinckender andorn.  
*Barba caprina*, Ymbenkraut.  
*S. Barbara herba*, Weysser senff / S. Bara  
 benkraut.  
*Bellis maior*, Geyßblumen.  
*Bellis albus & ruber*, Weysse / rote mülye  
 blümly.  
*Betonica altilis*, Betonien / Graß blumen.  
*Betonica foetida*.  
*Bistorta*, Naserwurtz.  
*Blattaria Fuch.* Gschlächt des wullkrauts.  
*Blitum*, Meyer.  
*Blitum rubrum*, Rotmeyer.  
*Betrys*, Traubenkraut / Frottenkraut.  
*Branca vrsina*, Bärenflaumen.  
*Bryonia*, Schmarwurtz / hunds Kürbs.  
*Bulzossium min & ma.* Ochsenzungen.  
*Bursa pastoris*, Teschelkraut.  
*Caps*, Zwiebeln / Böllen.  
*Calamintha*, Steinmüng.

*Calendula*, Ringelblumen.

*Campanula coerulea*, Zäpflefraut.

*Cantabrica quorundam*.

*Cardiaca*, Hertzfraut.

*Caros vulgò Carui*, Weyssen Kümmech.

*Carduus aruensis*, Haber distel.

*Cardui genus maculis albis*.

*Carduus palustris*.

*Caryophyllata*, Benediktenwurtz.

*Cassutha, cuscutha*, Siltzfraut/flachs syden.

*Centaurium minus*, Tausendguldin fraut/  
Erdgall.

*Chamædrys vera*, Gamanderlin.

*Chamæcyparissus*, Cypreßfraut.

*Chamæpithys*, Ye lenger ye lieber.

*Chamæmalum*.

*Chamæmalum nobile*, Chamomillen.

*Chelidonium maius*, Schellwurtz.

*Chrysanthemum Fuchsij*.

*Chrysanthemum verum*, Goldblüm.

*Cicuta*, Schirling/falberforn.

*Cicutariæ quædam*.

*Cichorium*, Wäggwart.

*Clymenum vtrunq;*.

*Condrylla*, Wild Endiuien.

*Consiligo*, A. eüßfraut.

*Conuoluulus minor*, Winden / zaunglogg  
gen.

*Conyca species*, Dürrewurtz.

*Conyza collina*.

Corcho-

- Corchorus, Gauchheyl.  
 Coronopus, Krayenfuß.  
 Costus hortensis minor, Costwurzel.  
 Cotyla foetida, Hundsdill.  
 Cucumis anguinus, Geschlächt der Cucumern.  
 Cyanus mont. Geschlächt der Kornblumen.  
 Cymini sylvestris genus, Ritterspödy.  
 Cynoglossum, Hundszung.  
 Daucus sepiarius.  
 Dauci tria genera, Wilde rüblin.  
 Dentillaria, aliquibus Schuppenwurz.  
 Digitalis Fuchsij, Fingerhut / fingerkraut.  
 Dipsacus albus & purpureus, Bartendistel.  
 Doria herba.  
 Dulcis radix, Süßholz.  
 Ebulus, Attich.  
 Echion, Wildochsenzung.  
 Eruca syl. Wilder weyßer sänff.  
 Erysimum Fuchsij, Sederich.  
 Erysimum hortense.  
 Faba, Bon.  
 Filix ante patrem, Schoßkraut.  
 Flos lous, Summelrößly / Marienrößly.  
 Flos Portugall. Indianische nägele.  
 Foeniculum, Fenchel.  
 Fumaria, A rdrauch / roter taubenkröpfle.  
 Fungi, Psifferling.  
 Gallion, Gelb argentrost.  
 Genista minor, Pfingstblumen.

# IV N I V S.

*Gentiana*, Entian/Bitterwurtz.

*Gentianæ species*, Nadelgeer.

*Geranium*, gratia Dei, Gottes gnad.

*Geraniū montanū*, Eschlächz der Storchenschnabel.

*Gladiolus*, xiphiū, Klein Blauw schwertel.

*Gramen minus*.

*Gratiola minor*.

*Helxine cyssampelos*, Winden.

*Heptaphyllon*, tormentilla, Tormentill.

*Hieracij genus in pratis*, Habichkraut.

*Hirci barba*, Habermerck.

*Hyoscyamus cōmunis* & *Syriacus*, Bilsam.

*Hypericum minus*, S. Johannis kraut.

*Iacea*, D. Iacobi herba, S. Jacobs blüm.

*Iasminum*, Veielrāben.

*Ibiscus*, Ybischen.

*Intubus sativus*, Endiuien.

*Iulia Italis dicta*.

*Lactuca sylvest* genus procerum, Wilder lact.

*Lagopus*, Katzenflee/hasenpfädlin. (tich).

*Lampsana flore luteo*, Wild senffkraut.

*Lantana Ital*, Kleiner mālbaum.

*Lathyris*, Treybüdner/springbüdner.

*Lauendula*, Lauendel.

*Lens*, Linse.

*Lepidium Aeginetæ*, Art des sänffskraut.

*Ligustrum*, Kerngert.

*Lilij genus montanum*, Art der gilgen.

*Liliū albū*, *croceū* & *rubrū*, Allerley gilgen  
Eschlächz. Lins

*Linaria*, Leynfrant.

*Linum*, Flachs. (Brech.

*Lithospermum*, Meerbirß/weyßer stein.

*Lotus inodorus floribus luteis*, Ein flec

geschlächt.

*Lotus syl.* Stundfrant.

*Lunaria Fuch.* Geschlächt des Monatsfrant.

*Lupinus*, Feybohnen.

*Lichen*, hepatica, Stein läberfrant. (Frant.

*Lysimachia flavū*, Gälber weiderich/ schoß

*Lysimachia purpurea*, Roter weiderich.

*Malua*, syl. maior.

*Malua magna*, Erntosen.

*Marrubium*, Lungenfrant/ etlichen läber

frant.

*Medica sylvestris & hortensis*, Art der flec.

*Melampyrum*, Růweyßer aliquibus.

*Melilotus inodora*, alba, Stein flec.

*Melilotus crispa*.

*Melilotus agrestis*.

*Melissa Fuchsi*, Melissen.

*Mentastrum*, Wilde rütiß.

*Mercurialis*, Ed eyßfrant.

*Millefolij species*, Barb.

*Millefolium commune*.

*Myrica*, Tamarisc.

*Myrrhida species*, Art deß wilden peters

lins.

*Narcissi species*, Unser vrouwen galgen.

*Nardus vulgaris*.



I V N I V S.

- Nasturtium*, Kressich.  
*Nigella coronata*, Schabab.  
*Nymphaea* vtrāq; Seeblumen.  
*Noli me tangere*, Springkraut.  
*Nummularia*, Pfännigkraut.  
*Ocimum Tragi*, Heydenkorn.  
*Ocymon Basilicon*, Basiliën.  
*Ocymoides album*.  
*Ocymoides rubrum*.  
*Ocymoides croceo flore*.  
*Oenante*, Roter Steinbrech.  
*Olea*, Oelbaum.  
*Ononis*, Dachsenbräuch/heuwhechel.  
*Orchis*, Unser frouwen trähen.  
*Origanum commune*, Hochen costentz.  
*Orminum* vtrunq; Scharlach.  
*Ornus*, grosser Mälbaum.  
*Ophris Fuchsi*, Zweyblatt.  
*Panaces Chironium*, Sonnenblumen.  
*Papauer Erraticum*, Kornrosen.  
*Papauer triplex*, Magsaamen geschlächt.  
*Parhenium*, Mütterkraut.  
*Pastinaca erratica umbellis luteis*.  
*Pentaphyllum erectum*, Fünffingerkraut.  
*Perfoliata rubra*.  
*Perfoliata*, Durchwachs.  
*Perforata*, Androsamon, S. Johānskraut.  
*Periclymenon*, Späckgilgen.  
*Persicaria maculosa*, Flöhkraut.  
*Pes leonis*, Sinnauw.

Phœnix

- Phoenix, Roten wilden haber.  
 Phalangium, Wilde gras gulgenli.  
 Phu(maius) Dioscor Baldrian.  
 Pilosella maior & minor, Nagelkraut.  
 Pimpinella, Bibenell.  
 Pyrola, Wintergrün.  
 Pisum, Erbe.  
 Plantago maior aquatica, Wasserwägerich.  
 Polymonium Fontanoni, Lidweyich.  
 Polymonium viscosum.  
 Polium commune, Feldpolium.  
 Porrum sectium, Louch.  
 Portulaca, Bürtzelkraut.  
 Polytrichon Apuleij, Guldiwiderthon.  
 Polygonum, Wägggras/wäggtritt.  
 Prunella, Braunnellen.  
 Pseudochamædrys, Schaaffkraut.  
 Pseudonardus.  
 Pseudomclanthium, Ratten.  
 Ptarmice, Mütterwurtz.  
 Quinq; folium, Fünffingerkraut.  
 Ranunculi diuersæ, Allerley moosblumen/  
 banenfüß.  
 Raphanus, Rettich.  
 Rapistrum flore albo.  
 Rapum syl. Rapuntzly.  
 Rhaponticum spurium.  
 Rhododaphne min. Shürkraut.  
 Rosa, Roosen.  
 Rubia syl. species, Eschlächter der röte.  
R

- Rubus, Brombeerstand.  
 Rubus idaeus, Hindbeere.  
 Ruta, Rauuten.  
 Sabina, Senyhoum.  
 Salvia nobilis, Edle salbey.  
 Sambucus, Holder.  
 Sanicula, Sanickel.  
 Saponaria, Welschfranz.  
 Satyrion trifolium Fuchsj, Eschlächzt der Kna  
 benkraut.  
 Satyrion basilicon quadrifolium.  
 Saxifraga Fuchsj, Maurreuten.  
 Saxifraga pimpinella similis.  
 Scabiosa, Apostemkraut.  
 Scabiosa maxima.  
 Scordium, Wasser Battennig.  
 Scorpioides caeruleum.  
 Scrophularia maior, Braunwurz.  
 Sedum, Hauswurz.  
 Sedum minus, Klassenkraut.  
 Senecio, Creutzkraut.  
 Sphondylium.  
 Syderitis, Gottesgnad.  
 Sinapi, Sänff.  
 Sinapi syl. Wilder sänff.  
 Solanum perpetuum, Ye lenger ye lieber.  
 Solanum pomiferum, Nachtschatten.  
 Sonchus uterq;, Genß distel.  
 Sonchus levis.  
 Spicanardi vulgò dicta.

*Spinae albae species.*

*Stachis Fuchſij*, Riechender andorn.

*Stichas*, Rhein Blumen.

*Symphytum alterum*, Wallwurtz.

*Thamarix*, *Myrica*, Tamariscen holz.

*Tanacetum fatuum*,

*Tanacetum minus*, Reinfarn.

*Telephium*, Mundkraut.

*Thlaſſi*, Wilder ſänſſ.

*Thymus*, Thym.

*Tilia*, Linden boum.

*Tithymallus parallius*, Wolſſe milch.

*Tithymallus myrthites*.

*Tormentilla*, Tormentill.

*Tribulus terreſtris*.

*Trifolia*, Klee.

*Triticum*, Korn.

*Verbascum*, Mulkraut.

*Verbena*, Eysenhart/ eysenkraut.

*Verbena altera Fuchſij*.

*Viciae ſylueſtres*, Wild wicken.

*Vicia*, Wicken.

*Vincetoxicum*, Schwalbenwurtz.

*Vitis ſatina & ſylueſtris*, Weynraß zain vñ

*Vlmaria*. (wild.

*Viola ſepticolores*, Sibenfarbwen blüme

*Viola anonymos*. (lyn.

*Virga ſanguinea Plinij*, Bartrigel.

*Vrtice*, Vießlen.

*Vuularia flore cœruleo*, Balß kraut.

# IVNIVS.

## FRUCTVS ET SEMINA proferunt.

Alysson pratense.

Azarum, Haselwurtz.

Barba caprina.

Caros.

Cerasus, Kirschenbaum.

Colchicon, Zeytlosen / herbstblümen.

Fragaria maior, minor alba, Erdbeertrant.

Filix, Farn.

Graminis vel auenæ syl. genus.

Graminis genera varia, Mancherley grasß.

Hordeum, Gersten.

Lapathum oxalys, Saurampfer.

Malus præcox, Paradyß opfel.

Malus verna.

Ocymoides rubrum.)

Pimpinella, Bibenell.

Piper montanum, Syland.

Polymonium petreum.

Ribes, S. Johannis treübel.

Viola purpurea.

Vitis idæa.

Vua crispâ, Krauselbeer.

## IVLIO FLORENT.

Absinthium commune, Wurmet.

Aconitum luparia dictum, Letißfrant.

Aconitum cæruleum, Napellus, Wolffwurtz.

Alcea

- Alcea*, Sigmarswurtzen.  
*Alge palust. & fluuiatiles*, Wasser violen.  
*Alkali*, Ein meertraut.  
*Allium hortense & sylvestre*, Knoblauch.  
*Alysson Ruellij*.  
*Anaracus*, Mayoran.  
*Ammi*, Gschlächt des Kümmiche.  
*Anagallis purpurea*, Gauchheyl mit pur-  
 purfarben blümlihen.  
*Anagallis aquatica maior*.  
*Androsæmon minus & maius*.  
*Androsæmon Fuchsij*, Rünradt.  
*Anemone altera*, Genserich.  
*Anethum*, Dill.  
*Angelica aquatica*, Wasser angelicken.  
*Anisum*, Aeniß.  
*Anonis*, Ochsenbrech.  
*Anthemis*, Chamillen Blumen.  
*Antirrhini genus albis floribus*.  
*D. Antonij herba*.  
*Apij genera*, Eppich gschlächter.  
*Apparine*, Kleberfrant.  
*Aristolochia longa*, Osterluccey  
*Arthemisia*, Beyfuß/rot Buggeln.  
*Asclepias*, Schwalmenwurtz.  
*Ascyron Fuchsij*.  
*Asparagus*, Spargen.  
*Aspergula*, Kleberfrant.  
*Astrantia*, Meysterwurtz.  
*Atriplex syl.* Wilder Burchhart.

- Ballote, Stinckender andorn.  
 Bellis maior & minor, Niesille Blümlin.  
 Beta duo genera, Weysser vñ roter man.  
 Betonica, Battonickien, Betonien. (golt.  
 Betonicum altile, Steinnägely.  
 Betonica Pauli.  
 Blitum (album) Meyer.  
 Borrago, Burretsch.  
 Botrys, Traubenkraut.  
 Branca vrsina, Bärenklauwen.  
 Bryonia, Hands fürbs.  
 Buphthalmus, cotyla non foetida, Kinds au-  
 gen.  
 Bursa pastoris, Teschelfraut.  
 Cepe, Zwiebeln.  
 Calamintha tria genera, Steinyntütz ge-  
 schlächter.  
 Calamintha montana.  
 Caltha, Ringelblümen.  
 Campanula, Halskraut.  
 Cannabis, Hanff.  
 Capsicum, Indienischer pfäffer  
 Caput monachi, halicacabus peregrinus.  
 Cardiacum, Hertz span.  
 Carlina, Eberwurtz.  
 Carduus sine caule.  
 Carduus arvensis maior.  
 Carduus benedictus, Cardenbenedicten.  
 Caryophyllus indicus, Indiamische nägele.  
 Caryophyllata sylvestris.

- Centaurium maius & minus*, Tausend guls  
*Centimorbia*, Pfennigkraut. (Difkraut.  
*Chamaecyparissus*, Hirtzwurtz.  
*Chamaedrys vera*, Hamanderly.  
*Chamaedrys f. Fuchsi*.  
*Chamaeleon*, Eberwurtz.  
*Chamaemelum*, Camillen Blumen.  
*Chamaepithys*, Ye lenger ye lieber.  
*Chamaesyce*, Geschlacht der wolffs milch.  
*Chondrilla minor*, Benß distel.  
*Cicer sylvestre*.  
*Cichorium*, Wägwurt/wäglügen.  
*Cicuta aquatica*, Schirling.  
*Cicutaria*, Wilder Försfel.  
*Consolidaregalis*, Ritterspoin.  
*Convolvulus maior*, Zaungloggen.  
*Convolvulo similis*, Schwartz winden.  
*Conyza species*, Eschlacher & Dürrwurtz/  
oder Donnerwurtz.  
*Conyza genus tertium*.  
*Conyza muralis*.  
*Conyza palustris*.  
*Conyzoides*.  
*Corchorus quidam*.  
*Coronopus flore coeruleo*, Krötenfuß.  
*Cucurbita*, Kürbis.  
*Cumin syl genus*.  
*Cyanus*, Kornblumen.  
*Cyclaminus prima*.  
*Cyperus*, Cypreßbaum.



I V L I V S.

- Cytisus suffrutux*, Weltsch Linsen.  
*Daucus sylvestris maior*.  
*Daucus creticus*, Bärwurtz.  
*Daucus palustris*.  
*Dauci sylvestris species*.  
*Dentillaria*.  
*Dentillaria* σινι ποει δ' ας.  
*Digitalis duplex*, Fingerhüttraut.  
*Dipsacus*, Kartendistel.  
*Dorychnium* Monsp.  
*Draco hortensis*.  
*Ebulus*, Actenwurtz.  
*Echinopus meus*.  
*Elleborus albus*, Weiß Nießwurtz.  
*Eruca vera*.  
*Eruca sylvestris*, Wilder senff.  
*ἔρρεα δ' ὕραμιν* Polonor.  
*Eruca Fuchsij*.  
*Eruum Fuchsij*.  
*Eruum syl. minus*, Eruen.  
*Eryngium marinum*, Geschlächt der mans-  
 treißw.  
*Erysimum hortense*.  
*Erysimum sylvestre*, Hederich wild vñ zam.  
*Esula tria genera*.  
*Esula rotunda*, πέπλος, Teufelsmilch.  
*Eupator*, Airc.  
*Eupator*, Græc. Algrimiingen oder monig.  
*Euphrasia*, Augentrost.  
*Filius ante patrem triplex*, Braun ald rot  
 weiderich. Flos

- Flos Iouis, Himelrößli.  
 Flos Portugal, Indianische negli.  
 Fœniculum, Fenchel.  
 Fœnugræcum, Bockshorn/Kühorn.  
 Fragaria, Erdbeerfraut.  
 Frumentum turcicum, Türkisch Korn.  
 Fumaria, Kotte taubenröspfl.  
 Gallion, Gelber augentrost.  
 Galiopsis, Braunwurtz.  
 Genista minor non spinosa & spinosa, Erd-  
 pfrummen.  
 Gentianæ species, Modelgär.  
 Glycyrrhiza, Süßholz.  
 Gnaphalion, Kürkraut.  
 Graminis genus, geschlecht des gras.  
 Gratiola.  
 Hasenföl.  
 Heliotropium minus, Flein Krebskraut.  
 Heliotropij genus, Vergiß mein nit.  
 Heidenhysop/Buchkraut.  
 Helxine, tag vnd nacht.  
 Helxine cyssampelos, Winden.  
 Herniaria, Buchkraut.  
 Hirundinaria, Schwalmenwurtz.  
 Hyeracium pratense.  
 Hypericum Fuchsj.  
 Hyperici species maior, S. Johans kraut.  
 Hyppuris vtrq;  
 Hyosciamus, Bilsamkraut.  
 Hyosciamus ex Syria.

- Hyssopus, Hyssop.  
 Hyssopus alba.  
 Diuiliacobi flos, S Jacobs blüm.  
 Iasminum.  
 Ibisus, Ibschen.  
 Intubus, Endiuien.  
 Inula, Zilantwurcz.  
 Iouis flos, Tondernägeli.  
 Iua aruensis quedam.  
 Lâberblümlein, imia d'raut.  
 Lactuca syl Lattich.  
 Lagopus, Basen flec.  
 Lancea Christi, Marterzünglin.  
 Lapathum aquaticum, Gschlecht der grind  
 wurcz.  
 Lappa maior, Kletten Fraut.  
 Lauendula, Lauander.  
 Lens, Linse.  
 Lentibularia.  
 Lepidium, Ofesser Fraut/senfffraut.  
 Leucoium marinum.  
 Libanotis italica.  
 Libanotidis species.  
 Lichen, Brannen lâberfraut.  
 Limonium Fontanoni.  
 Linaria, Flachsfraut.  
 Linum, Flachs.  
 Linaum syl Wilder flachs.  
 Lichospermum, Meerhirs.  
 Locustaherba, Nüßlefraut.

Loti species.

Lotus sylvestris, Zigerkraut.

Lupini, Feig bonen.

Lysimachia lutea, rubra, gelb roth weiderich.

Maiorana, Mayoran.

Malva tria genera, pappelen schlecht.

Malva crispa.

Malva maxima.

Marrubium, Andorn.

Medica quædam.

Melilotus lutea & alba.

Meliloti species, Stein flec.

Melissophyllum, Melissen.

Mentastrium, Katzenminz.

Mentha, Minz.

Meon aquaticum.

Mercurialis, Scheiß kraut.

Millefolium, Garb.

Millefol. luteum.

Milium Indicum, Indianischer hirs.

Myrica, Tamariscenholz.

Nardus vulgaris.

Nasturtium aquaticum, Brunnen fressich.

Nigella flore luteo, Schwarz kömml.

Noli me tangere, Springkraut.

Numularia Fuchsj, Pfennig kraut.

Nymphaea lutea, Seeblumen gälb.

Ocymi duo genera, Basilgen.

Ocymoides album & rubrum.

Ononis, Ochsenbrech/höwbrech.

*Oreoselinum.*

*Origanum vulgare*, Wilder wolgemüt.

*Orminum hortense & pratense*, Scharlach.

*Osyris*, Barnkraut, flachs kraut.

*Panaces Chyronium.*

*Papauer cornutum et erraticum*, & sat. Mag  
samen geschlechter.

*Parthenium*, Mütter kraut.

*Pastinaca tria genera*, geschlecht der rübli-  
nen/und Bastney.

*Pastinaca syl.* Brenn kraut.

*Pecten Veneris.*

*Pentaphyllum*, Fünffinger kraut.

*Peplus*, *Esula rotunda*, teuffels milch.

*Periclymenon*, Speckgilgen.

*Persicaria maculata*, flöh kraut.

*Pes an'erinus*, Seewort.

*Phalangitis*, Grassgilgen.

*Phalangitis maior*

*Phalaris*, Hispanisch saet.

*Phu*, Baldrian.

*Plantago vraq;* Wegerich.

*Pimpinella maior*, Bibenell.

*Polymonium palustræ.*

*Polymonium.*

*Poly: nemon.*

*Portulaca*, Bortzel kraut.

*Potamogeton*, Samkraut.

*Pruncila*, Braunnellen.

*Psyllium*, flöh kraut.

*Pulegium*

- Pulegium*, Doley.  
*Pulegium saxatile*.  
*Pulegium ceruinum*.  
*Ranunculus parvus*.  
*Ranunculus palustris*.  
*Ranunculi quidam*, Harenfuß gschlechter.  
*Rapum* syl. Rapiungly.  
*Rapi* syl species.  
*Rapistrum*, Hederich.  
*Rhaphanus*, Retch.  
*Rhaponticum minus*.  
*Rhododaphne vera*, Oleander banm.  
*Rhododaphne pumila*.  
*Ros Solis*, Sonnentouwo.  
*Rubia palustris parva*, Kleiner rötte.  
*Rubia sativa*, Rötte.  
*Rubie species*, aspergula, Waldmeyer.  
*Rubia sylvatica*, Wilder rötte.  
*Ruta*, Rautten.  
*Samsuchum*, Mayeran.  
*Salvia*, Saluyen.  
*Saponaria*, Weschfraut.  
*Satyrion basilicon*, alpinum.  
*Satureia*, Garten hyssop.  
*Saxifraga hircina duplex*, Steinbrech artt.  
*Saxifraga lutea*.  
*Scabiosa crum* aut quatuor gentrum, Ape-  
 stemtraut.  
*Scolymus*, Cynara, Artischaru.  
*Scordium*, Wasser bartenig.

- Scorpioides Math.*  
*Scorpioides quorundam.*  
*Securidaca, Peltichen.*  
*Sedum maius et minus, Groß vnd Klein hauf*  
*wurtz.*  
*Serpillum, Quendel.*  
*Sisarum hortense, Jerlin.*  
*Sisarum syl. wild pasteney.*  
*Syderitis prima, Blüt wurtz.*  
*Syderitidis species, herba Roberti.*  
*Silibus, Eberwurtz.*  
*Sinapis duo genera, Senff.*  
*Smilax hartenfis, Welschbonen.*  
*Smyrnum, Groß Eppich.*  
*Solanum, Nachtschatten.*  
*Solanum somniferum, Schlaffbeere.*  
*Solanum perpetuum, Lenger ie lieber.*  
*Solanum Indicum.*  
*Solanum pomiferum.*  
*Sonchus vterq;, Gensdistel.*  
*Sonchi species, Milchen.*  
*Sorgi, Welscher hirs.*  
*Sphondylium.*  
*Spica celtica falsa, Bärenstappen.*  
*Spina alba species Fuchf.*  
*Spina alba quorundam.*  
*Spina solstitialis.*  
*Spina citrina.*  
*Staphisagria, Speichelfraut.*  
*Stachys herba, Weiß andorn.*

*Stoechas citrina*, Reinblümen.  
*Symphytum alterum*, Wallwurtz.  
*Tanacetum*, Reinfarr.  
*Tarhon*, et syl.  
*Telephium*, Wundkraut/fergzwang.  
*Thlaspi Lucae Gyni*.  
*Tomentum*.  
*Tormentilla*, Tormentill.  
*Trifol. pratensis* tria genera, Klee.  
*Trifol. bituminosum*.  
*Triticum v. ceinum*, Rurweizen.  
*Typha*, R. oipen.  
*Verbascum*, Wulffraut.  
*Verbaticum murale*.  
*Verbena foemina*, Eisenkraut  
*Verbena rara*.  
*Verbena recta*, mas, Eisenhart.  
*Vicia* syl. Vieſen.  
*Viola matronalis*, Winter violen.  
*Viola trinitatis*, Denckenblümlin.  
*Virga aurea*, Guldinrütt.  
*Vites quædam adhuc*, etlich weynraben.  
*Vitis syl. caustica*, Vuelen.  
*Vlmaria*.  
*Vrtica mortua*, Taubneßlen.  
*Vuularia*, Hepple oder heißkreut.  
*Xiphium*, Schwertel.

IN IULIO SEMINA PROFERUNT.

*Accer minus*, Thorn.



- Aconitum cœruleum*, Rappenblümen.  
*Anacampteros*, Knabenkraut.  
*Anagallis*, Gauchheil.  
*Anguria*, Angurien.  
*Aron*, Teutscher jamber.  
*Beinhülzen*.  
*Barba caprina*, Geißbart.  
*Caryophyllata*, Benedickt wurz.  
*Clematis Aegyptia*.  
*Cerasa dulcia*, Süße kirsche.  
*Eldtsbeere*.  
*Fraga rubra & alba*, Erdbeere.  
*Lantana*.  
*Lapathi genera*, Allerley ampferenlendy  
 wurz.  
*Lilium conuallium*, Meyenblümlin meyen-  
 ryßlin.  
*Lunaria Græca*, gschlecht des Monskraut.  
*Mala præcocia*, Paradyßopfel.  
*Mahaleb*.  
*Nigella*, Schabab.  
*Orminum*, Scharlach.  
*Periclimenon*, Speckgilgen.  
*Phu hortense*, Garten baldrian.  
*Pimpinella*, Bibenell.  
*Pira præcotia & superba*, Muscatbyrly.  
*Pira a fœno denominaa*, Röwbyren.  
*Plantago aquatica*, Wegerich.  
*Pruni genus*, Blauw Friecken.  
*Pseudocyperus*.

*Pulmonaria*, Lungenkraut.  
*Rubus idæus*, Hindbeerin.  
*Sambucus*, Holder.  
*Spina ceruina*, Creutz bere.  
*Viola inodora*, Seyfaltigkeit blüml.  
*Vitis*, Weynraß.  
*Vitis idæa*, maior, Moßbeer.  
 Wyß moßblümen.

# AVGVSTO FLORENT.

*Absinthium*, Wurmee.  
*Abrotonum mas & foemina*.. Stabwurtz.  
*Alcea*, Sigmarckkraut.  
*Aconitum luteum*, Rappnblümen.  
*Allium montanum*, Bergknoblauch.  
*Alprosen*.  
*Althæa*, Ibschen.  
*Alysson*, Klaffenkraut.  
*Amaracus*, Mayeron.  
*Amaranthus*, Samet blümē/tausendschn.  
*Ammi*, Ammey.  
*Antigallia*, Gauchheil.  
*Anacampteros*, Knabenkraut.  
*Angelica odorata*, Angelicken.  
*Angelica aquatica*.  
*Arthemisia*, Buckelen/Beyfuß.  
*Arundo*, Roß.  
*Asclepias*, Schwalmenwurtz.  
*Aster atticus* Fuchs. Sternkrut/wägstrow.

*Astrantia nigra.*

*Attractilis virag;* Wilder Veldsaffran.

*Ballote,* Stachelender andorn.

*Balsamine veraq;* Balsam öpfel.

*Bellis hortensis,* syluest. maior, minor, müllen-  
blüml.

*Betonicum mont. duplex.*

*Borrago,* Buretsch.

*Botrys,* Traubenkraut.

*Bupthalmus,* cotyla non foetida, Rindsaug/  
Püdillen.

*Bursa pastoris,* Teschel Kraut.

*Bryonia,* Hundsfurbs.

*Calamintha montana,* Stein müntz.

*Caltha,* Ringelblümen.

*Capsicum,* Calcutischer pfeffer.

*Carduus asininus com.*

*Caryophyllatae syl. genus,* Nüßwillen.

*Centaurium minus flore rubro,* Tausendgold-  
dinkraut.

*Chamaemalum,* Chamillen.

*Chamaesyce,* gschlecht der wolffsmilch.

*Chelidonium maius,* Schellkraut.

*Chondrylla,* Wild endiuien.

*Cichorium syluest satium,* Sam Endiuien/  
wegwart.

*Cici,* Wundel boum.

*Clinopodion.* Steinpoley.

*Cicuta,* Schirling.

*Cnicus,* Wilder saffran.

*Colehicon*. Zeitloß/herbstblüm.

*Consolida regia*, minor, maior, Geschlecht  
Schwarz wurtz.

*Conuoluulus maior*, minor, 2. Ringlogen.

*Conuoluulo similis*, *Oroban* he.

*Conyza vtraq;*, Durr wurtz.

*Conyza aquatica*.

*Conyzoides cœrulea*.

*Conyzoides in collibus*.

*Costi hortensis* genus minus.

*Cucumis erraticus*.

*Cucurbitarum genera*, allerley Kürbisen.

*Cuminum* genus syluestre.

*Cyperus*, 2 ypreß.

*Cyclaminus*, Seiwurtt.

*Dauci* genus. Wildrüblin.

*Detrahit*.

*Dipsacus minor*, Kartendistel.

*Doronicum*, Gemßwurtz.

*Dorychnium*.

*Echinopus carduus*.

*Erica*, Heyd.

*Eruca*, Wilder weyßer senff.

*Erysimon*, Hederich.

*Eryngium alpinum*, Anethretum.

*Esula*.

*Euphrasia*, Augentroß.

*Eupatorium Mesuae*, frömbtleberkraut.

*Eupatorium aquaticum*.

*Filius ante patrem maior & maximus*, weiden-  
rich Flein vnd groß.

# AVGVSTVS.

Flos Portugal. maior, Indianische negeli.  
 Flos Iouis, Himmel rögli.  
 Foeniculum vtrunq;, Fenchel.  
 Frumentum Tūrcicum, Türckisch Korn.  
 Galliopsis, Braunwurtz.  
 Gentiana minor & maior.  
 Gentiana palust. Bitterwurtz gschlechter.  
 Geranium gratia Dei, Gottes gnad.  
 Geum, Benedicta, Benedicten fraut.  
 Granum Nil.  
 Helxine, tag vnd nacht.  
 Helxine cyssampelos, Winden.  
 Herniaria, Buchfraut.  
 Hyeracium vtrunq;, Gänßdistel.  
 Hydropiper, Flöh fraut/wasserpfeffer.  
 Hypericon, S. Johans blüm.  
 Hyssopus, Hyssop.  
 D. Iacobi flos, S. Jacobs blüm.  
 Ibisus, Ibisch.  
 Iberis Matthioli, Besemfraut.  
 Inula, Alantwurtz.  
 Lactuca sylvestris, Wilderlattich.  
 Lagopus, Rätzlyflee.  
 Lancea Christi, Matternzünglin.  
 Lathyrus, Sprungkörner.  
 Leucoia Medicorum.  
 Limonium, bistorta, Matternwurtz.  
 Linaria, Flachsfraut.  
 Lotus urbana, trifol. caballinum, Seiben=  
 zeyt.

Lupus

Lupus salictarius, Hopfen.

Ly simachij genera, gschlächter d weiderich.

Malum insanum, Dollöpfel.

Malua vulgaris, Pappeln.

Malua hortensis maior.

Malua crispa.

Marrubium, Andorn.

Marrubio similis herba.

Medica floribus violaceis.

Melilotus lutea & alba, Unser frouwen  
schüchlin.

Melilotus inodora, Steinflee.

Melon, Melopepon, Melaun.

Mentha genera, Muintz gschlächter.

Mentastrum, Wilde muintz.

Mercurialis, Scheyßfraut.

Milium, Hirß.

Millefolium album, purpureum, Garb.

Morsus diaboli, Tetifels abbiß.

Nasturtium alpinum, Bergkressich.

Noli me tangere, Springkraut.

Nux Methel.

Ocymum, Basilien.

Ocymoides peregrinum.

Ocymoides floribus albis.

Ocymoides rubrum.

Orobanche Ruellij.

Origanum vulgare, Bohencostentz.

Oxylapathum vulgare. Lendy wurtz.

Papauer erraticum, Kornrosen.

# A V G V S T V S.

*Pastinaca erratica*, Vogelnäst.  
*Pentaphyllum petraeum*.  
*Periclymenū*, Speckgilgen.  
*Persicaria*, Pfersichkraut.  
*Petroselinum* Fuchsj.  
*Peucedanum*, Haarstrang/seiwosendel.  
*Plantago*, Wägerich.  
*Polycnemon*, Langer dost.  
*Polymonium*, Widerstoß.  
*Porrum*, Louch.  
*Prunella*, Bruncellen/guldeguntzel.  
*Psyllium*, Flöhkraut.  
*Ptarmice*, Mütterwurtz.  
*Pulmonaria muralis*, Büchspick.  
*Ranunculus pratensis*, Moßblum.  
*Rapum petraeum*, Augenkraut.  
*Rapistrum*.  
*Raponticum ignobile*.  
*Rosa aliquando*, Rosen.  
*Rubus maior, humilis*, Brombeer.  
*Rubia sylvest.* Waldmeister.  
*Ruta*, Rauten.  
*Saponaria*, Wäschkraut.  
*Satyrion*, Unser frauen trähen.  
*Scabiosa*, Apostemkraut.  
*Scordium*, Wasser Rarhenig.  
*Sedum vel phylli mont. genera*.  
*Serpillum*, Quendel.  
*Seselis genus*.  
*Syderitis prima*.

*Sisym-*

*Sisymbrium*, Visch oder wasser münz.

*Sylibus*, Eberwurtz.

*Sium cardamine*, Brunenfressich.

*Solanum*, Nachtschatten.

*Solanum vesicarium*, Alkekengi, Judentirse.

*Solanum perpetuum*, Ye lenger ye lieber.

*Solanum pomiferum*, Goldopfel.

*Solidago Sarracenicæ*, Heydnisch wunde

Frant.

*Sonchus agrestis*, Basenfdl.

*Sonchi genus quoddam*.

*Sorgi*, Sorgsamen.

*Spatula foetida*, Welsch Schwertel.

*Sphondylion*.

*Strammenia* Stechdpfel.

*Tanacetum*, Wurmfrant.

*Thlaspi*, Gyni.

*Tormentilla*, Tormentill.

*Tribulus terrestris*, Burtzeldorn.

*Trifolia*, Klee.

*Verbascum*, Wullfrant.

*Verbascum apicibus purpureis*.

*Verbena*, Eysenfrant.

*Verbena lutea* Fuchsj.

*Viburnum*, Schlingbaum.

*Viola matronales* Fuchsj, Winter violen.

*Viola nigra* syl. Zame vnd wilde violen.

*Viola inodora*.

*Virga aurea*, Guldin rüt/Heydnisch wünd

Frant.



# A V G V S T V S.

*Vrtica*, Nessel.

*Vrtica mortua*, Taubnessel.

*Vuularia minima*, Blauw augentrost.

## A V G. P R O F E R V N T S E M I N A.

*Aconitum luteum*, Gålb wolffwurtz.

*Anemone mont.* gschlächht der fuchenschell.

*Aron*, Teütscher Ingber.

*Balsamine pomifera*, Balsam opfel.

*Botrys*, Traubenkraut.

*Cerasa duracina*, Knelfirse.

*Cornus*, Thierlin baum.

*Corylus sativa*, Haselstaud.

*Daucigenus humile*, Gschlächht des kûm.

*Digitalis vtraq;*, Fingerhüt. (michs.)

*Ebulus*, Attich.

*Eruca*, Wilder weyffer pfäffer.

*Ficus in Italia*, Feygenboum.

*Filius ante patrem maximus*, Weiderich.

*Fraga*, Erdbeere.

*Gentiana cruciata*, Gschlächht der Bitterwurtz.

*Genistella*, Pfrimmen blümle.

*Herba S. Anthonij.*

*Hordeum*, Gersten.

*Hydropiper*. Wasser pfäffer.

*Hyosciamus Syriacus*, Syrischen Bilsam.

*Laureola vulgaris*, Zyland.

*Lithospermon*, Meerbirß.

*Lotus*

*Lotus sylvest.* Wilder steinflee.

*Lunaria Græca*, Gschlächter deß Mons-

Fraut.

*Lupus salictarius*, Hopfen.

*Lysimachij genus purpureis floribus.*

*Mali diuersæ*, Allerley opfelbaum.

*Mala insana*, Doll opfel.

*Mercurialis mas & foemina*, Scheißkraut.

*Morus*, Maulbeerbaum.

*Nigella*, Schwartz kummel.

*Nux iuglans*, Nußbaum.

*Ocymoides peregrinum.*

*Oxyacantha*, Erbselen.

*Pastinaca maior*, Rübli.

*Phalaris*, Canarien saamen.

*Pira diuersa*, Mancherley birein.

*Plantagines*, Wägerich.

*Polygonaton erectum.*

*Pruna diuersa*, Mancherley Friecken.

*Pseudomelanthium.*

*Quercus*, Eichbaum.

*Rubus Idæus*, Hindtbeerin.

*Rubus maior & minor*, Brombeer.

*Ruta capraria*, Geyß raute.

*Sambucus*, Holderbaum.

*Saxifraga hircina.*

*Seseli montan.* Berg kummel.

*Sonchus*, Hasenföl/gäng distel.

*Sorbus aucuparia*, Vieläschin.

*Spina appendix*, Weißdorn.

T

# A V G V S T V S.

Spina alba Dioscor. Mariendistel.  
 Symphitū magnū, Wallwurtz/schwarz.  
 Tanacetum, Wurmfrut. (wurtz.  
 Tilia urbana, Lindenhout.  
 Tormentilla, Tormentill.  
 Trifolium bituminosum, Harzflce.  
 Vitis dæa, nigra & rubra.  
 Vitis sylvest caustica, Vielen.  
 Vitis sativa, Weynraß.  
 Urtica mortua, Taubnessel.

## SEPT. FLORUNT.

Alfene maior, Lännendarm/vogelfraus  
 Amaracus, Meyoran. (geschläch.  
 Ammi.  
 Asteratticus, Fuchsj.  
 Ballote, Stuckender andern.  
 Bellus minor, Mülleblümlin.  
 Ectonicum altile, Graß nägeli.  
 Borrago, Boretzsch.  
 Eursa pastoris, Täschelefraut.  
 Calendula Ringelblumen.  
 Calamintha mont. Geschläch der Münz.  
 Cardamomū Arabicū, Calecutischer psäffer.  
 Carduus aspinus.  
 Carduus benedictus. Cardobenedict.  
 Chamemalum, Chamomillen.  
 Cichorium syl. Wilder Endivien art.  
 Colchicon, Herpsblumen.  
 Costus hortensis.

Crocus.

- Crocus*, Safran.  
*Cucurbita*, Kürbis.  
*Cyclaminū*, Seiwobrot.  
*Dipsacus*, Kartendistel.  
*Dorycnium*.  
*Echion*, Wilde Ochsenzunge.  
*Ennea dynamis Polonor*.  
*Erice*, Heyd.  
*Filices*, Farn.  
*Flos Iouis*, Himmelrößli.  
*Foeniculum*, Fenchel.  
*Granum Nil*.  
*Hieracium minimum*.  
*Indici flores crocei*.  
*Lactuca*, Lattich.  
*Lactucæ sylvestris genus*, Wilder Lattich.  
*Lapathi genus*, Geschlecht der Ländes-  
wurtz.  
*Lauendula pauca*, Lauendel.  
*Leucioia*, Gälbe Nägeli.  
*Libanotis*, *Coronaria*, Rosmarinus, Roß-  
maryn.  
*Lotus urbana*, Seibengezeze.  
*Malua quedam domestica*, Pappeln.  
*Malua crispa*.  
*Malum insanum*, Dollöpfel.  
*Mercurialis*, Scheißkraut.  
*Morsus diaboli*, Teufelsabbis.  
*Nasturtium*, Kresssch.  
*Nil granum*.

# SEPTEMBER.

*Ocymoides peregrinum minus.*  
*Pentaphyllum minus*, Fünffingerkraut.  
*Personata*, Groß Fletten.  
*Polycnemum origano simile.*  
*Prunella vulgaris*, Biumellen.  
*Ranunculus pratensis*, Moßblümen/hanen  
*Rhapontici genus degener.* (füß.  
*Saliunca.*  
*Satyrion genus quoddā*, Eschlächte der stendel  
*Serpillum*, Quendel. (courtz.  
*Solanum*, Nachtschatt.  
*Trichomanes*, Roter steinbrech.  
*Trifolium pratense flore albo*, Weysen flec.  
*Verbascum similis*, Eschlächte des wulfrauts.  
*Verbena*, Eysenkraut.  
*Verbena lutea* Fuchsj.  
*Viola inodora*, Senckenblümlin.  
*Viola flammula*, Dreyfaltigken Blümlin.  
*Viola autumnales caerulea*, Eschlächte des  
 Modelgeers.

SEPTEMBRI PROFERUNT  
 semina.

*Acer minus*, Klein Maßholtern.  
*Acorus vulgaris*, Gälbschwertel.  
*Alnus*, Erlinboum.  
*Amygdalus*, Mandelboum.  
*Apium*, Eppich.  
*Arbutus*, Hagdorn.  
*Balsamine vtraq;*, Balsamöpfel.

- Bellis*, Mäulenblümlin / Maßlieben.  
*Betula*, Birchen.  
*Bryonia*, Hundstürbs.  
*Buxus*, Buchsbaum.  
*Cardamomum Arabicum*,  
*Castanea*, Kestendbaum.  
*Cicuta maior*, Schirling.  
*Convolvulus maior*, Winden.  
*Corylus* (pl. Wildhaselnuß stand.  
*Cucurbitarum genera*, Allerley Kürbisen.  
*Dauci genus humile*, Wilder Kümmel ge-  
*Echion*, Hundszung. schl. & fr.  
*Fagus*, Buch.  
*Ficus*, Feigenbaum.  
*Foeniculum*, Fenchel.  
*Glycyrrhiza*, Süßholz.  
*Ilex aquifolia*, Stächend palmen.  
*Juniperus*, Kechholteren.  
*Lactuca sylvest. genus*.  
*Lantana*, Kleiner mälbaum.  
*Ligustrum*, Kerngerten.  
*Mala diuersorū generū*, Mancherley Spfel.  
*Nux iuglans*, Nußbaum.  
*Nux vesicaria*, Pimpernußle.  
*Ornus*, Großer mälbaum.  
*Oxyacantha*, berberis, Ebselen.  
*Papauer erraticum*, rheas, Kornrosen.  
*Pastinaca erratica*, Wilde rüblin.  
*Periclymenum*, Speckgilgen.  
*Persicus*, Pfersichbaum.

# SEPTEMBER.

- Pirorum genera diuersa*, Allerley biren.  
*Plantago*, Wägerich.  
*Populi nigra*, Schwarz Sarbach.  
*Pruni genera quaedam urbana*, Siparten.  
*Prunus syluest.* Schleehenboum.  
*Quercus quaedam*, Etliche Eichenboum.  
*Rhamni genus*, Sandthorn.  
*Rosa*, Rosen.  
*Rubus maior*, Brombeer groß.  
*Sabina*, Seuy boum.  
*Sambucus*, Holderboum.  
*Sambucus aquatica* Tragi.  
*Saxifraga pimpinellæ similis*.  
*Sifer*, Mören oder gälb rüben.  
*Sorbus*, Sperwerboum.  
*Spina ceruina*, Creützbeer/wägdorn.  
*Spina appendix*, spina alba, Mariendistel.  
*Tamarix*, Tamarisc.  
*Taxus*, Ydenboum.  
*Thymelææ genus*, Wolfsmilch geschlächt.  
*Virga Sanguinea* Plinij, Bartrigel.  
*Viscum*, Mistel.  
*Vitis domestica*, Weynrâb.  
*Vlmari*.  
*Xanthium*, lappa minor. Spitzfletten.  
 OCTOB. FLORENT.  
*Alfene mator & minor*, Sännendarin.  
*Althæa peregrina*.  
*Amaranthi Pliniani species*.  
*Ammi*.  
*Bellis maior & minor*, Flein vnd groß mü-

lin Blümlin/maß lieben.

*Betonica altilis*, Graßnägelin.

*Borrago*, Buretsch.

*Bursa pastoris*, Teschel kraut.

*Calendula*, Ringelblumen.

*Cardamomū Arabicū*, Catecutischer pfeffer.

*Cichorij genus*, Nulchen.

*Cicuta*, Schirling.

*Clematidis Aegyptiae genus*.

*Conyzae genus*, Dürwurtz gschlecht.

*Costus hortensis*, costwurtz.

*Doronicum*.

*Erysimum hortense* garten hederich.

*Foeniculum*, Fenchel.

*Gentiana pumila*, gschlecht der Enzian.

*Herba Iulia*, fründt leberkraut.

*Helxine*, tag vnd nacht.

*Hieracium alterum*, Kdilekraut.

*Iberis Mathioli*, Senffkraut.

*Iouis flos purpureus & albus*, Him: Irßglin.

*Iulia herba*, fründt läberkraut.

*Lapathum*, Lendy wurtz.

*Latoris Plinij*.

*Leucolum purpureum*.

*Libanotis coronaria*, Rosmarin.

*Lotus urbanus & sl.*

*Lunaria species*, mons kraut gschlechter.

*Ocinoides*, Ba: liden gschlecht.

*Malva crispa*, Winterrosen.

*Nigella sativa*, Schabab.



## OCTOBER.

- Polycnemōn origano simile.*  
*Prunella vulgaris*, Braunellen.  
*Ranunculi pratenses*. Geißblumen/hanens-  
 fuß.  
*Raphanus*, Rettich.  
*Satureia*, Hünerfülle/Isöple.  
*Scabiosa*, Apostemkraut/grindkraut.  
*Securidaca*, Peltichen.  
*Senecio*, Weinbrech/crütz wurtz.  
*Sideritidis genus*, gschlecht des Juden-  
 Frauts.  
*Sonchus quidam*, Hasenköhl.  
*Thlaspi Gyni*, Wildfressich.  
*Tithymallus heliotropius*, Milch Kraut.  
*Trifolium pratense*, groß Klee.  
*Viola dasypus*, gschlecht der Osterlucy.  
*Viola septicolor*, Däncken/treyfaltigkeits-  
 blümlin.  
*Vrtica mortua*, Taubneßlen.

## OCTOBRI SEMINA proserunt.

- Atriplex sylvest.* wilderburchhart.  
*Cardamomū Arabicū*, Calcutischer pfeffer.  
*Carduus asininus*.  
*Cichorij genus*, Wägwart.  
*Conuoluulo similis*.  
*Cornus*, Welsch Eirschen/Furbeere.  
*Cucurbita*, Kürbisen.

Fraxi,

*Fraxinus*, Aeschbaum.

*Helxine*, tag vnd nacht/S. Petters Kraut.

*Hieracium alterum*, Teuffelskraut.

*Iris non foetida*.

*Iuniperus*, Wäckholterren.

*Lepidium*, Senffkraut/pfefferkraut.

*Libanotis ferulacea* genus.

*Ligustrum*, Kerngert/Beynhölzlin.

*Mala quaedam*, ettl. öpfel.

*Mespilus*, Aäspen.

*Oxyacantha*, erbselen/weynlegelin.

*Pastinaca erratica*, Wilde rüble.

*Persica duracina*, Rotte pferfich.

*Personata*, Klettenkraut.

*Pira quaedam*, ettl. biren.

*Polycnemō*, origano simile, gschlecht deß wil  
den wolgemüts.

*Prunus*, Kriechenbaum.

*Prunus syl.* Schlehen.

*Ruta*, Reut.

*Sabina*, Seuenbaum/seuenpalmen.

*Satureia*, Hünerfülle/Issöple.

*Senecio*, Creutz wurtz.

*Sisyr*, Gelbe rüben.

*Solanum amplexicaule*, gschlecht der nach  
schatten.

*Sonchus pinguis*, Basenföl.

*Sorbus torminalis*, Baum der holzbirly  
trägt.

*Verbena*, Eisenkraut.

# OCTOBER.

*Viscum*, Nistel.

*Vitis urbana*, Weynråben.

*Vitis sylvestris caustica*, Nielen.

*Xanthium*, klein Bletten.

# NOVEMBRI FLORENT.

*Arthritica inodora*, Schlüsselblümen.

*Bellis hortensis* Mülleblümle.

*Borrago*, Buretsch.

*Bursa pastoris*, Terschelkraut.

*Calendula*, Ringelblümen.

*Carduus asininus*.

*Cichorium sylvestre*, wägwart.

*Consiligo*, Leißkraut.

*Conyza Laniflora*, groß dürrwurtz.

*Fumaria*, Erdrauch/rotte taubentröpflein.

*Hyssopus rara*, Kirchen hyssop.

*Iouis flos rarissimus*.

*Leucoia rara*, Gälbe nägeln.

*Locusta herba*, Nüßlin kraut.

*Mercurialis*, Scheißkraut.

*Ocymoides*, Wildebasilien.

*Papaver cornutum*, Nagelsamen mit käsen.

*Ranunculus*, geißblümen/moßblümen.

*Ruta*, Rauten.

*Saxifraga pimpinellæ similis*, Steinbrech.

*Scabiosa*, Apostemkraut.

*Senecio*, heinbrech/creütz wurtz.

*Sonchi vel lactucæ syl.* Hasenöl.

Thithy:

*Tithymali* genus paruum, Milchfrant.  
*Viola* septicolor, Sâncfenblûmly.

## SEMINA PROFERVNT NOVEM.

*Alnus*, Erlinboum.

*Carduus arvensis*.

*Costus hortensis*, Costwurcz.

*Dipsacus minor*, Kartendistel.

*Ligustrum*, Kerngarten.

*Papaver cornutum*, gehornter magsamen.

*Plantago*, Wâgerich.

*Polycnemon*.

Rosæ, Rosen.

*Saxifraga*, Steinbrech.

*Solanum com.* Nachtschatten.

*Solanum lignosum*, Je lenger ie lieber.

*Sonchi* & *lactuca* syl. Wilder lattich.

*Spina appendix*, Mâlbeere.

*Vitis sylvestris caustica*, Vielen.

DECEMBRI FLORENT INITIO  
 præsertim & locis tepidioribus.

*Arthritica species quædam*, Schlüsselblûmen gschlechter.

*Bellis hortensis*, Mülly blûmlin.

*Betonicum altile*, grasß blûmen.

*Borrago*, Buretsch.

*Calendula*, Ringelblûmen.

## DECEMBER.

*Cariophylli Indici*, Indianische negeli.

*Consiligo*, Leibstrauch.

*Cynoglossus minor*, Hundszung gschlecht.

*Helleborus niger*, Chustwurtz.

*Hepatica aurea*, Edel läberkraut.

*Hypoglossis*, Zepflin kraut.

*Hieranij species apij solijs*.

*Laurus Alexandrina*.

*Lithospermi florum principia*.

*Ruscus*, Nußdorn/feerbürsten.

*Senecio*, Creutzkraut.

*Tithymallus helioscopius*.

*Viola heptachrus*.

*Vrtica mortua*, Taubneßel.

## FINIS.

